

Королькова Г.С., Тихомирова Г.И., Захарченко Ю.И.

ИЗУЧЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ РАБОТОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРИ УЧАСТИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, 426034, г. Ижевск

♦ **Актуальность исследования.** В настоящее время в РФ работу медицинской сестры можно рассматривать как новый вид профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, целью которой является сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациентов. **Цель** – изучение полученных отдаленных результатов профилактической сестринской деятельности среди пациентов трудоспособного возраста с артериальной гипертензией. **Материал и методы.** Изучены результаты наблюдения и анкетирования обучающихся пациентов с артериальной гипертензией в возрасте 35–65 лет в «Школе профилактики больных с артериальной гипертензией». **Результаты.** Исследованы группы пациентов с артериальной гипертензией (АГ), среди которых проводились обучающие занятия по профилактике рецидивов и осложнений АГ по программе здорового образа жизни с использованием сестринского процесса и без него и показана эффективность этих мероприятий. **Заключение.** Использование обучающих образовательных технологий «Сестринский процесс» показало их эффективное воздействие на усиление лечебных мероприятий и профилактику возникновения рецидивов и осложнений у пациентов с АГ.

Ключевые слова: профилактические мероприятия; артериальная гипертензия; средний медицинский персонал.

Для цитирования: Королькова Г.С., Тихомирова Г.И., Захарченко Ю.И. Изучение отдаленных результатов профилактической помощи пациентам работоспособного возраста с артериальной гипертензией при участии средних медицинских работников. *Российский медицинский журнал*. 2019; 25(3): 143–145. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-3-143-145>

Для корреспонденции: Тихомирова Галия Имамудиновна, доктор мед.наук, доцент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», 426034, г. Ижевск, E-mail: galla-tix@mail.ru

Korolkova G.S., Tikhomirova G.I., Zakharchenko Yu.I.

STUDYING OF LONG-TERM RESULTS OF PREVENTION HELP TO PATIENTS OF WORKING AGE WITH PARTICIPATION OF THE NURSING STAFF

Izhevsk State Medical Academy, 426034, Izhevsk, Russian Federation

♦ The RF currently work a nurse can be considered as a new type of professional activity of medical, psychological, pedagogical and socio-legal nature, the purpose of which is to the preservation, enhancement and restoration of the health of patients. **Purpose** – the study received remote results of preventive nursing activities among working-age patients with arterial hypertension. **Material and methods.** Studied the results of observation and questioning students hypertensive patients aged 35–65 years in school prevention patients with arterial hypertension. **The results.** Researched group of patients with arterial hypertension (AH), among which were training classes on prophylaxis of recurrence and complications of AH on healthy life-style programme using the nursing process and without it and shows the efficiency of these activities. **Conclusion.** The use of educational technology training “Nursing process” showed their effective influence on enhancing treatment and prevention of the occurrence of relapses and complications in patients with AH.

Keywords: preventive measures; arterial hypertension; nursing staff.

For citation: Korolkova G.S., Tikhomirova G.I., Zakharchenko Yu.I. Studying of long-term results of prevention help to patients of working age with participation of the nursing staff. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2019; 25(3): 143–145. (in Russ) DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-3-143-145>

For correspondence: Galiya I. Tikhomirova, doctor of medical sciences, Associate Professor, Department of General Surgery, Izhevsk State Medical Academy, 426034, Izhevsk, Russian Federation, E-mail: galla-tix@mail.ru

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Received 09.06.19

Accepted 25.06.19

Актуальность проблемы

В настоящее время работу медицинской сестры можно рассматривать как новый вид профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, целью которой является сохранение, укрепление и восстановление здоровья [1–3]. В рамках концепции медико-социальной работы можно выделить 5 основных групп пациентов: 1) группа повышенного риска заболеваний; 2) семья и ближайшее окружение больного; 3) длительно, часто и тяжело болеющие; 4) больные с выраженными социальными проблемами; 5) инвалиды. В каждой из перечисленных групп пациентов медицинская сестра осуществляет работу разной направленности, используя методы, сложившиеся в здравоохранении (профилактические,

реабилитационные, психологической поддержки и др.), а также в системе социальной защиты населения (социальная диагностика, социальное консультирование, активный патронаж, стационар на дому, организация дневного пребывания в стационаре, ведение школ для пациентов) [4, 5].

Цель исследования – изучение полученных отдаленных результатов профилактической сестринской деятельности среди пациентов трудоспособного возраста с артериальной гипертензией.

Материал и методы

Изучены результаты непосредственного наблюдения и анкетирования обучающихся пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в «Школе профилактики больных с артериальной гипертензией». Большую часть состави-

ли пациенты возрастной категории 46-55 лет (36,2%) и 56-65 лет (32,1%), немногочисленной была группа в возрасте 35-46 лет (21,5%).

Результаты

Социологический опрос, проведённый нами в ходе исследования, показал, что до обучения только 43,2% больных были привержены гипотензивной терапии, только 19,4% пациентов контролировали своё АД в домашних условиях, отмечено также, что лишь половина из числа респондентов имели дома тонометр. Все пациенты до начала обучения в школе были распределены в группы: группу наблюдения составили 46 больных с артериальной гипертонией, которым проводились обучающие занятия по профилактике рецидивов и осложнений АГ по программе здорового образа жизни без использования сестринского процесса; в контрольную группу вошли 92 пациента, которым в ходе занятий в школе применялись сестринские технологии обучающего характера с учетом психотипа личности больного, а также привлечением в учебный процесс их родственников, обязательным тестированием для контроля за усвоением полученных знаний и использования методов психологической поддержки; группа сравнения представлена 89 пациентами, обучение среди которых не проводилось, а использовались беседы о здоровом образе жизни (ЗОЖ) и давались рекомендации в виде памяток и буклетов. После обучения в школе через 6 мес начали регулярно принимать гипотензивные лекарственные средства 68,7% пациентов группы наблюдения, при этом 71,6% из числа опрошенных ежедневно самостоятельно контролировали АД и производили записи полученных результатов в дневниках самоконтроля и самонаблюдения, указывая в записях дополнительно частоту пульса. В контрольной группе таких пациентов отмечалось 75,3% и 92,8%, тогда, как в группе сравнения – лишь 58,4% и 66,9% соответственно. Последующее анкетирование больных среди данных групп через 12 мес после начала обучения в школе для больных с АГ показало, что 89,4% опрошенных группы наблюдения, а среди 92,6% пациентов контрольной группы регулярно принимали гипотензивные лекарственные средства, назначенные врачом-терапевтом и 90,8% и 96,6% больных соответствующих групп, ежедневно контролировали самостоятельно АД. В группе же сравнения результаты показали, что 75,2% респондентов были привержены регулярному приему антигипертензионных лекарственных средств и только 79,8% ежедневно контролировали своё АД.

При клиническом обследовании пациентов через 12 мес после завершения использования обучающих программ в группе наблюдения, гипертрофия миокарда левого желудочка была обнаружена у 48,7% больных с АГ, в контрольной – у 44,2%, а в группе сравнения – у 51,3%. Улучшились показатели осмотра глазного дна. Установлено, что до начала обучения сужение сосудов сетчатки наблюдалось у 68,1% пациентов группы наблюдения, у 64,3% – контрольной группы и у 68,0% группы сравнения. Через 12 мес наблюдения уменьшение сосудистого компонента сетчатки было отмечено у 7,5%, 10,2%, 7,2% больных соответственно. Обнадёживающе выглядела и клиническая картина в динамике уровня холестерина крови пациентов наблюдаемых нами групп. До применённого обучения повышенный уровень холестерина выявлен у 81,8% групп наблюдения. При этом практически у всех наблюдаемых легкая

степень гиперхолестеринемии была отмечена у 33,6% больных, умеренная степень – у 45,3% и выраженная гиперхолестеринемия – у 2,9% пациентов с АГ. Использование знаний, полученных в школе по вопросам диетотерапии, позволило больным группы наблюдения и контроля через 12 мес после завершения обучения улучшить показатели холестеринового обмена. И в целом по группам число больных с повышенным уровнем холестерина крови снизилось на 4,6%, тогда как в группе сравнения – лишь на 2,7%, но распределение показателя уровня холестерина стало несколько иным. Так, 9,5% больных из категории с умеренным повышением уровня холестерина перешли в группу с лёгкой степенью гиперхолестеринемии. Таким образом, удельный вес пациентов с лёгкой степенью гиперхолестеринемии увеличился на 4,3%, нормализация показателей холестеринового обмена отмечена у 4,5% больных.

Интересным было изучение динамики ФР у больных с АГ до начала обучения в школе и через 6-12 мес после обучения. Так, до обучения в школе 50,7% пациентов всех групп выкуривали в течение дня 15 и более штук сигарет. Проведение занятия о вреде курения и его влиянии на стенку сосудистого тонуса и подъёмы АД, позволили 2,2% пациентов группы наблюдения через 6 мес отказаться от курения, однако, спустя ещё 6 мес половина из них вернулись к этой привычке, в группе сравнения данный показатель составил лишь 1,8%, а в контрольной же группе в целом отказавшихся от вредной привычки оказалось 6,5% пациентов. Употребляли алкогольные напитки 38,9% всех пациентов, в результате полученных знаний через 6 мес значительно сократили дозировку и количество приёмов алкоголя 11,6% больных группы наблюдения, 17,4% – контрольной группы и лишь 6,3% – группы сравнения. Ещё через 12 мес проведённые исследования показали, что число больных, реже употреблявших алкоголь стало в группе наблюдения и контроля на 3,2% больше, чем в группе сравнения.

До обучения в школе высокая физическая активность была свойственна 29,3% больных всех наблюдаемых групп (ходьба пешком не менее 3 км, выполнение утренней зарядки, посещение тренажерного зала 1-2 раза в неделю). Через 6 мес после окончания обучения количество пациентов значительно выросло, особенно это отмечено в контрольной группе, где этот показатель составил 38,7%, а в целом по группам наблюдения у 45,6% пациентов появилось желание ежедневно проходить пешком не менее 3 км и 1-2 раза в неделю посещать спортивный зал или бассейн. Через 12 мес данный показатель составил 43,4%. До начала применения обучающих программ 60,1% больных с АГ не придавали особого значения избыточному употреблению поваренной соли, 44,9% больных не знали точной нормы её употребления в течение суток. Как показали наши исследования через 6 мес после завершения обучения 65,7% пациентов контрольной группы предпочитали ограничение употребления поваренной соли до 5,0г в течение суток. Повторное анкетирование, проведённое через 12 мес показало, что 67,9% пациентов этой группы с АГ, готовы были отказаться от досаливания уже приготовленной пищи. В группе наблюдения эти показатели оказались в 1,2 раза ниже, а в группе сравнения – в 2,5 раза соответственно. В наших исследованиях до начала занятий в школе 68,6% больных имели избыточный вес. Через 12 мес после завершения обучения масса тела нормализовалась лишь у 3,7% пациентов группы наблюдения, у

6,5% – контрольной группы, в группе сравнения – лишь у 2,9% опрошенных.

В течение 12 мес у пациентов, посещавших занятия в школе, прослеживалась положительная тенденция к снижению числа случаев и дней временной нетрудоспособности, а так же числа случаев первичного выхода на инвалидность. Отмечалось уменьшение количества дней нетрудоспособности в отдалённом периоде на 5,6% случаев среди пациентов группы наблюдения и на 10,1% больных контрольной группы, тогда как в группе сравнения данный показатель составил лишь 3,8%. Кроме того, за аналогичный период снизилось число случаев повторной госпитализации в связи с рецидивом заболевания или его осложнениями на 51,2%, 72,4% и 46,0% соответственно. Результатом работы, проводимой средним медицинским персоналом совместно с врачом-психотерапевтом, а также взаимодействие с родственниками обучаемых в «Школе профилактики больных с артериальной гипертензией» за анализируемый период стало уменьшение частоты вызовов бригад неотложной помощи по поводу артериальной гипертензии и её осложнений на 20,9%, 24,7% и 16,6% соответственно.

На предотвращение развития рецидивов артериальной гипертензии и развитие ее осложнений оказывает большое влияние отношение родственников к выполнению больным рекомендаций врача и медицинского персонала. Было отмечено большое удовлетворение от обучающих терапевтических занятий со стороны родственников, обучающихся с пациентами в контрольной группе, где ее участники с удовольствием принимали участие в занятиях по психологической поддержке.

Заключение

Таким образом, использование санитарно-просветительных методов профилактики в группе наблюдения и сестринских обучающих образовательных технологий

«Сестринский процесс» – в контрольной, показало их эффективное воздействие на усиление лечебных мероприятий и профилактику возникновения рецидивов и осложнений АГ.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сайгитов Р.Т., Чулок А.А. Сердечно-сосудистые заболевания в контексте социально-экономических приоритетов долгосрочного развития России. *Вестник РАМН*. 2015; 70(3): 286-99.
2. Чукаева И.И., Орлова Н.В., Кисляк О.А., Арутюнов Г.П., Рылова А.К., Соловьева М.В., Евзерихина А.В., Колесникова Е.А. Школы здоровья для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. *Учебное пособие*. М.: ГОУ ВПО РГМУ; 2011.
3. Антонова О.В., Егорова Л.А., Макаров С.А. и др. Школа здоровья. Артериальная гипертензия. ред. О.В. Скоморина, Т.В. Дружинина. 2007; 1 (11).
4. Шальнова С.А. От прогноза к профилактике. *Медицинская газета*. 2007; 27: 10.

REFERENCES

1. Saigitov R.T., Chulok A.A. Cardiovascular diseases in the context of the socio-economic priorities of the long-term development of Russia. *Vestnik RAMN*. 2015; 70(3): 286-99. (in Russian)
2. Chukayeva I.I., Orlova N.V., Kislyak O.A., Arutyunov G.P., Rylova A.K., Solov'eva M.V., Evzerikhina A.V., Kolesnikova E.A. School of health for patients with cardiovascular diseases: studies. Allowance. Moscow: SEU VPO RSMU, 2011. (in Russian)
3. Antonova O.V., Egorova L.A., Makarov S.A. et al. *School of health. Hypertension*, ed. O. V. Skomorina, T. V. Druzhinina. 2007; 1 (11). (in Russian)
4. Shalnova S.A. From forecast to prevention. *Meditinskaya gazeta*. 2007; 27: 10. (in Russian)
5. Dubiel M., Cwynar M., Januszewicz A., Grodzicki T. Patient's education in arterial hypertension. *Ann Intern. Med*. 2006; 3: 145.

Поступила 09.06.19
Принята к печати 25.06.19