

202200130077　⑰　薛润泽　第11周作业.

① 因为 $(q_2,\$) \in \notin \delta(q_1,\varepsilon,\varepsilon)$ 且 $(q_4,\varepsilon) \in \delta(q_3,\$,\varepsilon)$

所以把规则 $A_{q_1q_4} \longrightarrow A_{q_2q_3}$ 放入G中

② 因为 $(q_2,0) \in \delta(q_2\,0,\varepsilon)$ 且 $(q_3,\varepsilon) \in \delta(q_3,1,0)$

所以把规则 $A_{q_2q_3} \longrightarrow 0A_{q_2q_3}1$ 放入G中

③ . 把 $A_{q_2q_3} \longrightarrow A_{q_2q_2}A_{q_3q_3}$ 放入G中

④ 把 $A_{q_2q_2} \longrightarrow \varepsilon$, $A_{q_3q_3} \longrightarrow \varepsilon$ 放入G中 .

综上. G为

$A_{q_1q_4} \longrightarrow A_{q_2q_3}$

$A_{q_2q_3} \longrightarrow 0A_{q_2q_3}1$

$A_{q_2q_3} \longrightarrow A_{q_2q_2}A_{q_3q_3}$

$A_{q_2q_2} \longrightarrow \varepsilon$

$A_{q_3q_3} \longrightarrow \varepsilon$