# 1 python

1. 这个函数用于将一个特定格式的字符串分割成字符和数字部分，分别储存和返回。对该字符串的格式要求是`<name><value>`，如果数字部分是负数，则应在字符串后加上'n'，即可在数字部分得到负数。

2.

| | input | output |
|---|---|---|
| 1 | phi0.1 | 'phi',0.1 |
| 2 | kappa0.5n | 'kappa',-0.5 |
| 3 | 123 | '',123.0 |
| 4 | abc | 'abc',None |
| 5 | | '',None |
| 6 | ++--0.1 | '++-',-0.1 |
| 7 | ++--0.1n | / |
| 8 | a1b2c3 | 'a',1 |
| 9 | %^&*().1 | '%^&*()',0.1 |
| 10 | ++--0.00 | '++-',-0.0 |

   我们在第6，7，9，10组测试数据发现了异常，第6组的`-`应当读入字符部分而不是数字部分，第7组报错，第9组`.`应当读入字符部分而不是数字部分，第10组`-0.0`不合理。 这应该是程序第28行的正则表达式不合理，负数的判断应该由最后是否有`n`决定，而不应作为数字的一部分被读取。 我们将其改为`pattern = '(\d+\.\d+|\d+)'`即可得到正确的结果。(取消将正负号读入数字部分；将`\d*`改为`\d+`避免字符部分最后的`.`被读入数字部分。)

3. 'phi',0.1 'xN',14.2 'kappa',-0.5 'a',1.0 'b',-14.0 'n',0.0 'c',0.2

# 2 matlab

```
R = 3;
r = 1;
% 创建角度向量
theta = linspace(0, 2*pi, 100);
phi = linspace(0, 2*pi, 100);
[Theta, Phi] = meshgrid(theta, phi);
% 计算x, y, z的值
X = (R + r*cos(Theta)) .* cos(Phi);
Y = (R + r*cos(Theta)) .* sin(Phi);
Z = r * sin(Theta);
% 绘制三维图像
surf(X, Y, Z);
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
```

```
title('环面三维图像');
axis equal;
```

图像如下： 

# 3 mathmatica

```
Sum[1/(n^3 + n^2), {n, 1, Infinity}]
Integrate[(Sqrt[x] Log[x])/(x + 1)^2, {x, 0, Infinity}]
```

结果如下： 

# 4 markdown

```
**Q**:Find the solution of the following equation with respect to $\theta$
$$
A\cos\theta+B\sin\theta+C=0
$$
**A**:
Let $x_1=\cos\theta$ and $x_2=\sin\theta$, then the solution is given by the
intersection of the circle and line:
$$
\begin{align*}
x_1^2+x_2^2=1\\
Ax_1+Bx_2+C=0
\end{align*}
$$
We reformulate the equations in a parametric form:
$$
\begin{align*}
|\mathbf{x}|^2=1&\\
\mathbf{x}(t)=\mathbf{a}+t\mathbf{b}&
\end{align*}
$$
where $\mathbf{x}=(x_1,x_2),\mathbf{a}=(0,-C/B),\mathbf{b}=(-C/A,C/B)$, and *t* is
a parameter. The intersection points satisfy the following equation:
$$
|\mathbf{a}+t\mathbf{b}|^2=1
$$
which can be solved for *t* to find the intersection points:
$$
t_{1,2} = \frac{-\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \pm \sqrt{(\mathbf{a} \cdot
\mathbf{b})^2 - |\mathbf{b}|^2 (|\mathbf{a}|^2 - 1)}}{|\mathbf{b}|^2}
$$
```

效果图如下：