

Partie 1 : La lumière

Document 1 : Plein les yeux

L'Homme depuis la nuit des temps n'a eu comme seul attribut pour observer le monde que son œil nu. Par les nuits les plus noires, il ne pouvait compter que sur la lumière des étoiles pour ce repérer. C'est pourquoi il a rapidement su exploiter l'incandescence.


Lorsqu'il est convenablement chauffé, le bois prend feu et la flamme qui en résulte crée un halo de lumière. Des siècles plus tard, le filament d'une lampe portée à incandescence éclaire alors ses nuits. La lumière des étoiles nous permet de distinguer la lueur rouge de Bételgeuse (une étoile dont la température de surface est de l'ordre de 3 000 °C), ou l'éclat bleuté de Rigel (avec une température de surface de plus de 11 000 °C). Entre les deux, notre Soleil, jaune affiche à sa surface une température de 5 000 °C.

1. Quelles sont les sources lumineuses citées dans le texte ?
2. Quelles hypothèses pouvez vous émettre pour expliquer les couleurs différentes des rayons lumineux émis par les étoiles ?

Document 2 : Orion le chasseur

Les étoiles apparaissent être exclusivement blanches au premier coup d'œil. Mais si nous regardons attentivement, nous pouvons noter une plage de couleurs : bleu, blanc, rouge et même doré. Dans la constellation d'hiver d'Orion, un beau contraste se voit entre la rouge Bételgeuse et la bleue Bellatrix. Ce qui fait que les étoiles montrent différentes couleurs resta longtemps un mystère jusqu'à il y a deux siècles, quand les physiciens eurent suffisamment de compréhension de la nature de la lumière et des propriétés de la matière aux très hautes températures.

Les étoiles sont très éloignées de nous, à un tel point que la lumière qu'elles émettent mettent plusieurs années à vous parvenir. Par exemple la lumière émise par l'étoile Bételgeuse met environ 643 années pour nous parvenir.



3. Sachant que la lumière se déplace dans le vide à une vitesse d'environ $299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$, à quelle distance se situe Bételgeuse ?

Cours

Les ondes électromagnétiques, dont la lumière fait partie, se propagent toutes à la même vitesse dans le vide ou dans l'air. Cette vitesse notée c a pour valeur exacte $299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$. On reviendra la valeur arrondie : $c = 3,00 \times 10^8\text{ m s}^{-1}$.


Partie 2 : L'émission de lumière

Pourquoi les étoiles n'ont pas la même couleur ? Comment peut-on analyser la lumière qui vous vient des étoiles ?

1. Pourquoi ne peut-on pas effectuer une étude in situ de la composition du Soleil en envoyant une sonde par exemple ?
2. Sur quel phénomène physique peut on alors s'appuyer ?
3. De quels moyens techniques disposons-nous pour l'analyser ?


a. Décomposition de la lumière : le spectre continu émis par une lampe à incandescence

Schéma du montage



4. Compléter et légender le schéma du montage
5. Décrire le phénomène que vous observez

Spectre visible de la lumière blanche




6. Quelles sont les limites du spectre visible de la lumière blanche ?
7. Que signifient les termes "UV" et "IR" ?

Cours

La lumière émise par l'ampoule peut être décomposée par On obtient alors un montrant un étalement de couleur du au

La lumière est constituée de Chacune d'entre elle est caractérisée par une notée λ (lambda) exprimé en **nanomètre** (nm). Pour décomposer la lumière, on utilise un (**prisme ou réseau** qui permet d'obtenir, sur l'écran, une figure appelée

L'œil humain n'est capable d'observer qu'une petite partie du spectre lumineux, il s'agit de la lumière visible comprenant des radiations allant de 400 à 800 nm.



b. Spectre d'émission des corps chauds

Pour étudier l'effet de la température d'un corps lorsqu'il est chauffé on utilise un simulateur permettant de faire varier la température d'un objet et affichant le spectre et la couleur de la lumière associée.

https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_all.html?locale=fr



Résumé de la simulation

Température	Mini		Maxi
Valeur en Kelvin			
Valeur du pic du spectre			
Couleur observable			

1. Comment évolue la température du filament de la lampe lorsque l'intensité qui la traverse augmente ?
2. Que peut-on en conclure sur le spectre lumineux d'un corps fortement chauffé ?

Cours :

Un corps fortement chauffé émet de la lumière dont le spectre est Ce spectre ne dépend pas de la composition du corps. En revanche, il dépend de sa
Lorsque la température du corps, la lumière qu'il émet s'enrichit en radiations : son spectre continu d'émission s'étale d'avantage vers le

c. Spectres de raies d'émission d'un gaz


Le professeur branche la lampe spectrale à vapeur de sodium puis celle au mercure. Observer la lampe à travers un spectroscopie.

1. Faire un schéma du montage et reproduire les spectres d'émission observés.
2. Pourquoi décrit-on ce spectre comme un spectre de raies ?
3. Les spectres d'émission dépendent-ils de l'élément chimique mis en jeu ?


Cours :

Un gaz porté à haute température sous une faible pression peut émettre de la lumière composée d'une ou de plusieurs Le spectre lumineux est alors, il est appelé

Schéma du montage



Spectre d’émission de la lampe à vapeur de sodium



Spectre d’émission de la lampe à vapeur de mercure

