

크리스비타주 급여기준 관련 질의·응답

- burosumab주사제 (품명: 크리스비타주사액), 고시 제2023-00호('23.5.0.시행)관련 -

1

투여대상 조건 중 기존 치료제의 범위

- 혈중 인 농도 유지를 위해 투여하는 경구 인산 제제 또는 활성형 vitamin D 제제 등을 포함함.

2

생화학적 검사 중 신장 인 소실 확인 방법

- 연령에 따라 남자 및 여자로 구분하여 아래 표를 기준으로 적용함.

※ TmP/GFR 참고치¹⁾

연령	남자 mg/dL(mmol/L)	여자 mg/dL(mmol/L)
출생시	5.7 - 8.1 (1.27 - 2.59)	5.7 - 8.1 (1.27 - 2.59)
1개월-2세	3.6 - 5.4 (1.15 - 1.73)	3.6 - 5.4 (1.15 - 1.73)
2세-12세	3.8 - 5.0 (1.22 - 1.60)	3.8 - 5.0 (1.22 - 1.60)
12-16세	3.4 - 4.6 (1.09 - 1.47)	3.4 - 4.6 (1.09 - 1.47)
16-25세	3.33 - 5.9 (1.07 - 1.89)	3.18 - 6.41 (1.02 - 2.05)
25-45세	3.09 - 4.18 (0.99 - 1.34)	2.97 - 4.45 (0.95 - 1.42)
45-65세	2.78 - 4.18 (0.89 - 1.34)	2.72 - 4.39 (0.87 - 1.40)
65-75세	2.47 - 4.18 (0.79 - 1.34)	2.47 - 4.18 (0.79 - 1.34)

3

제외대상 기준에서 Grade 4 이상의 신석회증(nephrocalcinosis) 진단 기준

- 신장 초음파로 신석회증(nephrocalcinosis)이 확인되며 아래 분류²⁾에서 4등급에

1) William H Chong et al. Tumor-induced osteomalacia Endocr Relat Cancer. 2011 June 8; 18(3): R53 - R77.
2) Imel EA, Glorieux FH, Whyte MP, et al. Burosumab versus conventional therapy in children with X-linked hypophosphataemia: a randomised, active-controlled, open-label, phase 3 trial. *Lancet*

해당하는 경우

0 = Normal

1 = Faint hyperechogenic rim around the medullary pyramids

2 = More intense echogenic rim with echoes faintly filling the entire pyramid

3 = Uniformly intense echoes throughout the pyramid

4 = Stone formation: solitary focus of echoes at the tip of the pyramid