

보건복지부 고시 제2024-155호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2024-130호(2024. 6. 28.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2024년 7월 26일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[117] Lurasidone hydrochloride 경구제(품명: 라투다정20밀리그램 등), [142] Canakinumab 주사제(품명: 일라리스주사액)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[142] Dupilumab 주사제(품명: 듀피켄트프리필드주300밀리그램 등), [212] Dronedarone경구제(품명: 멀택정), [394] Colchicine 경구제 (품명: 콜킨정 등)"의 구분, 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2024년 8월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[117] 정신신경용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[117] Lurasidone hydrochloride 경구제 (품명 : 라투다정20밀리그램 등)	<신 설>	1. 각 약제의 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 함을 원칙으로 함. 2. 만 24세 이하인 자의 우울병에 투여하는 경우에는 허가사항 중 사용상의 주의 사항(경고, 이상반응, 일반적주의 항목 등)에 따른 임상적 유용성이 위험성 보다 높은지 신중하게 고려하여 투여하여야 함.	○ Lurasidone hydrochloride 경구제(품명 : 라투다정)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가 결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.
※ 관련근거			
1) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e, 2022. 2) Katzung's Basic & Clinical Pharmacology, 16th Edition (2023) 3) Current Medical Diagnosis & Treatment 2023 (2023) 4) 2019-2020 Florida Best Practice Psychotherapeutic Medication Guidelines for Adults			

- 5) 2022-2023 Florida Best Practice Psychotherapeutic Medication Guidelines for Children and Adolescents
- 6) Antony Loebel et al. Efficacy and safety of lurasidone 80 mg/day and 160 mg/day in the treatment of schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. Schizophrenia Research 145 (2013) 101-109
- 7) Melissa P. DelBello. et al. Efficacy and Safety of Lurasidone in Adolescents with Schizophrenia: A 6-Week, Randomized Placebo-Controlled Study. Journal of child and adolescent psychopharmacology;volume 27; 2017; 516-525
- 8) Antony Loebel et al. Effectiveness of lurasidone vs. quetiapine XR for relapse prevention in schizophrenia: A 12-month, double-blind, noninferiority study. Schizophrenia Research 147 (2013) 95-102.
- 9) Prof Stefan Leucht MD et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. The lancet Volume; 382, Issue 9896, 14-20 september 2013, Pages 951-962
- 10) Antony Loebel, M.D. et al. Lurasidone Monotherapy in the Treatment of Bipolar I Depression: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. American Journal of Psychiatry. 2014; 171:160-168
- 11) Antony Loebel, M.D. et al. Lurasidone as Adjunctive Therapy With Lithium or Valproate for the Treatment of Bipolar I Depression: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. American Journal of Psychiatry. 2014; 171:169-177
- 12) Jun Ishigooka et al. Lurasidone in the Long-Term Treatment of Bipolar I Depression: A 28-week Open Label Extension Study. Journal of Affective Disorders Volume 281, 2021, Pages 160-167
- 13) Michael Ostacher. et al. Lurasidone compared to other atypical antipsychotic monotherapies for bipolar depression: A systematic review and network meta-analysis. The World Journal of Biological Psychiatry;volume 19; 2018; 586-601
- 14) Melissa P. DelBello. et al. Efficacy and Safety of Lurasidone in Children and Adolescents with Bipolar I Depression: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Journal of child and adolescent psychopharmacology;volume 56; 2017; 1015-1025
- 15) Melissa P. DelBello. et al. Tolerability, Safety, and Effectiveness of Two Years of Treatment with Lurasidone in Children and Adolescents with Bipolar Depression. Journal of child and adolescent psychopharmacology;volume 31; 2021; 494-503
- 16) 대한우울조울병학회 (대우조 제2023-02호, 2023.12.7.)
- 17) 대한조현병학회 (대조현 제2023-46호, 2023.12.11.)
- 18) 대한정신약물학회 (대정약 제2023-41호, 2023.12.7.)
- 19) SMC (2014.10.13.)
- 20) PBAC (2015.7.3.)
- 21) CADTH (2013.12.20.)

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Canakinumab 주사제 (품명: 일라리스 주사액)	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 크리오피린 관련 주기적 증후군 1) 투여대상 2세 이상 소아 및 성인에서 NLRP3 유전자 변이가 확인된 경우로서 다음 가), 나), 다) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 중등도-중증의 질병활성 임상증상 확인 나) CRP(C-reactive protein) 또는 SAA(serum amyloid A protein) 10 mg/L 이상 다) 아래의 (1) 또는 (2) 조건을 만족하는 경우 (1) 가족성 한냉 자가염증성 증후군 (Familial Cold Autoinflammatory Syndrom, FCAS) /가족성 한냉 두드러기 (Familial Cold Urticaria, FCU), 머클-웰스 증후군 (Muckle-Wells Syndroms, MWS) 환자로 일상생활에 지장이 있는 경우 (2) 신생아 발현 다발성 염증 질환 (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID)/ 만성 영아 신경 피부 관절 증후군 (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular	○ Canakinumab 주사제 (품명: 일라리스주사액)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여 기준을 신설함.

		Syndrom, CINCA)로 확진된 경우 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가 시 질병 활성의 임상증상을 보이지 않으며 CRP 또는 SAA수치가 10 mg/L미만으로 유지되는 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 급여를 인정함. 나. 중양피사인자 수용체 관련 주기적 증후군 1) 투여대상 2세 이상 소아 및 성인에서 TNFRSF1A 유전자 변이가 확인된 경우로서 다음 가), 나) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 중등도-중증의 질병활성 임상증상 확인 나) CRP(C-reactive protein) 또는 SAA(serum amyloid A protein) 10 mg/L 이상 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가 시 질병 활성의 임상증상을 보이지 않으며 CRP 또는 SAA수치가 10 mg/L 미만으로 유지되는 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지	
--	--	--	--

- 5 -

		되면 지속적인 급여를 인정함. 다. 가족성 지중해 열 1) 투여대상 2세 이상 소아 및 성인에서 MEFV 유전자 변이가 확인된 경우로서 다음 가), 나), 다) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 중등도-중증의 질병활성 임상증상 확인 나) CRP(C-reactive protein) 또는 SAA(serum amyloid A protein) 10 mg/L 이상 다) 콜키신을 3개월간 투여 후에도 적절한 반응을 나타내지 않거나, 금기 또는 부작용으로 투여할 수 없는 경우 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가 시 질병 활성의 임상증상을 보이지 않으며 CRP 또는 SAA수치가 10 mg/L 미만으로 유지되는 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 급여를 인정함. 2. 동 약제는 최초 투여 시 투여대상, 지속투여 및 투여중단 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(진료기록부, 유전자검사결과지, 혈액검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함.	
--	--	--	--

- 6 -

※ 관련근거

- 1) Rheumatology. 8e. 2022.
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e
- 3) Fitzpatrick's Dermatology, 9e
- 4) Nelson Textbook of Pediatrics 21e
- 5) Recommendations for the management of autoinflammatory diseases. 2015. (SHARE; Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe)
- 6) 2021 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis
- 7) 대한소아청소년과학회(대소학 제 509호, 2022.7.21.)
- 8) 대한류마티스학회(대류학 제 2022-363, 2022.7.26.)
- 9) Lachmann HJ, et al. Use of canakinumab in the cryopyrin-associated periodic syndrome. N Engl J Med 2009;360:2416-25.
- 10) Nicolino Ruperto, et al. Two Randomized Trials of Canakinumab in Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis. N Engl J Med 2012;367:2396-406.
- 11) Brunne, Hermine I. et al. Efficacy and Safety of Canakinumab in Patients With Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis With and Without Fever at Baseline: Results From an Open-Label, Active-Treatment Extension Study Arthritis & Rheumatology Vol. 72, No. 12, December 2020, pp 2147-2158
- 12) CADTH_CANAKINUMAB (Ilaris - Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.) (2011.1.26)
- 13) PBAC_CANAKINUMAB, Powder for injection 150 mg with solvent Solution for injection 150 mg in 1 mL, Ilaris® (2017.11)
- 14) SMC_canakinumab (Ilaris ®) 150 mg powder for solution for injection (No: 882/13) (2013.5.10.)
- 15) NHS 2013/14 NHS STANDARD CONTRACT (2013)
- 16) CADTH_CANAKINUMAB (Ilaris - Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.) (2016.6.17.)
- 17) PBAC_CANAKINUMAB 150 mg vial, subcutaneous injection; Ilaris®(2015.3.)
- 18) NICE_Canakinumab for treating systemic juvenile idiopathic arthritis (terminated appraisal)(2013.11.27.)
- 19) SMC_canakinumab (Ilaris®) 150mg powder for solution for injection(No: 926/13)(2013.10.4.)
- 20) NHS Clinical Commissioning Policy Statement: Biologic Therapies for the treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) (2015.7.)

- 7 -

[별지 2]

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Dupilumab 주사제 (품명: 듀피젠프리필드 주300밀리그램 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정 하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 1) 성인 및 청소년 (생 략) 2) <u>소아 (만 6세-만 11세)</u> <u>1년 이상 증상이 지속되는 소아(만 6세 - 만 11세) 만성 중증 아토피피부염 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우</u> 가) 1차 치료제로 국소치료제(중등도 이상 의 코르티코스테로이드 또는 칼시뉴린	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정 하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 1) 성인 및 청소년 (현행과 같음) 2) <u>만 6세 - 만 11세</u> <u>1년 이상 증상이 지속되는 만성 중증 아토피피부염 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우</u> - 다 음 - 가) 1차 치료제로 국소치료제(중등도 이상 의 코르티코스테로이드 또는 칼시뉴린	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 만 6개월 이상 만 5세 이하 만성 중증 아토피피부염 환자에 급여 확대

- 8 -

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	저해제)를 4주 이상 투여하였음에도 적절히 조절되지 않거나, 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우 * 동 약제 투약개시일 4개월 이내에 국소 치료제 투여이력이 확인되어야 하며, 국소치료제 투여 시점에 EASI 21 이상이어야 함. 나) 동 약제 투여시작 전 EASI 21 이상 * 임상 사진 제출 필수: EASI 점수 측정 시 중증도 판단을 위한 환부사진이 확인되어야 함 <u>< 추 가 ></u> 나. ~ 바. (생 략)	저해제)를 4주 이상 투여하였음에도 적절히 조절되지 않거나, 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우 * 동 약제 투약개시일 4개월 이내에 국소 치료제 투여이력이 확인되어야 하며, 국소치료제 투여 시점에 EASI 21 이상이어야 함. 나) 동 약제 투여시작 전 EASI 21 이상 * 임상 사진 제출 필수: EASI 점수 측정 시 중증도 판단을 위한 환부사진이 확인되어야 함 <u>3) 만 6개월 - 만 5세</u> <u>만성 중증 아토피피부염 환자로서 상기 2)의 가), 나)의 조건을 모두 만족하는 경우</u> 나. ~ 바. (현행과 같음)	

※ 관련근거

1. Paller and Mancini, Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology, 6e, 2022, Chapter 3. Eczematous Eruptions in childhood

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
2. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022, Chapter 57: Eczema, Psoriasis, Cutaneous Infections, Acne, and Other Common Skin Disorders			
3. Fitzpatrick's Dermatology, 9e, 2019, Chapter 22: Atopic Dermatitis			
4. Nelson Textbook of Pediatrics, 21e, 2020, Chapter 170. Atopic Dermatitis (Atopic Eczema)			
5. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I - systemic therapy, part II: non-systemic treatments and treatment recommendations for special AE patient populations, 2022			
6. 소아청소년 아토피피부염 진료지침, 2023년 개정판, 대한소아알레르기호흡기학회			
7. Consensus Update for Systemic Treatment of Atopic Dermatitis (KADA), Annals of Dermatology 2021;33(6):497-514			
8. Lawrence F et al. Recent Developments and Advances in Atopic Dermatitis: A Focus on Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment in the Pediatric Setting, 2022			
9. 소아 아토피피부염의 최신 치료, 2021			
10. ETFAD/EADV Eczema task force 2020 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adults and children			
11. Paller AS et al. Dupilumab in children aged 6 months to younger than 6 years with uncontrolled atopic dermatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022 Sep 17;400(10356):908-919.			
12. Paller AS et al. Efficacy and Safety of Dupilumab Treatment up to 1 Year in Infants and Preschool Children With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. Presented at Revolutionizing Atopic Dermatitis(RAD) Virtual Conference - December 11, 2022			
13. Paller AS et al. Laboratory Safety from a Randomized 16-Week Phase III Study of Dupilumab in Children Aged 6 Months to 5 Years with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. Paediatr Drugs. 2023 Jan;25(1):67-77.			
14. Koskeridis F et al. Treatment With Dupilumab in Patients With Atopic Dermatitis: Systematic Review and Meta-Analysis. J Cutan Med Surg. 2022 Nov-Dec;26(6):613-621.			
15. Paller AS et al. Efficacy and safety of dupilumab with concomitant topical corticosteroids in children 6 to 11 years old with			

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
severe atopic dermatitis: A randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2020 Nov;83(5):1282-1293.			

[212] 부정맥용제				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[212] Dronedarone 경구제 (품명: 멀택정)	(생 략)	[212] Dronedarone 경구제 (품명: 멀택정 <u>등</u>)	(현행과 같음)	○ ‘삼진드론정’이 신규 등재 예정임에 따라, 기존 Dronedarone 경구제 급여기준과 동일하게 적용하도록 함. 단, 고시 구분의 품명에 ‘등’ 추가하는 것이 적절함.
※ 관련근거				

[212] 부정맥용제				
현행		개정(안)		사유
구분	세부인정기준 및 방법	구분	세부인정기준 및 방법	
＜요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항＞				

[394] 통풍치료제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[394] Colchicine 경구제 (품명: 콜킨정 등)	1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여함을 원칙으로 함. 2. 허가사항 범위(효능·효과)를 초과하여 베켓증후군에도 요양급여를 인정함.	1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여함을 원칙으로 함. 2. 허가사항 범위(효능·효과)를 초과하여 <u>아래와 같은 기준으로</u> 투여 시 요양급여를 인정함. 	

[394] 통풍치료제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		2) 투여방법: 4~6세: 0.3 ~ 1.8 mg/일 6~12세: 0.9 ~ 1.8 mg/일 12세 이상: 1.2 ~ 2.4 mg/일 3) 평가: 3~6개월 단위로 발작 주기와 중증도로 치료효과를 평가하고, 혈구수, CRP, Serum amyloid A, 간기능, 신기능 등을 모니터링하여 지속투여 여부를 결정함.	

※ 관련근거

1. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e > Chapter 369: Familial Mediterranean Fever and Other Hereditary Autoinflammatory Diseases
2. GeneReviews® > Familial Mediterranean Fever
3. StatPearls® > Familial Mediterranean Fever
4. Current Medical Diagnosis & Treatment 2023 > 15-11: Familial Mediterranean Fever
5. EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis 2016;75:644 - 651.
6. Evidence-based recommendations for genetic diagnosis of familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis 2015;74:635 - 641.
7. Guidelines for the management and treatment of periodic fever syndromes familial Mediterranean fever. Rev Bras Rheum 2016;56(1):37 - 43
8. Egyptian evidence based consensus on clinical practice recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Egyptian Rheum and Rehabilitation 2022;49:39
9. Yin X et al, Interventions for reducing inflammation in familial Mediterranean fever (Review), Coch Data Sys Rev 2022;(3):CD010893.

[394] 통풍치료제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
			10. CA Dinarello et al, Colchicine therapy for familial mediterranean fever a double-blind trial, N Engl J Med 1974;291:934-7. 11. R.C. Goldstein and A.D. Schwabe, Prophylatic colchicine therapy in familial mediterranean fever a controlled, double-blind trial, Ann Int Med 1974;81:792-4. 12. D. Zemer et al, Prophylatic colchicine therapy in familial mediterranean fever a controlled, double-blind trial, N Engl J Med 1974;291:932-4. 13. D. G. Wright et al, Efficacy of Intermittent Colchicine Therapy in Familial Mediterranean Fever, Ann Int Med 1977;86:162-5. 14. M. H. Barakat et al, Familial Mediterranean Fever (Recurrent Hereditary Polyserositis) in Arabs - A Study of 175 Patients and Review of the Literature, Quart J Med 1986;233:837-47. 15. E. Ben-Chetrit & M. Levy, Colchicine Prophylaxis in Familial Mediterranean Fever: Reappraisal After 15 years, Sem Art Rheum 1991;20:241-6. 16. H. A. Majeed & M. Barakat, Familial Mediterranean fever (recurrent hereditary polyserositis) in children: analysis of 88 cases, Eur J Pediatr 1989;148:636-41. 17. H. A. Majeed et al, Familial Mediterranean fever in children: the expanded clinical profile, Q J Med 1999;92:309-18. 18. D Zemer et al, Colchicine in the prevention and treatment of the amyloidosis of familial mediterranean fever, N Engl J Med 1986;314:1001-5.