

ADENOSINE

6 mg/2 ml, 2 ml/amp

ข้อบ่งใช้

วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67
โดย: คกก.พัฒนาระบบยา
รพ.กรุงปิ่น

ข้อบ่งใช้ : paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT)

การผสมยา :

ไม่ต้อง DILUTE สามารถให้ยาตามขนาดที่ต้องการได้ทันที หากตกตะกอน ห้ามใช้ยานั้น

ความคงตัว:

เปิดใช้แล้วทิ้งทันที

ขนาดและข้อบ่งใช้ :

ผู้ใหญ่:

- 6 mg (2 ml) IV push ภายใน 1 – 2 วินาที และตามด้วย NSS flush 20 ml หากไม่ conversion ภายใน 1-2 นาที ให้ยาอีก 12 mg (4 ml) IV push ภายใน 1-2 วินาที จนกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจกลับมาปกติ ; Max 12 mg/dose

เด็ก:

- BW < 50 kg: 0.05 – 0.1 mg/kg/dose (max 6 mg/dose) IV push และตามด้วย NSS flush 5-20 ml หากไม่ conversion ภายใน 1-2 นาที ให้อีก 0.05 – 0.1 mg/kg/dose จนกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจกลับมาปกติ; Max single dose 0.3 mg/kg
- BW ≥ 50 kg: 6 mg (2 ml) IV push ภายใน 1 – 2 วินาที และตามด้วย NSS flush 5-20 ml หากไม่ conversion ภายใน 1-2 นาที ให้ยาอีก 12 mg (4 ml) IV push ภายใน 1-2 วินาที จนกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจกลับมาปกติ ; Max 12 mg/dose

การบริหารยา :

บริหารโดยใช้ **DOUBLE SYRINGE TECHNIQUE**

ให้ยาผ่านเส้นเลือดที่ใกล้หัวใจที่สุดโดย

- เปิดเส้นใกล้ๆหัวใจ เช่น ข้อพับแขน
- ติด MONITOR EKG
- RAPID IV PUSH IN 1-3 SECOND และ FLUSH ด้วย NSS 5-20 ML ผ่าน 3-WAY**
- หลังฉีดยา ยกแขนข้างที่ฉีดให้สูงขึ้น “ห้ามให้ LOWER ARM, HAND, LOWER LEG, FOOT”

การติดตาม :

ติดตาม BP, HR

- ทันทีหลังเริ่มให้ยา
- หลังจากนั้นทุก 2 นาที X 3 รอบ

แจ้งแพทย์เมื่อ

- BP < 90/60 MMHG
- HR < 60 BPM
- อาการข้างเคียง: ใบหน้าร้อนวูบวาบ, หัวใจเต้นช้า