

ADRENALINE

1 mg/ml , 1ml/amp

อะดรีนาลีน



วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67
โดย: คกก.พัฒนาระบบยา
รพ.กรุงปิ่น

ข้อบ่งใช้ : cardiopulmonary resuscitation, Anaphylaxis

การผสมยา : ห้ามผสมกับ AMINOPHYLLINE, SODIUM BICARBONATE, สารละลายต่าง

- IV SLOW PUSH : ต้องเตรียมเป็น 1: 10,000 ดังนี้ ยา 1 MG (1 AMP) เจือจางด้วย NSS 9 ML
- IM,SC : ไม่ต้องเจือจาง

ความคงตัว:

หลังจากเจือจางยาสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือตู้เย็นได้ 24 ชั่วโมง

ขนาดและข้อบ่งใช้ :

- For cardiopulmonary resuscitation : 1 mg IV ให้ซ้ำได้ ทุก 3 - 5 นาที
- Anaphylaxis :
 - IM/SC (1:1,000) = 0.3 – 0.5 mg ให้ซ้ำได้ ทุก 5 – 10 นาที
 - IV bolus (1:10,000) if arrest during anaphylaxis = 1 mg ให้ซ้ำได้ ทุก 3 - 5 นาที

สารน้ำที่เข้ากันได้: D5W, NSS

แจ้งแพทย์เมื่อ

- Adult : BP > 160/100 mmHg , HR >120/min
- เด็ก : BP > 120/80, HR > 180 /min
- ผิวซีดหรือเขียว

การติดตาม :

V/S

- CPR : ติดตามทันทีเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีชีพจร ปรับขนาดและการติดตามตามแนวทาง ACLS
- Anaphylaxis : ทุก 10 นาที x 3 ครั้ง

อาการข้างเคียง :

- **Peripheral Ischemia** : ผิวซีดเย็นหรือเขียว ติดตามทุก 1 ชั่วโมง การป้องกัน: ให้อัตราเร็ว > 5 min
- **Extravasation** : บริเวณที่ฉีดยาบวมแดง หรือซีดขาว ติดตามทุก 1 ชั่วโมง
การแก้ไข: เปลี่ยนตำแหน่งการให้ยา