

Atropine inj.

0.6 mg/ml, amp

อีโอบูลยา



วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67

โดย: คกก.พัฒนาระบบยา
รพ.กรุงปิ้ง

ข้อบ่งใช้ : หัวใจเต้นช้า (bradycardia) ภาวะหัวใจหยุดนิ่ง (asystole) หลอดลมตีบ (bronchospasm), Organophosphate poisoning

ขนาดยาเริ่มต้นและการบริหารยา :

ผู้ใหญ่

- **Asystole** : IV 1 mg ซ้ำได้ ทุก 3 – 5 นาที
- **Bradycardia** : IV 0.5 – 1 mg ทุก 5 นาที ขนาดยารวมไม่เกิน 3 mg หรือ 0.04 mg/kg

เด็ก

- 0.01 - 0.05 mg/kg/dose ไม่เกิน 0.5 mg IV ให้ซ้ำได้ตามความจำเป็น

การผสมยา: ห้ามผสมกับ Sodium bicarbonate, Norepinephrine (Levophed)

- ให้ยา IV อย่างรวดเร็ว *** การให้ยาช้าๆ หรือขนาดยาน้อยกว่า 0.5 mg(ในผู้ใหญ่) หรือ 0.1 mg (ในเด็ก) อาจทำให้เกิด paradoxical bradycardia***
- IM/SC ให้โดยไม่ต้องเจาะจง
- IV ให้โดยไม่ต้องเจาะจง แต่ flush ด้วย NSS 5-10 ml

สารน้ำที่เข้ากันได้: D5W , NSS

ความคงตัว: ยาที่ผสมแล้ว เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศา ได้ 24 ชั่วโมง
ถ้ายาเปลี่ยนสี หรือมีตะกอน ห้ามใช้เด็ดขาด

การติดตาม :

- HR, BP, RR >> ก่อนให้ยาฉีด, ทุก 15 นาที x 3 ครั้ง และต่อไปทุก 4 ชม.

อาการข้างเคียง :

- ปากแห้ง-คอแห้ง
- ตาพร่ามัว
- ปัสสาวะคั่ง
- รุนานตาขยายและการปรับสภาพตาเสียไป

แจ้งแพทย์เมื่อ :

- BP> 160/90 mmHg
- HR > 120/min,
- Mental status : หลับแล้ว
ปลุกตื่นยาก, ตื่นแล้วไม่
ค่อยรู้สึกตัว, ไม่รู้สึกตัว