

Calcium gluconate

10%, 1g/10 ml; amp

ข้อบ่งใช้



วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67

โดย: คกก.พัฒนาระบบยา
รพ.กรุงปิ่น

ข้อบ่งใช้ : Hypocalcemia, Hyperkalemia

ขนาดยาเริ่มต้นและการบริหารยา : ให้ ทางหลอดเลือดดำ (IV) เท่านั้น ห้าม IM/SC

Hyperkalemia จาก cardiac toxicity (มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG)

- Infants and children: 60-100 mg/kg/dose
- Adult: 0.5-1g (5-10 ml) IV push ช้าๆ (2-5 min) max: 3g หรือ 30 ml

Hypocalcaemia

- Neonates: 200-800 mg/kg/day IV continuous infusion หรือ แบ่งให้ 4 ครั้ง (max: 1 g/dose)
- Infants and Children: 200-500 mg/kg/day IV continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง (max: 2-3 g/dose)
- Adult: IV 2-15 g/24 hr แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง

การผสมยา: ห้ามผสมกับ Bicarbonates, Carbonates, Phosphates, Sulfates, Clindamycin Phosphate, Amphotericin B

- IV เท่านั้น ทั้ง Direct IV (over 5 -10 min) หรือ Infusion (rate 50 mg/ml นานกว่า 1 hr หรือไม่เกิน 120-240 mg/kg/hr หรือ 0.6-1.2 mEq/kg/hr)
- ห้ามบริหารยาแบบ SC หรือ IM เพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ ตาย
- ให้ยาทางเส้นเลือดใหญ่และแยกเส้นการให้กับยาอื่น เพราะอาจตกตะกอน

สารน้ำที่เข้ากันได้: SWI, D5W เท่านั้น ห้ามผสมใน NSS จะทำให้ Ca ขับออกเร็ว

ความคงตัว: ยาที่ผสมแล้ว เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศา ได้ 24 ชั่วโมง

การติดตาม :

- HR, BP, ทุก 15 นาที x 2 ครั้ง และต่อไปทุก 4 ชม.
- EKG ขณะให้ยา
- อาการ Ca^{2+} ต่ำ: ชัก กระตุก ปากเปี้ยว นั้วชา กล้ามเนื้อเป็นตะคริว

แจ้งแพทย์เมื่อ :

- อาการของ Ca สูง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ท้องผูกอย่างมาก
- Serum Ca <8.5 หรือ >10.5 mg/dL - EKG มี arrhythmia
- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 bpm