

Glucose

50%, 25g/50 ml; vial

ข้อมูลยา



วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67
โดย: คกก.พัฒนาระบบยา
รพ.กรุงปิ่น

ข้อบ่งใช้ : ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดระดับรุนแรง (severe hypoglycemia)

ขนาดยาเริ่มต้นและการบริหารยา :

- IV push 10-20 ml อย่างเร็ว ต่อด้วย 30-40 ml ที่เหลือ
- อัตราการให้ยาแบบ infusion :
 - Adult 500 mg/kg/hr. max rate ไม่เกิน 800 mg/kg/hr.
 - Children:
 - Hypoglycemia 1-2 ml diluted in WFI (1:1) per kg.
 - Hyperkalemia 2 ml per kg + insulin 0.1 u/ kg.

ความเสี่ยงทำให้เกิด phlebitis เนื่องจากมีความเข้มข้นของ dextrose > 10%

การผสมยา:

- IV push ช้าๆ: ไม่ต้อง dilute ยา

สารน้ำที่เข้ากันได้: NSS, NSS/2

ความคงตัว: ใช้แล้วทิ้ง ***กรณียาที่ยังไม่เปิดใช้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ สามารถใช้ได้ แต่หากตกตะกอนห้ามใช้

การติดตาม :

- ความรู้สึกตัวของผู้ป่วย
- อาการทางคลินิกของภาวะน้ำตาลต่ำ ได้แก่ ใจสั่น รู้สึกหิวรู้สึกร้อน เหงื่อออก มือสั่น หัวใจเต้น เร็วความดันเลือดซิสโตลิกสูง รู้สึกกังวล คลื่นไส้และอาาการ มองขาดกลูโคส ได้แก่ อ่อนเพลีย มึนงง ปวดศีรษะ

อาการข้างเคียง :

- อาจเกิดอาการเจ็บปวด , ระคายเคืองหลอดเลือด , หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณให้ยา
- เกิดอาการ ไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย บวม
- โพแทสเซียมในเลือดต่ำ

แจ้งแพทย์เมื่อ :

- ความรู้สึกตัวลดลง
- เกิด phlebitis