

Sodium Bicarbonate

7.5%, 44.6 mEq/50 ml

ข้อบ่งใช้



วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67

โดย: คกก.พัฒนาระบบยา

รพ.กรุงปิ่น

ข้อบ่งใช้ : Cardiac arrest, Cardiotoxicity, Urine alkalinization, Metabolic acidosis, Hyperkalemia

ขนาดยาเริ่มต้น : Cardiac arrest

- Adult: IV bolus: 1 mEq/kg/dose ให้ยาซ้ำได้โดยดูจากค่าArterial blood gas
- Children: IV bolus: 1 mEq/kg/dose ให้ยาซ้ำได้โดยดูจากค่าArterial blood

Metabolic acidosis

- Adult, Children: IV infusion: ขนาดยาคำนวณได้จากสูตร HCO_3^- (mEq) = $0.5 \times \text{weight (kg)} \times [\text{desired increase in serum HCO}_3^- \text{ (mEq/L)}]$ หรือ HCO_3^- (mEq) = $0.5 \times \text{weight (kg)} \times [24 - \text{serum HCO}_3^- \text{ (mEq)}]$

Hyperkalemia

- Adult: IV bolus: 50 mEq ใน 5-10 min หลังจากนั้นให้ 100 ml in D5W 500 ml in 2-4 hr

การผสมและบริหารยา: ห้ามผสมกับ : ATROPINE , CALCIUM SALTS , DOPAMINE

- ก่อนและหลังให้ยา flush สารน้ำทุกครั้ง
- Direct IV ในผู้ใหญ่และเด็ก ไม่จำเป็นต้องเจือจาง (1 mEq/ml) หรือ
- เด็กอายุ < 2 ปี: ให้เจือจางยาใน SWFI อัตราส่วน 1:1 (ความเข้มข้น 0.5 mEq/ml) ให้ยาซ้ำ ๆ ในอัตราเร็ว 5 mEq/min Max: 10mEq/min

อัตราการให้ยา :

- IV Push 5 -10 นาที กรณี cardiac arrest ให้ภายใน 1-3 นาที
- IV Infusion ใช้เวลา 4-8ชม. ไม่ควรให้มากกว่า 50 mEq/hr

สารน้ำที่เข้ากันได้: D5S, D5 N/2 , D5W, NSS

ความคงตัว: ยาที่เปิดแล้วให้ทิ้งทันที ยาที่เจือจางแล้ว เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศา หรือ 25 องศา ได้ 24 ชั่วโมง, ห้ามใช้ยาเมื่อสังเกตเห็นตะกอน

การติดตาม :

- serum HCO_3^- , K, calcium
- pH
- BP, HR ทุก 5 นาที*3 ครั้ง และ ทุก 15 นาที*1 ครั้ง

การแก้ไข

- Severe alkalosis: ให้หยุดยา อาจให้ calcium gluconate
- Hypernatremia: ให้ยาขับปัสสาวะและน้ำ
- Tetany : อาจให้ calcium gluconate
- ภาวะชัก: Diazepam inj 0.1 - 0.25 mg/kg/dose

แจ้งแพทย์เมื่อ :

- Heart rate > 100 /min หรือ < 60 /min หรือผู้ป่วยบ่นใจสั่น
- BP < 90/60 หรือ > 140/100 mmHg