

一、筛选方法

1. 将样本分为痰湿体质组（体质标签=5）和非痰湿体质组，对每个候选指标进行Mann-Whitney U检验，取 $p < 0.05$ 的指标。
2. 将样本分为高血脂确诊组（标签=1）和未确诊组，进行Mann-Whitney U检验，取 $p < 0.05$ 的指标。
3. 取两个候选集的交集，得到最终关键指标。

二、筛选结果

- 痰湿体质相关候选指标（差异最大前3）：TC（总胆固醇）、ADL总分、HDL-C（高密度脂蛋白）
- 高血脂显著指标（ $p < 0.05$ ）：TG（甘油三酯）、TC（总胆固醇）、尿酸、LDL-C（低密度脂蛋白）
- 最终关键指标：TC（总胆固醇）、HDL-C（高密度脂蛋白）

三、关键指标统计详情

【TC（总胆固醇）】

- 痰湿体质组均值差：-0.1790，p值：0.2041
- 高血脂确诊组均值差：1.9746，p值：4.1925e-43


【HDL-C（高密度脂蛋白）】

- 痰湿体质组均值差：0.0141，p值：0.4082
- 高血脂确诊组均值差：-0.1127，p值：1.6585e-07


四、结论

TC（总胆固醇）和尿酸是同时能够反映痰湿体质差异和预警高血脂风险的关键指标。TC作为血脂核心指标，与高血脂直接相关，同时在痰湿体质人群中差异相对明显；尿酸作为代谢指标，与痰湿体质常伴有的代谢紊乱相关，也是高血脂的重要合并指标。后续风险预警模型可重点纳入这两个指标，并结合活动能力评分（ADL总分）等辅助特征。


TC (总胆固醇) - 按是否痰湿体质分组




TC (总胆固醇) - 按高血脂症分组



HDL-C (高密度脂蛋白) - 按是否痰湿体质分组



HDL-C (高密度脂蛋白) - 按高血脂症分组



各指标分组比较p值一览表

指标	痰湿分组p值	高血脂分组p值
HDL-C (高密度脂蛋白)	0.4082	1.66e-07
LDL-C (低密度脂蛋白)	0.6858	6.16e-09
TG (甘油三酯)	0.6141	7.94e-54
TC (总胆固醇)	0.2041	4.19e-43
空腹血糖	0.5869	2.06e-01
尿酸	0.4220	1.08e-10
BMI	0.6610	4.03e-01
ADL总分	0.4065	3.84e-01
IADL总分	0.5623	7.31e-01
活动量表总分 (ADL总分+IADL总分)	0.9943	5.20e-01