

Recall last time:

Parseval's thm: $\|f\|^2 = \|A_0\|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \|A_n \cos n + B_n \sin n\|^2 = A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (A_n^2 + B_n^2)$

$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f|^2$

mean square error: $\sigma_N^2 = \|f - f_N\|^2 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f - f_N|^2$

$\Rightarrow \sigma_N^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=N+1}^{\infty} (A_n^2 + B_n^2)$ by Parseval's thm

Today:

(1) Parseval's Thm for complex Fourier series $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{inx}$

$\|f\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \|a_n\|^2$ (by inner product $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f \bar{g}$)

or $\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2$

计算 $\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f \bar{f} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L \left(\sum_n a_n e^{inx} \right) \left(\sum_m \bar{a}_m e^{-imx} \right)$

$= \frac{1}{2L} \sum_{n,m} a_n \bar{a}_m \int_{-L}^L e^{i(n-m)x} dx$

$= \sum_{n,m} a_n \bar{a}_m \delta_{nm} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2$

Thm Parseval for cosine, sine

cos: $f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos n$, $\|f\|^2 = \|A_0\|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \|A_n\|^2$

or $\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f|^2 = A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2$

sin: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin n$, $\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f|^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} B_n^2$ (computational pt in hw)

Specially, for hyperplane $u = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{bmatrix} : a_1 x_1 + \dots + a_d x_d = 0 \right\}$

$\forall p \in u$, $\vec{n}_p = \nabla F(p) = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_d \end{bmatrix}$

$(\dim(\vec{n}_p) + \dim(T_p M) = \dim(\mathbb{R}^d) = d)$

Def Boundary condition

Given PDE $F[u] = 0$ defined on a domain R

本条 only consider 以下 3 种 boundary conditions:

1. Dirichlet boundary condition

已知 $u = g(x)$, $x \in \partial R$ (边界点的值)

2. Neumann boundary condition

已知 $n_x \nabla u(x) = g(x)$, $x \in \partial R$ (边界点的 normal derivative)

3. Robin boundary condition

已知 $a(x)u + b(x)n_x \nabla u(x) = g(x)$, $x \in \partial R$ (以上两种各一个 linear comb)

note: $n_x \nabla u = n_1 \frac{\partial}{\partial x_1} u + \dots + n_d \frac{\partial}{\partial x_d} u$

$= D_{\vec{n}} u$

$n \nabla u$ 就是 u 在 \vec{n} 方向上的 directional derivative.

today (2): PDE in rectangular coordinates

ex 一个 ODE boundary value problem

$u'' = 1$, $x \in [0, 1]$

$u(0) = 0$, $u(1) = 0$

Sol 1. General sol: $u(x) = \frac{1}{2}x^2 + Ax + B$

2. Match with B.C.

$u(0) = 0 \Rightarrow B = 0$

$u(1) = 0 \Rightarrow A = -\frac{1}{2} \Rightarrow u(x) = \frac{1}{2}x(x-1)$

ODE 的 B.V. problem 即确定常数 (范围)

Now for PDE:


Def Normal vector

for $p \in M$ a manifold

p 的 normal vector 是

p 在 M 上的 tangent space $T_p M$

垂直的 vector n



note: 如果 M embedded into \mathbb{R}^d , $\dim(M) = d-1$

take $p \in \partial M$, $\dim(T_p M) = \dim(M)$

令 ∂M 在 p 附近的方程为 $F(x_1, \dots, x_d) = 0 \Rightarrow$

$p \in u = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{bmatrix} : F(x_1, \dots, x_d) = 0 \right\} \subseteq \partial M$


\Rightarrow 可取 $\vec{n}_p = \nabla F(p)$ 得到 normal vector \vec{n}_p



ex heat equation

$u_t = k u_{xx}$, defined on $R = \{(x, t) | x \in (0, L), t \in (0, \infty)\}$

$\partial R = \{(0, t) | t > 0\} \cup \{(L, t) | t > 0\} \cup \{(x, 0) | x \in (0, L)\}$



如果我们在这上面 impose 个 Robin BC

这上面 impose 个 Dirichlet BC

则这个 PDE BVP 的形式即:

(PDE)

$\partial_t u = k \partial_{xx} u$, $t > 0$, $0 < x < L$

$u(x, 0) = g(x)$, $x \in (0, L)$, $t = 0$ (Dirichlet's BC)

$a(x, t)u + b(x, t)\vec{n} \cdot \nabla u = g(x, t)$, $x = 0, L$, $t > 0$

(Robin's BC)

$D_{\vec{n}} u(x, t)$

note: $\nabla u = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial t} \end{pmatrix}$

On $x=0$, 可取 $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ ③ 转为 $a(0, t)u - b(0, t)\frac{\partial u}{\partial x} = g(0, t)$

On $x=L$, 可取 $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ ② 转为 $a(L, t)u + b(L, t)\frac{\partial u}{\partial x} = g(L, t)$

因 $a(t)$, $b(t)$, $g(t)$ 来表示 $a(0, t)$, $b(0, t)$ 和 $g(0, t)$

$\alpha(t)$, $\beta(t)$, $\gamma(t)$ 来表示 $a(L, t)$, $b(L, t)$ 和 $g(L, t)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} u = K \frac{\partial^2}{\partial x^2} u, & \text{I} \\ a(t)u - b(t) \frac{\partial}{\partial x} u = g(t), & \text{I} \\ \tilde{a}(t)u + \tilde{b}(t) \frac{\partial}{\partial x} u = \tilde{g}(t), & \text{I} \\ u = f(x), & \text{I} \end{cases}$$

ex simple case where $\alpha = \beta = 0 \Rightarrow u(0,t) = u(L,t) = 0, \forall t$.

Def 如果 $a(t) = a, b(t) = b, \tilde{a}(t) = \tilde{a}, \tilde{b}(t) = \tilde{b}$
for some constants $a, b, \tilde{a}, \tilde{b}$

$$\underline{A \tilde{g}(t) = g(t) = 0}$$

则称这个 PDE BV 方程组 homogeneous

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} u = K \frac{\partial^2}{\partial x^2} u, & \text{I} \\ au - b \frac{\partial}{\partial x} u = 0, & \text{I} \\ \tilde{a}u + \tilde{b} \frac{\partial}{\partial x} u = 0, & \text{I} \\ u = f(x), & \text{I} \end{cases}$$

对于 homogeneous 的 PDE BV 方程组

可取某个 α, β 使得 $a = \cos \alpha, b = L \sin \alpha, \tilde{a} = \cos \beta, \tilde{b} = L \sin \beta$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} u = K \frac{\partial^2}{\partial x^2} u, & \text{I} \\ u \cos \alpha - \frac{\partial}{\partial x} u L \sin \alpha = 0, & \text{I} \\ u \cos \beta + \frac{\partial}{\partial x} u L \sin \beta = 0, & \text{I} \\ u = f(x), & \text{I} \end{cases}$$