

例 0.0.1

$\mathcal{I}$  を **Set** から **Set** への恒等関手とする. 集合  $X$  に対して,  $\mathcal{D}(X) := X \times X$ , 集合間の写像  $f : X \rightarrow Y$  に対して  $\mathcal{D}(f) := f \times f$  ( $(f \times f)(x, x') := (f(x), f(x'))$ ) とすると,  $\mathcal{D}$  は **Set** から **Set** への関手となる. すなわち,

$$\begin{array}{lll} \mathcal{D}: & \mathbf{Set} & \longrightarrow \mathbf{Set} \\ \text{対象の対応:} & X & \longmapsto X \times X \\ \text{射の対応:} & f & \longmapsto f \times f \\ & & ((f \times f)(x, x') := (f(x), f(x'))) \end{array}$$

である. 各  $X \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  に対して **Set** の射  $\delta_X : \mathcal{I}(X) \rightarrow \mathcal{D}(X)$  を

$$\begin{array}{ccc} \delta_X: & X & \longrightarrow X \times X \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & x & \longmapsto (x, x) \end{array}$$

とさだめ, その族を  $\delta : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{D}$  とする. すると, **Set** の任意の射  $f : X \rightarrow Y$  に対して,

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f) \circ \delta_X(\mathcal{I}(X)) &= \{(f(x), f(x)) : x \in \mathcal{I}(X)\} \\ &= \delta_Y \circ \mathcal{I}(f)(\mathcal{I}(X)) \end{aligned}$$

であるため,  $\mathcal{D}(f) \circ \delta_X = \delta_Y \circ \mathcal{I}(f)$ . よって  $\delta$  は自然変換である.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I}(X) & \xrightarrow{\delta_X} & \mathcal{D}(X) & & \\ \mathcal{I}(f) \downarrow & \circlearrowleft & \downarrow \mathcal{D}(f) & & \\ \mathcal{I}(Y) & \xrightarrow[\delta_Y]{} & \mathcal{D}(Y) & & \end{array}$$