

# Übung 1

Max Wisniewski, Alexander Steen

## Aufgabe 1.

Im Folgenden werden zwei Vorhergehensweisen angegeben, wie man den Algorithmus von Strassen zur Multiplikation zweier  $n \times n$  Matrizen verwenden kann, falls  $n$  nicht unbedingt eine Zweierpotenz ist.

Bestimmen Sie die jeweilige Laufzeit einschließlich der Konstante im signifikantesten Term genau und berechnen Sie, für welche  $n$  diese Algorithmen weniger Operationen als die klassische Methode benötigen.

(a)

Die Matrizen werden bis zur nächsten Zweierpotenz geeignet aufgefüllt.

**Lösung:**

tbd

(b)

Ist  $n$  gerade so führt man einen Rekursionsschritt nach Strassen aus. Andernfalls zerlegt man

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

wobei  $A_{11}$  und  $B_{11}$   $(n-1) \times (n-1)$ -,  $A_{12}$  und  $B_{12}$   $(n-1) \times 1$ -,  $A_{21}$  und  $B_{21}$   $1 \times (n-1)$ - und  $A_{22}$  und  $B_{22}$   $1 \times 1$ - Matrizen sind.

Dann berechnet man  $AB$  in der Aufteilung, wie bei der klassischen Multiplikation von  $2 \times 2$  Matrizen, wobei  $A_{11}B_{11}$  rekursiv, die übrigen Produkte klassisch berechnet werden.

**Lösung:**

tbd

## Aufgabe 2.

(a)

Zeigen Sie, dass die Multiplikation von  $n \times n$ - Matrizen mit  $O(I(n))$  Operationen durchführbar ist, falls man mit  $I(n)$  Operationen Matrizen invertieren kann.

**Lösung:**

Zur Multiplikation den Matrizen  $A, B$  betrachten wir das folgende Inverse einer  $3n \times 3n$ -Matrix  $M$ :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1_n & A & 0_n \\ 0_n & 1_n & B \\ 0_n & 0_n & 1_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1_n & -A & AB \\ 0_n & 1_n & -B \\ 0_n & 0_n & 1_n \end{pmatrix} \quad (1)$$

Wir sehen also in Gleichung (3), dass durch Invertierung der Matrix  $M$  das Produkt  $AB$  in der oberen rechten Ecke enthalten ist. Damit gilt  $M(n) = I(3n)$ , wobei  $M(n)$  die Kosten der Multiplikation darstellt. Eine Abschätzung erhalten wir durch Nutzung der Abschätzung (\*):  $I(n) = O(n^3)$ . Dann gilt:

$$M(n) = I(3n) \stackrel{(*)}{\leq} 9c \cdot I(n) = O(I(n)) \quad (2)$$

(b)

Zeigen Sie, dass die Multiplikation von  $n \times n$ -Matrizen mit  $O(S(n))$  Operationen durchführbar ist, falls man mit  $S(n)$  Operationen Matrizen quadrieren kann.

**Lösung:**

Zur Multiplikation der Matrizen  $A, B$  betrachten wir die gleiche  $3n \times 3n$ -Matrix  $M$  wie in a):

$$M^2 = \begin{pmatrix} 1_n & A & 0_n \\ 0_n & 1_n & B \\ 0_n & 0_n & 1_n \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1_n & 2A & AB \\ 0_n & 1_n & 2B \\ 0_n & 0_n & 1_n \end{pmatrix} \quad (3)$$

Wieder steht das Produkt  $AB$  oben rechts. Es gilt also wieder  $M(n) = S(3n)$ . Auch für Quadrieren gilt die Abschätzung  $S(n) = O(n^3)$ , also:

$$M(n) = S(3n) \leq 9c \cdot S(n) = O(S(n)) \quad (4)$$

### Aufgabe 3.

Bei der Multiplikation Boolescher Matrizen wird  $+$  durch  $\vee$  und  $\cdot$  durch  $\wedge$  ersetzt. Strassens Algorithmus ist nicht direkt anwendbar, da  $(\{0, 1\}, \vee, \wedge)$  kein Ring ist.

Zeigen Sie, dass die Boolesche Matrizenmultiplikation mit  $O(n^{\omega+\varepsilon})$  Operationen aus  $\{\vee, \wedge, \neg\}$  für jedes  $\varepsilon > 0$  möglich ist, wenn die Matrizenmultiplikation für ganze Zahlen mit  $O(n^\omega)$  arithmetischen Operationen möglich ist.

**Lösung:**

tbd