

Max Wisniewski , Alexander Steen

Tutor: Sebastian Scherer

Aufgabe 1

Aufgabe 2

```

1 function [ x, t ] = theta_lin(theta, lambda, f, x0, T, tau )
2 %theta_lin approximiert das AWP
3 %AWP x' = lambda*x+f, x(0) = x0 mit einem
4 %aequidistanten Gitter 0 = t0 < t1 < ... < tn = T
5 %mit Hilfe des Theta-Verfahrens fuer Eingabe theta.
6
7 x(1) = x0;
8 t = 0:tau:T; %% Gitter mit Abstand tau
9
10 for k = 1:size(t,2)-1,
11     x(k+1) = ((x(k)*lambda*tau)*(1 - theta) + x(k) + (f((k-1)*
12         tau)*tau)*(1+theta)+ theta*tau*f(k*tau)))/(1-tau*lambda*
13         theta);
14 % f(k*tau) ist f(t_k+1)...
15 end
16 end

```

Funzt gut! :D

- a) Sei nun $f(t) = 4\pi \cos(4\pi t) - \lambda \sin(4\pi t)$, $\lambda = -1$, $x_0 = 1$ und $T = 2$ und die Schrittweite $\tau = T/100 = 0.02$.

(1) Exakte Lösung des AWP:

$$x(t) = e^{-t} + \int_0^t f(x)e^{-t+x} dx = e^{-t} + e^{-t} \int_0^t f(x)e^x dx$$

Das Integral lösen wir nun durch partielle Integration, dazu bilden wir die ersten beiden Ableitungen von f , die wir in der partiellen Integration benutzen werden. Dann gilt für die erste Ableitung f' :

$$\begin{aligned}
 f'(t) &= (4\pi \cos(4\pi t) - \lambda \sin(4\pi t))' \\
 &= (4\pi \cos(4\pi t))' - (\lambda \sin(4\pi t))' \\
 &= (-16\pi^2 \sin(4\pi t)) - (4\pi \lambda \cos(4\pi t)) \\
 &= -16\pi^2 \sin(4\pi t) - 4\pi \lambda \cos(4\pi t)
 \end{aligned}$$

Und damit für die zweite Ableitung f'' :

$$\begin{aligned}
 f''(t) &= (-16\pi^2 \sin(4\pi t) - 4\pi \lambda \cos(4\pi t))' \\
 &= (-16\pi^2 \sin(4\pi t))' - (4\pi \lambda \cos(4\pi t))' \\
 &= (-16 \cdot 4\pi^3 \cos(4\pi t)) - (-16\pi^2 \lambda \sin(4\pi t)) \\
 &= -16 \cdot 4\pi^3 \cos(4\pi t) + 16\pi^2 \lambda \sin(4\pi t) \\
 &= -16\pi^2 (4\pi \cos(4\pi t) - \lambda \sin(4\pi t)) \\
 &= -16\pi^2 f(t)
 \end{aligned}$$

Nun können wir partiell integrieren:

$$\begin{aligned}
 \int_0^t f(x)e^x dx &= [e^x \cdot f(x)]_0^t - \int_0^t e^x f'(x) dx \\
 &= [e^x \cdot f(x)]_0^t - \left([e^x \cdot f'(x)]_0^t - \int_0^t e^x f''(x) dx \right) \\
 &= [e^x \cdot f(x)]_0^t - [e^x \cdot f'(x)]_0^t + \int_0^t e^x f''(x) dx \\
 &= [e^x \cdot f(x)]_0^t - [e^x \cdot f'(x)]_0^t + \int_0^t e^x - 16\pi^2 f(x) dx \\
 &= [e^x \cdot f(x)]_0^t - [e^x \cdot f'(x)]_0^t - 16\pi^2 \int_0^t e^x f(x) dx \\
 \Rightarrow 17\pi^2 \int_0^t f(x)e^x dx &= [e^x \cdot f(x)]_0^t - [e^x \cdot f'(x)]_0^t \\
 &= (e^t \cdot f(t) - e^0 \cdot f(0)) - (e^t \cdot f'(t) - e^0 \cdot f'(0)) \\
 &= e^t \cdot (4\pi \cos(4\pi t) - \lambda \sin(4\pi t)) - 4\pi \\
 &\quad - e^t \cdot (-16\pi^2 \sin(4\pi t) - 4\pi \lambda \cos(4\pi t)) - 4\pi \lambda \\
 &= e^t 4\pi \cos(4\pi t) - e^t \lambda \sin(4\pi t) - 4\pi \\
 &\quad + e^t 16\pi^2 \sin(4\pi t) + e^t 4\pi \lambda \cos(4\pi t) - 4\pi \lambda \\
 &\stackrel{\lambda=-1}{=} e^t 4\pi \cos(4\pi t) + e^t \sin(4\pi t) - 4\pi \\
 &\quad + e^t 16\pi^2 \sin(4\pi t) - e^t 4\pi \cos(4\pi t) + 4\pi \\
 &= e^t \sin(4\pi t) + e^t 16\pi^2 \sin(4\pi t)
 \end{aligned}$$

irgendwo kleine lücke...glaub ich. soll rauskommen: $x(t) = e^{-t} + \sin(4\pi t)$ also integral = $e^t * \sin(4\pi t)$ TODO!

(2) Approximative Lösung des AWP mit $\Theta = 0, 0.5, 1$.

tda

b)