

Max Wisniewski, Alexander Steen

Tutor: David Müßig

Aufgabe 1 (Gruppen der Ordnung 10)

Beweisen Sie, dass eine endliche Gruppe G der Ordnung 1000 einen Normalteiler H mit $\{e\} \subsetneq H \subsetneq G$ besitzt.

Die Ordnung von G ist $\#G = 1000 = 2^3 \cdot 5^3$.

1. Sylowsatz \Rightarrow existieren h 5-Sylow-Untergruppen. Für h muss gelten: $h \equiv 1 \pmod{5}$ und $h \mid 2^3 = 8$. Die Teiler von 8 sind 1, 2, 4. Da aber nur $1 \equiv 1 \pmod{5}$ gilt, gibt es genau eine 5-Sylow-Untergruppe.

Wegen der Eindeutigkeit der Sylow-Untergruppe folgt aus dem zweiten Sylowsatz, dass diese ein Normalteiler von G ist. \square

Aufgabe 2 (Kommutierende Normalteiler)

Es seien G eine Gruppe und H, J Normalteiler von G , so dass $H \cap J = \{e\}$.

a) Beweisen Sie $\forall h \in H \forall j \in J : h \cdot j = j \cdot h$.

Sei $h \in H, j \in J$. Betrachte $g = h \cdot j \cdot h^{-1} \cdot j^{-1} \in G$.

(1) Es gilt: $H \triangleleft G \Rightarrow j \cdot h^{-1} \cdot j^{-1} \in H \Rightarrow h \cdot (j \cdot h^{-1} \cdot j^{-1}) \in H$.

(2) Es gilt: $J \triangleleft G \Rightarrow h \cdot j \cdot h^{-1} \in J \Rightarrow (h \cdot j \cdot h^{-1}) \cdot j^{-1} \in J$.

$\Rightarrow g \in H \cap J \Rightarrow g = e$. Also gilt nun:

$$h \cdot j \cdot h^{-1} \cdot j^{-1} = e \Leftrightarrow h \cdot j = j \cdot h$$

\square

b) Nun sei G eine endliche Gruppe mit $\#G = \#H \cdot \#J$. Zeigen Sie $G \cong H \times J$.

Aufgabe 3 (Zyklische Gruppen)

Es seien $p < q$ Primzahlen, so dass $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, und G eine endliche Gruppe der Ordnung $p \cdot q$.

a) Geben Sie mindestens vier Beispiele für Paare (p, q) mit den obigen Eigenschaften an.

$$(3, 5), (5, 7), (7, 11), (11, 13)$$

b) Beweisen Sie, dass G einen Normalteiler der Ordnung p und einen Normalteiler der Ordnung q hat.

Nach dem ersten Sylow-Satz existieren sowohl p -Sylow-Untergruppen als auch q -Sylow-Untergruppen.

Da $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ und q Primzahl \Rightarrow ex. genau eine p -Sylow-Untergruppe. Damit ist diese ein Normalteiler.

Da $p < q$ ist nur die 1 Teiler von q mit Restklasse 1. \Rightarrow ex. genau eine q -Sylow-Untergruppe. Damit ist diese ein Normalteiler.

c) Zeigen Sie, dass G isomorph zu $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ ist, und folgern Sie, dass G zyklisch ist.

Sei A die p -Sylow-Gruppe und B die q -Sylow-Gruppe aus b).

Da $\#A$ und $\#B$ Primzahl ist, sind A, B zyklisch und damit gilt: $A \cong \mathbb{Z}_p$ und $B \cong \mathbb{Z}_q$.

Aufgabe 4 (Endliche abelsche Gruppen)

Listen Sie alle Isomorphieklassen von endlichen abelschen Gruppen der Ordnung 36 auf.