

Nome: _____ Nº: _____

I

Relativamente às questões deste grupo indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), colocando uma circunferência no símbolo correspondente. As respostas **incorrectamente assinaladas** têm cotação negativa.

1. a) Se A é uma matriz que verifica $(2I_2 + A)^T = -2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ então a 2^a coluna da matriz A é igual a $\begin{pmatrix} 0 & 2 \end{pmatrix}^T$. V F
- b) Seja A uma matriz quadrada de ordem n , invertível. Existe uma matriz B , quadrada de ordem n , não nula, tal que AB é uma matriz nula. V F
- c) Se A é uma matriz anti-simétrica ($A^T + A = O$) então A^2 é simétrica. V F
- d) Se A é uma matriz de ordem 4 que verifica $(A + I_4)^2 = 0$ então A é invertível. V F
2. a) Os vectores $v_1 = (1, 1, 2)$, $v_2 = (2, 1, 3)$, $v_3 = (1, 0, \alpha)$ são linearmente dependentes para $\alpha = -1$. V F
- b) Sejam u, v e w vectores linearmente dependentes de um espaço vectorial real V . Então v é combinação linear de u e w . V F
- c) Se u, v e w são vectores linearmente dependentes de um espaço vectorial real V , então os vectores $u - v$, $v - w$ e $w - u$ são vectores linearmente independentes. V F
- d) Em \mathbb{R}^2 não existe nenhum subespaço de dimensão 2 gerado pelos vectores $u = e_1 - e_2$ e $v = -e_2$ (sendo $\{e_1, e_2\}$ a base canónica de \mathbb{R}^2). V F
3. a) Seja A uma matriz de ordem 9×10 tal que $\text{car}(A) = 5$, então o núcleo de A tem dimensão 4. V F
- b) Existe uma matriz A , que define uma aplicação linear f , em \mathbb{R}^2 , para a qual se tem $\dim \text{Im}(f) = \dim \text{Nuc}(f)$, V F
- c) A aplicação linear f , definida em \mathbb{R}^2 , para a qual se tem $\text{Nuc}_f = \{(x, y) : x = 0\}$ é um isomorfismo. V F

- d) Se $H = \langle 1, 2 + x, 3 + 2x + x^3 \rangle$, é um subespaço de P_3 , sendo P_3 o subespaço dos polinómios de grau menor ou igual a 3, então $x \notin H$. V F

4. a) A matriz dos coeficientes do sistema $\begin{cases} x_1 = 3 - x_4 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = -2x_4 \end{cases}$ tem característica igual a 3. V F

- b) O espaço gerado pelos vectores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tem dimensão igual a 2. V F

- c) Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r-2 & 2 \\ 0 & s-1 & r+2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ tem-se $\text{car}(A) = 1$ ou $\text{car}(A) = 2$, para quaisquer valores reais de r e s . V F

- d) Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ o espaço das colunas de A tem dimensão igual a 2. V F

II

Para cada questão deste grupo, complete as respectivas afirmações.

1. Considere o seguinte sistema,

$$\begin{cases} x + y + (1 + a)z &= 1 \\ x + (1 + a)y + z &= 1 + a \\ (2 - a)(1 + a)z &= 2 - a \end{cases}$$

de variáveis x, y, z e com $a \in \mathbb{R}$.

- a) Se $a = 1$ é solução do sistema o vector
b) O sistema $AX = B$ é impossível se e só se
c) O sistema $AX = B$ possível e indeterminado, com grau de indeterminação.
. se e só se
d) O sistema $AX = B$ é possível e determinado se e só se

2. Seja f a aplicação linear definida de \mathbb{R}^2 para \mathbb{R}^3 tal que:

$$f(1, 2) = (1, 3, 5) \quad \text{e} \quad f(2, 7) = (-1, 1, 1).$$

- a) Os vectores $(1, 0)$ e $(0, 1)$ podem escrever-se como combinação linear dos vectores $(1, 2)$ e $(2, 7)$ do seguinte modo
.
.
.
- b) Usando a alínea a) tem-se que $f(1, 0) =$ e $f(0, 1) =$
- c) (*Responda à seguinte questão justificando a sua resposta.*)

Determine, para a aplicação linear f , duas matrizes diferentes que a representem.

Resolução:

III

Responda à questão deste grupo justificando a sua resposta e apresentando todos os cálculos efectuados.

Considere U e V , subespaços vectoriais reais de \mathbb{R}^4 , tais que:

$$U = \{(x, y, z, t) : x = y, \ y + z = t \text{ e } x, y, z, t \in \mathbb{R}\},$$

$$V = \langle (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle$$

- a) Mostre que U é um subespaço vectorial real de \mathbb{R}^4 .
- b) Determine uma base e a dimensão de V .
- c) Determine o subespaço V através de condições que definam o seu elemento genérico.
- d) Defina o subespaço $U \cap V$ e determine um conjunto de geradores de $U \cap V$.

Resolução:

Cotações	Parte I	Parte II	Parte III
	8	4 +(1+1+2)	1+1+0.5+1.5