

Cấu trúc rời rạc

October 3, 2025

1 Cơ sở Logic

1.1 Phép toán

1.1.1 Phủ định

P	$\neg P$
0	1
1	0

1.1.2 Hội (và)

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.1.3 Tuyển (hoặc)

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

1.1.4 Kéo theo

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

1.1.5 Tương đương (Nếu và chỉ nếu)

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.2 Dạng mệnh đề

- Sơ cấp
- Hằng đúng
- Hằng sai

1.3 Tương đương logic & Hệ quả logic

1.3.1 Tương đương logic

- $P, Q \rightarrow$ công thức ...
- $P \Leftrightarrow Q (P \equiv Q, P = Q)$ đgl tương đương logic.
- $P \leftrightarrow Q$ đgl hằng đúng.

1.3.2 Hệ quả logic

- $P \Rightarrow Q$ đgl hệ quả logic.
- $P \rightarrow Q$ đgl hằng đúng.

Note

- $C/m P \Rightarrow Q \rightarrow c/m P \rightarrow Q$ chân trị 1.

1.4 Quy luật logic

Luật	Công thức
Phủ định của phủ định	$\neg\neg P \equiv P$
De Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q \quad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Giao hoán	$P \vee Q \equiv Q \vee P \quad P \wedge Q \equiv Q \wedge P$
Kết hợp	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$ $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Phân phối	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Lũy đẳng	$P \wedge P \equiv P \quad P \vee P \equiv P$
Trung hoà	$P \wedge 1 \equiv P \quad P \vee 0 \equiv P$
Phần tử bù	$P \wedge \neg P \equiv 0 \quad P \vee \neg P \equiv 1$
Thống trị	$P \wedge 0 \equiv 0 \quad P \vee 1 \equiv 1$
Hấp thụ	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P \quad P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

Luật	Công thức
Phản chứng	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ $\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$

1.5 Quy tắc suy diễn

- Khẳng định

$$\frac{P \rightarrow Q, P}{\therefore Q}$$

- Phủ định

$$\frac{P \rightarrow Q, \neg Q}{\therefore \neg P}$$

- Tam đoạn luận

$$\frac{P \rightarrow Q, Q \rightarrow R}{\therefore P \rightarrow R}$$

- Tam đoạn luận rời

$$\frac{P \vee Q, \neg Q}{\therefore P}$$

or

$$\frac{P \vee Q, \neg P}{\therefore Q}$$

- Mâu thuẫn

$$P \rightarrow Q \equiv (P \wedge \neg Q) \rightarrow 0$$

trong đó $P = P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_N$

1.6 Vị từ - lượng từ

1.6.1 Vị từ

$P(x, y, \dots) \rightarrow P(a, b, \dots)$ có chân trị 0 hoặc 1.

1.6.2 Lượng từ

Với mọi

- \forall trong đó \wedge
 - **Đúng** với tất cả.

- Sai với một.
- $\neg(\forall x \in A, P(x)) \equiv \exists x \in A, \neg P(x)$

Tồn tại

- \exists trong đó \forall
 - Đúng với một.
 - Sai với tất cả.
- $\neg(\exists x \in A, P(x)) \equiv \forall x \in A, \neg P(x)$

Đặc biệt hoá phổ dụng

Tổng quát hoá phổ dụng

1.6.3 Quy tắc suy diễn

C/m Phản chứng

$$P \Rightarrow Q \equiv (P \wedge \neg Q) \Rightarrow 0$$

C/m trực tiếp

C/m theo trường hợp (vét cạn)

C/m gián tiếp (PC) $P \Rightarrow Q$ và $\neg Q \Rightarrow \neg P$

\$ \neg Q \quad \neg P \quad P \quad Q \$

C/m quy nạp

$$\frac{P(n_0), \quad \forall n > n_0, P(n) \rightarrow P(n+1)}{\therefore \forall n \geq n_0, P(n)}$$

B1. C/m $P(n_0)$ đúng

B2. G/s $n \in \mathbb{N}$ và $n \geq n_0$, $P(n)$ đúng. C/m $P(n+1)$ đúng.

$\Rightarrow P(n)$ đúng $\forall n \geq n_0$

2 Tập hợp - Ánh xạ

2.1 Tập hợp

- Cách diễn tả
 - Bằng lời
 - Liệt kê
 - Tính chất đặc trưng

- Lực lượng k/h $|A|$
- Tích Descarte
 - 2 tập hợp
 - Nhiều tập hợp
- Tập con
 - k/h $B \subset A \Leftrightarrow \{\forall x|x \in B \Rightarrow x \in A\}$
 - Tập hợp tập con của A k/h $P(A)$

2.1.1 Phép toán

- Hợp $A \cup B = \{x|x \in A \vee x \in B\}$
- Giao $A \cap B = \{x|x \in A \wedge x \in B\}$
- Hiệu $A \setminus B = \{x|x \in A \wedge x \notin B\}$
- Phần bù $B \subset A$, k/h $\overline{B_A}$ or \overline{B}

Tính chất

Luật	Công thức
Giao hoán	$A \cap B = B \cap A \quad A \cup B = B \cup A$
Kết hợp	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Phân phối	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
De Morgan	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Luỹ đẳng	$A \cap A = A \quad A \cup A = A$

2.2 Ánh xạ

Ánh xạ bằng nhau

Ảnh

Ảnh ngược

Tính chất

2.2.1 Loại

Đơn ánh

- Có tối đa 1 nghiệm

$$\forall x, x' \in X, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

hay

$$\forall x, x' \in X, f(x) \neq f(x') \Rightarrow x \neq x'$$

- **Không** là đơn ánh (có nhiều hơn 1 nghiệm)

$$\exists x, x' \in X, x \neq x' \wedge f(x) = f(x')$$

Toàn ánh

- Luôn có ít nhất 1 nghiệm

$$\forall y \in Y, \exists x \in X, y = f(x)$$

hay

$$\forall y \in Y, f^{-1}(y) \neq \emptyset$$

- **Không** là toàn ánh (Tồn tại vô nghiệm)

$$\exists y \in Y, f^{-1}(y) = \emptyset$$

hay

$$\exists y \in Y, \forall x \in X, y \neq f(x)$$

Song ánh

- Vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

$$\forall y \in Y, \exists! x \in X, y = f(x)$$

hay

$$\forall y \in Y, f^{-1}(y) \text{ có đúng 1 phần tử}$$

2.2.2 Ngược

$$f^{-1} : Y \rightarrow X, y \mapsto f^{-1}(y) = x, \quad f(x) = y$$

2.2.3 Hợp

$$h = g \circ f : X \rightarrow Y \rightarrow Z, x \mapsto f(x) \mapsto g(f(x))$$

- Định lý

$f : X \rightarrow Y$ song ánh

$$f \circ f^{-1} = Id_Y, f^{-1} \circ f = Id_X$$

Trong đó

- $Id_X(x) : X \rightarrow X, \quad Id_X(x) = x$
- $Id_Y(y) : Y \rightarrow Y, \quad Id_Y(y) = y$

3 Phương pháp đếm

3.1 Cơ bản

- Cộng
 - Trường hợp
- Nhân
 - Bước
 - Thứ tự không quan trọng
 - Bắt buộc
- Nguyên lý chuồng bồ câu
 - n vật, k hộp $\rightarrow \lceil \frac{n}{k} \rceil$ vật trong ít nhất 1 hộp.
- Nguyên lý bù trừ
 - $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 - $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

3.2 Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp

- Hoán vị
 - $P_n = n!$
- Tổ hợp
 - $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$
 - Không thứ tự, không lặp lại.
- Chỉnh hợp
 - $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
 - Có thứ tự, không lặp lại.

3.3 Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp (Lắp)

- Hoán vị lắp
 - $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$
 - Nhóm n_1, n_2, \dots, n_k .
- Chỉnh hợp lắp
 - $\overline{A}_n^k = n^k$
- Tổ hợp lắp
 - $\overline{C}_n^k = C_{n+(k-1)}^k$
 - Bài toán chia k vật đồng chất vào n hộp phân biệt
 - * $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$
 - * $k \rightarrow$ không phân biệt.
 - * $n \rightarrow$ phân biệt.

4 Hệ thức truy hồi & Hàm sinh

4.1 Tuyến tính thuần nhất bậc k

(Đề thi sẽ cho (bậc 2, 3 tối đa))

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

- $a_0 = C_0, a_1 = C_1, \dots, a_{k-1} = C_{k-1}$.
- Các dạng không phải tuyến tính thuần nhất bậc k :
 - $H_n = H_{n-1} + 1$
 - $A_n = nA_{n-1}$
 - $B_n = 4B_{n-1} - 3B_{n-2}^2$

4.1.1 Phương pháp giải

Phương pháp thế (giải bậc 1) B1. Thay a_n bởi a_{n-1} , a_{n-1} bởi a_{n-2}, \dots, a_0 bởi $C_0 \rightarrow$ Thu được công thức trực tiếp cho a_n

B2. Chứng minh tính đúng đắn của công thức a_n

Phương pháp phương trình đặc trưng TH1 (Bậc 2)

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$$

B1. Tính phương trình đặc trưng $r^2 = c_1 r + c_2 \rightarrow$ nghiệm r

B2. (Check nghiệm)

- 2 nghiệm phân biệt $r_1, r_2 \rightarrow a_n = d_1 r_1^n + d_2 r_2^n$
- Nghiệm kép $r_1 \rightarrow a_n = (d_1 + d_2 n) r_1^n$ và $a_0 = C_0, a_1 = C_1$

B3. Dùng điều kiện đề cho $a_0, a_1, \dots \rightarrow d_1, d_2$

B4. Thay d_1, d_2 vào a_n ở B2 và kết luận.