

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

---

ĐỖ NGỌC MINH THƯ  
NGUYỄN CHÍ BẰNG

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN  
TỐI ƯU TUYẾN TÍNH NGUYÊN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỖ NGỌC MINH THƯ  
NGUYỄN CHÍ BẰNG

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN  
TỐI ƯU TUYẾN TÍNH NGUYÊN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn

PGS.TS. TẠ QUANG SƠN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021

## Lời cam đoan

Chúng tôi tên là Đỗ Ngọc Minh Thư và Nguyễn Chí Bằng, là các sinh viên lớp DTU1221, khoa Toán - Ứng dụng, khóa 2022-2026, thuộc trường Đại học Sài Gòn.

Xin cam đoan rằng: Toàn bộ nội dung được trình bày trong đề tài này đều do chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Tạ Quang Sơn. Những kết quả nghiên cứu của tác giả khác được sử dụng trong đề tài đều có trích dẫn đầy đủ. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm nếu có các nội dung sao chép không hợp lệ hoặc vi phạm quy chế đào tạo.

*Tp. HCM, tháng ... năm 2024*

**Tác giả**

**Đỗ Ngọc Minh Thư**

---

## Lời cảm ơn

Đề tài nghiên cứu khoa học này được hoàn thành tại trường Đại Học Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Tạ Quang Sơn. Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự tận tâm và nhiệt tình của Thầy trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

Xin cảm ơn Phòng Đào tạo và Khoa Toán - Ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, giúp chúng em nâng cao chất lượng và nhiệm vụ học tập qua việc thực hiện đề tài này.

*Tp. HCM, tháng ... năm 2024*

**Tác giả**

**Đỗ Ngọc Minh Thư**

---

# Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Mục lục	iii
Danh mục các kí hiệu	v
Lời nói đầu	1
<b>1 Một số kiến thức cơ bản về bài toán quy hoạch tuyến tính</b>	<b>4</b>
1.1 Véc tơ, ma trận và các tính chất . . . . .	4
1.1.1 Véc tơ và các phép toán . . . . .	4
1.1.2 Ma trận và các phép toán . . . . .	5
1.1.3 Các phép biến đổi trên ma trận . . . . .	7
1.1.4 Định thức của ma trận và ma trận đảo . . . . .	7
1.2 Một số kiến thức cơ bản về Bài toán tối ưu tuyến tính . . . . .	8
1.2.1 Bài toán dạng chính tắc và chuẩn tắc . . . . .	8
1.2.2 Chuyển bài toán về dạng chính tắc . . . . .	10
1.3 Phương pháp giải bài toán tối ưu tuyến tính . . . . .	11
1.3.1 Phương pháp hình học . . . . .	11
1.3.2 Phương pháp đơn hình . . . . .	11

<b>2</b>	<b>Bài toán quy hoạch tuyến tính có nghiệm nguyên</b>	<b>12</b>
2.1	Sự cần thiết phải nghiên cứu về bài toán quy hoạch có nghiệm nguyên . . . . .	12
2.2	Lý thuyết về cách tìm nghiệm nguyên của bài toán Quy hoạch tuyến tính . . . . .	12
2.2.1	Sự cần thiết phải có một lý thuyết riêng . . . . .	12
2.2.2	Phương pháp Gomory . . . . .	12
2.2.2.1	Giới thiệu phương pháp và ý nghĩa . . . . .	12
2.2.2.2	Các bước thực hiện của phương pháp . . . . .	12
2.2.2.3	Ví dụ minh họa . . . . .	12
2.2.3	Phương pháp Land-Doig . . . . .	12
2.2.3.1	Giới thiệu phương pháp và ý nghĩa . . . . .	12
2.2.3.2	Các bước thực hiện của phương pháp . . . . .	12
2.2.3.3	Ví dụ minh họa . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Mở rộng kết quả cho bài toán dạng phân thức tuyến tính</b>	<b>13</b>
	<b>Kết luận</b>	<b>14</b>
	<b>Tài liệu tham khảo</b>	<b>15</b>

---

## Danh mục các kí hiệu

$\mathbb{R}$	Tập các số thực
$\mathbb{R}^n$	Không gian Euclide $n$ -chiều
$F$	Tập chấp nhận được của bài toán tối ưu
$\langle u, v \rangle$	Tích vô hướng của hai véc tơ $u$ và $v$ trong $\mathbb{R}^n$

---

## Lời nói đầu

Thực tế cho thấy rằng trong nhiều bài toán tối ưu, nghiệm tìm được mong muốn phải là các số nguyên hoặc một bộ phận nghiệm của bài toán phải là các số nguyên. Điều này có thể thấy ở các bài toán như phân phối hàng hóa, sắp xếp tối ưu nhân lực, bài toán trên mạng, phân luồng giao thông,... Đã từng có nhận định về việc tìm nghiệm nguyên của bài toán tối ưu là sau khi tìm được nghiệm tối ưu thì thực hiện việc làm tròn nghiệm. Cách thức này thường không cho kết quả như mong muốn. Bởi lẽ nghiệm làm tròn có thể không thuộc miền chấp nhận được hoặc có thể việc làm tròn như thế không chắc đã cho nghiệm tốt nhất như mong muốn. Lý thuyết về việc tìm nghiệm nguyên cho các bài toán tối ưu đáp ứng điều mong đợi nêu trên.

Bài toán tối ưu thường được xem xét dưới dạng

$$\begin{aligned} \text{Min (Max)} \quad & f(x) \\ & x \in F, \end{aligned}$$

trong đó  $f(x)$  là hàm mục tiêu tối ưu cần xác định, phụ thuộc vào biến  $x$ , xác định trên một không gian cho trước và  $F$  là tập ràng buộc còn gọi là tập chấp nhận được. Mục tiêu của bài toán là đi tìm  $x \in F$  sao cho hàm mục tiêu  $f(x)$  đạt giá trị lớn nhất hay bé nhất. Vì bài toán Max có thể đưa về bài toán Min và ngược lại, nên trong nhiều trường hợp để xây dựng các thuật toán tìm nghiệm cho bài toán, người ta chỉ cần xét một trong hai dạng nêu trên là đủ.

Trong đề tài này chúng tôi quan tâm tìm hiểu về nghiệm nguyên cho bài toán có hàm mục tiêu tuyến tính trên tập chấp nhận được xác định bởi các

---



hàm tuyến tính. Bài toán có dạng như sau

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & c_1x_1 + \dots + c_nx_n \\ \text{s.t.} & \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1, \dots, x_n \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

Trong đó,  $c_i, i = 1, \dots, n$ , các hệ số  $a_{ij}$  với  $i = 1, \dots, m$  và  $j = 1, \dots, n$ , và  $b_i$  với  $i = 1, \dots, m$  là các số thực cho trước.

Bằng cách dùng ký hiệu véc tơ và ma trận, bài toán nêu trên được viết dưới dạng

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & \langle c, x \rangle \\ \text{s.t.} & \begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

Trong đó, cho trước  $A$  là ma trận có  $m$  dòng và  $n$  cột,  $c$  là véc tơ  $n$  chiều và  $b$  là véc tơ  $m$  chiều. Chú ý rằng, các ràng buộc bất đẳng thức đều có thể biến đổi về ràng buộc đẳng thức. Vì thế trong nội dung của đề tài này, nếu không nói gì thêm, bài toán luôn được xét dưới dạng tổng quát

$$\begin{array}{ll} \text{(IP) Min} & \langle c, x \rangle \\ \text{s.t.} & \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

Các phương pháp mà đề tài này tìm hiểu là phương pháp sử dụng siêu phẳng cắt Gomory và phương pháp tìm nghiệm nguyên theo kiểu nhánh-cận do Land-Doig đề xuất.

Nội dung đề tài được tổ chức thành 3 chương trong đó

---

Chương 1; Dành để tóm lược lại một số kiến thức về Đại số tuyến tính liên quan đến véc tơ và ma trận. Đồng thời chương này cũng nhắc lại một số kết quả về phương pháp đơn hình khi giải bài toán quy hoạch tuyến tính.

Chương 2: Là phần chính của nội dung đề tài. Trong đó được chia làm hai phần. Phần đầu dành để trình bày phương pháp dùng siêu phẳng cắt Gomory và phần tiếp theo dành để trình bày phương pháp nhánh-cận kiểu Land-Doig. Trong mỗi phần đều có các ví dụ minh họa. Ngoài ra, dựa trên thực tế, khi sử dụng các phương pháp này để giải bài toán Quy hoạch nguyên, đề tài cũng đưa ra những nhận xét về phương pháp.

Phần cuối của đề tài này là Chương 3. Chúng tôi thử áp dụng các phương pháp trên để khảo sát việc tìm nghiệm nguyên cho bài toán dạng phân thức tuyến tính.

Do lần đầu tham gia tập dượt nghiên cứu khoa học. Các tri thức chọn lọc và trình bày trong nội dung của đề tài này chưa đầy đủ hoặc còn sơ suất. Chúng em kính mong nhận được sự chỉ bảo từ quý thầy cô.

---

# Chương 1

## Một số kiến thức cơ bản về bài toán quy hoạch tuyến tính

Kiến thức trình bày trong chương này, hầu hết được tham khảo từ các tài liệu [?] và [?].

### 1.1. Véc tơ, ma trận và các tính chất

#### 1.1.1 Véc tơ và các phép toán

- Ký hiệu vector  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Trong đó  $x_i \in \mathbb{R}$  với  $i = 1, 2, \dots, n$ .

- Các phép toán:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Trong đó  $x, y \in \mathbb{R}^n$  và  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

- Thứ tự vector:

$$x \leq y \Leftrightarrow x_i \leq y_i,$$

$$x < y \Leftrightarrow x_i < y_i,$$

$$x = y \Leftrightarrow x_i = y_i.$$

Trong đó  $i = 1, 2, \dots, n$ .

- Vector đơn vị:  $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$ .
- Vector 0:  $0 = (0, 0, \dots, 0)$ .

### 1.1.2 Ma trận và các phép toán

- Ký hiệu  $A$  là ma trận  $m \times n$ , trong đó  $A = (a_{ij})$  và  $i = 1, 2, \dots, m$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ .  $A_i$  chỉ dòng thứ  $i$  của ma trận  $A$  và  $A_j$  chỉ cột thứ  $j$  của ma trận  $A$ .
- $A$  là ma trận vuông khi  $m = n$ .
- Ma trận cột:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

- Ma trận dòng:

$$A^T = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}.$$

- Ma trận đơn vị:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

---

- Cộng ma trận:  $A, B$  là ma trận  $m \times n$ ,

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

Trong đó  $i = 1, 2, \dots, m$  và  $j = 1, 2, \dots, n$ .

- Nhân với 1 số:  $A, B$  là ma trận  $m \times n$ ,

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}).$$

Trong đó  $i = 1, 2, \dots, m$  và  $j = 1, 2, \dots, n$ .

- Với ma trận dòng

$$A^T = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}.$$

và ma trận cột

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Ta có tích hai ma trận

$$A \times B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

- Tích của ma trận  $A$  cấp  $m \times p$  với ma trận  $B$  cấp  $p \times n$  ta được ma trận  $C$  cấp  $m \times n$ :

$$C = \begin{bmatrix} A_1 B^1 & A_1 B^2 & \cdots & A_1 B^n \\ A_2 B^1 & A_2 B^2 & \cdots & A_2 B^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_m B^1 & A_m B^2 & \cdots & A_m B^n \end{bmatrix}.$$

---

- Hệ phương trình

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

có thể viết lại thành

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}. \quad (1.1)$$

### 1.1.3 Các phép biến đổi trên ma trận

- Các phép biến đổi bao gồm:
  - **Phép đổi hàng.** Đổi chỗ hàng  $i$  và hàng  $j$  của ma trận, được ký hiệu  $h_i \leftrightarrow h_j$ .
  - **Phép thay thế tỷ lệ.** Nhân hàng  $i$  của ma trận với số  $\alpha \neq 0$ , được ký hiệu  $h_i \leftarrow \alpha h_i$ .
  - **Phép thay thế hàng.** Cộng vào hàng  $i$  một bội  $k$  lần hàng  $j$ , được ký hiệu là  $h_i \leftarrow h_i + kh_j$ , với  $j \neq i$ .

### 1.1.4 Định thức của ma trận và ma trận đảo

Cho ma trận vuông cấp  $n$ :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

---

- Định thức của ma trận  $A$  được tính theo công thức:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}. \quad (1.2)$$

- Ta có thể viết định thức của ma trận  $A$  dưới dạng

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

- Áp dụng vào ma trận vuông cấp 1, ta có:

$$\det[a] = a. \quad (1.3)$$

- Áp dụng vào ma trận vuông cấp 2, ta có:

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (1.4)$$

Ma trận vuông  $B$  được gọi là ma trận đảo của  $A$  nếu  $AB = BA = I$ .

**Ví dụ.** Cho hai ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ và } B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

ta có  $AB = BA = I$ .

## 1.2. Một số kiến thức cơ bản về Bài toán tối ưu tuyến tính

### 1.2.1 Bài toán dạng chính tắc và chuẩn tắc

- Bài toán dạng chính tắc
-

Ta có bài toán dạng:

$$\begin{aligned} f(x) = c^T x &\longrightarrow \text{Min} \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \end{aligned} \quad (1.5)$$

Thì ta gọi bài toán trên có dạng chính tắc và có thể viết lại dưới dạng:

$$(P) \quad \begin{aligned} \text{Min } f(x) &= c^T x \\ \begin{cases} Ax = b, \\ x_j \geq 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Trong đó  $A$  là ma trận  $m \times n$ ,  $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$  và  $c^T = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n)$ .

### • Bài toán dạng chuẩn tắc

Nếu bài toán có dạng:

$$\begin{aligned} f(x) = c^T x &\longrightarrow \text{Min} \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \end{aligned} \quad (1.7)$$

Thì ta gọi bài toán trên có dạng chuẩn tắc và có thể viết lại dưới dạng:

$$(P) \quad \begin{aligned} \text{Min } f(x) &= c^T x \\ \begin{cases} Ax \geq b, \\ x_j \geq 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (1.8)$$

---



Tương tự  $A$  là ma trận  $m \times n$ ,  $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$  và  $c^T = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n)$ .

### 1.2.2 Chuyển bài toán về dạng chính tắc

Để thuận tiện, ta chỉ xét dạng bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát là **dạng chính tắc** và bất kỳ bài toán nào cũng có thể đưa về dạng chính tắc.

• **Phương pháp đưa về dạng chính tắc:**

- Bài toán  $\max f(x) \longrightarrow -\min[-f(x)]$ .
- Bằng cách thêm ẩn phụ  $x_{n+i}$  tương ứng có hệ số trong hàm mục tiêu là  $c_{n+i} = 0$ , ta có thể đưa bất đẳng thức

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$$

hoặc

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$$

lần lượt thành đẳng thức

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i$$

hoặc

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$$

- Nếu tồn tại bất kỳ  $x_k$  không có ràng buộc thì ta viết

$$x_k = x'_k - x''_k$$

với  $x'_k \geq 0$  và  $x''_k \geq 0$ .

Kể từ đây, ta chỉ quan tâm bài toán (1.6).

---

### 1.3. Phương pháp giải bài toán tối ưu tuyến tính

#### 1.3.1 Phương pháp hình học

#### 1.3.2 Phương pháp đơn hình

---

## Chương 2

# Bài toán quy hoạch tuyến tính có nghiệm nguyên

### 2.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu về bài toán quy hoạch có nghiệm nguyên

-Mô tả bằng các ví dụ

### 2.2. Lý thuyết về cách tìm nghiệm nguyên của bài toán Quy hoạch tuyến tính

#### 2.2.1 Sự cần thiết phải có một lý thuyết riêng

#### 2.2.2 Phương pháp Gomory

##### 2.2.2.1 Giới thiệu phương pháp và ý nghĩa

##### 2.2.2.2 Các bước thực hiện của phương pháp

##### 2.2.2.3 Ví dụ minh họa

#### 2.2.3 Phương pháp Land-Doig

##### 2.2.3.1 Giới thiệu phương pháp và ý nghĩa

##### 2.2.3.2 Các bước thực hiện của phương pháp

##### 2.2.3.3 Ví dụ minh họa

## Chương 3

Mở rộng kết quả cho bài toán  
dạng phân thức tuyến tính

## Kết luận

Luận văn này đạt được các vấn đề sau đây:

- 
- 
-

## Tài liệu tham khảo

- [1] Erik B. Bajajilov, *Linear fractional programming: Theory, Methods, Applications, and Software*, Springer, 2003.
  - [2] Stancu Minasian, *Fractional Programming: Theory, Methods, and Applications*, Kluwer Academic Publishers, 1992.
-