

1 復習

M を C^∞ 多様体, $\chi(M)$ を M のベクトル場全体とする.

多様体 M, N に対して $f: M \rightarrow N$ を考える. $f_*: TM \rightarrow TN$ を $X \in TM, g: N \rightarrow \mathbb{R}$ に対して

$$f_*(X)(g) := X(f^*g)$$

と定義する. f_* を df と書くこともある.

多様体 S と写像 $g: N \rightarrow S$ があると

$$TM \xrightarrow{f_*} TN \xrightarrow{g_*} TS$$

が誘導される.

$$g_* \circ f_* = (g \circ f)_*.$$

$\mathbb{R}_+^n := \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i > 0\}$, $S_{n-1} := \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i > 0, \sum_i x_i = 1\}$ とする.

S_{n-1} に \mathbb{R}_+^n の相対位相を入れる (開集合が $U \cap \mathbb{R}_+^n$ の形).

$$\varphi: S_{n-1} \ni (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}_+^{n-1}$$

$T^{n-1} := \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i > 0, \sum_i x_i < 1\}$ とすると $\varphi: S_{n-1} \rightarrow T^{n-1}$ は homeo.

n 行 l 列の行列 $Q = (Q_{ij})$, $Q_{ij} > 0$, $\sum_j Q_{ij} = 1$ をとる ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq l$). 縦に n 個, 横に l 個.

$$f: S_{n-1} \ni (x_i) \mapsto \left(\sum_i x_i Q_{ij}\right) \in S_{l-1}$$

とする.

$|x| := \sum_i x_i$ とすると

$$|f(x)| = \sum_j \left(\sum_i x_i Q_{ij}\right) = \sum_i x_i \left(\sum_j Q_{ij}\right) = \sum_i x_i = |x|.$$

特に $|x| = 1$ なら $|f(x)| = 1$ なので f を S_{n-1} に制限した写像 f について $f: S_{n-1} \rightarrow S_{l-1}$ が well-defined.

$h_n: \mathbb{R}_+^n \rightarrow S_{n-1}$ を $h_n(x) := (1/|x|)x$ とする.

h_n を S_{n-1} に制限すると $h_n = id_{S_{n-1}}$.

また

$$f(h_n(x)) = f(x/|x|) = (1/|x|)f(x) = (1/|f(x)|)f(x) = h_l(f(x)).$$

つまり次が可換.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_+^l \\ h_n \downarrow & \circlearrowleft & \downarrow h_l \\ S_{n-1} & \xrightarrow{f} & S_{l-1} \end{array}$$

補題 1. $g^{[n]} : TS_{n-1} \times TS_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ について

$$g^{[n]}(X, Y) = g^{[l]}(f_*X, f_*Y) \quad \text{for } X, Y \in TS_{n-1}$$

が成り立つとする.

このとき $\bar{g}^{[n]} : T\mathbb{R}_+^n \times T\mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$\bar{g}^{[n]}(\bar{X}, \bar{Y}) := g^{[n]}(h_{n*}\bar{X}, h_{n*}\bar{Y}) \quad \text{for } \bar{X}, \bar{Y} \in T\mathbb{R}_+^n$$

とすると \bar{g} は g の拡張となっている.

(証明)

$\iota : S_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}_+^n$ とすると $x \in S_{n-1}$ について $h_n(\iota(x)) = x$. よって

$$\bar{g}^{[n]}(\iota_*X, \iota_*Y) = g^{[n]}(h_{n*}\iota_*X, h_{n*}\iota_*Y) = g^{[n]}(X, Y).$$

また

$$\begin{aligned} \bar{g}^{[l]}(f_*\bar{X}, f_*\bar{Y}) &= g^{[l]}(h_{l*}f_*\bar{X}, h_{l*}f_*\bar{Y}) = g^{[l]}(f_*h_{n*}\bar{X}, f_*h_{n*}\bar{Y}) \\ &= g^{[n]}(h_{n*}\bar{X}, h_{n*}\bar{Y}) = \bar{g}^{[n]}(\bar{X}, \bar{Y}). \end{aligned}$$