

$$Q1) T(n) = 3T(n/2) + n^2$$

$$\rightarrow T(n) = aT(n/b) + f(n^2)$$

$$\rightarrow a > 1, b > 1$$

On comparing

$$a=3, b=2, f(n)=n^2$$

$$\text{Now, } c = \log_b a = \log_2 3 = 1.584$$

$$n^c = n^{1.584} < n^2$$

$$\therefore f(n) > n^c$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^2)$$

$$Q2) T(n) = 4T(n/2) + n^2$$

$$\rightarrow a > 1, b > 1$$

$$a=4, b=2, f(n)=n^2$$

$$c = \log_2 4 = 2$$

$$n^c = n^2 = f(n) = n^2$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^2 \log_2 n)$$

$$Q3) T(n) = T(n/2) + 2^n$$

\rightarrow

$$a=1$$

$$b=2$$

$$f(n) = 2^n$$

$$c = \log_b a = \log_2 1 = 0$$

$$n^c = n^0 = 1$$

$$f(n) > n^c$$

$$T(n) = \theta(2^n)$$

$$Q4) T(n) = 2^n T(n/2) + n^n$$

$$\rightarrow a = 2^n$$

$$b=2, f(n) = n^n$$

$$c = \log_b a = \log_2 2^n = n$$

$$n^c \neq n^n$$

$$f(n) = n^n$$

$$T(n) = \theta(n^2 \log_2 n)$$

$$Q5) T(n) = 16T(n/4) + n$$

$$\rightarrow a=16, b=4$$

$$f(n) = n$$

$$c = \log_4 16 = \log_4 (4^2) = 2 \log_4 4 = 2$$

$$n^c \geq n^2$$

$$f(n) < n^c$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^2)$$

$$Q6) T(n) = 2T(n/2) + n \log n$$

$$\rightarrow a=2, b=2$$

$$f(n) = n \log n$$

$$c = \log_2 2 = 1$$

$$n^c = n^1 = n$$

$$n \log n > n$$

$$f(n) > n^c$$

$$T(n) = \theta(n \log n)$$

Q7) $T(n) = 2T(n/2) + n/\log n$
 $\rightarrow a=2, b=2, f(n) = n/\log n$
 $c = \log_2 2 = 1$
 $n^c = n^1 = n$
 $\therefore \frac{n}{\log n} < n$
 $\therefore f(n) < n^c$
 $\therefore T(n) = \theta(n)$

Q8) $T(n) = 2T(n/4) + n^{0.51}$
 $\rightarrow a=2, b=4, f(n) = n^{0.51}$
 $c = \log_4 2 = \log_2 2 = 0.5$
 $n^c = n^{0.5}$
 $\therefore n^{0.5} < n^{0.51}$
 $f(n) > n^c$
 $\therefore T(n) = \theta(n^{0.51})$

Q9) $T(n) = 0.5T(n/2) + 1/n$
 $\rightarrow a=0.5, b=2$
 $a > 1$ but here a is 0.5
 so we cannot apply Master's Theorem.

Q10) $T(n) = 16T(n/4) + n!$
 $\rightarrow a=16, b=4, f(n) = n!$
 $\therefore c = \log_4 16 = 2$
 $n^c = n^2$
 As $n! > n^2$
 $\therefore T(n) = \theta(n!)$

Q11) $4T(n/2) + \log n$ (2)
 $\rightarrow a=4, b=2, f(n) = \log n$
 $c = \log_2 4 = 2$
 $n^c = n^2$
 $f(n) = \log n$
 $\therefore \log n < n^2$
 $f(n) < n^c$
 $T(n) = \theta(n^c)$
 $= \theta(n^2)$

Q12) $T(n) = \sqrt{n}T(n/2) + \log n$
 $\rightarrow a=\sqrt{n}, b=2$
 $c = \log_2 \sqrt{n} = \frac{1}{2} \log_2 n$
 $\therefore \frac{1}{2} \log_2 n < \log(n)$

$\therefore f(n) > n^c$
 $T(n) = \theta(f(n))$
 $= \theta(\log(n))$

Q13) $T(n) = 3T(n/2) + n$
 $\rightarrow a=3, b=2, f(n) = n$
 $c = \log_2 3 = 1.5849$
 $n^c = n^{1.5849}$
 $n < n^{1.5849}$

$\Rightarrow f(n) < n^c$
 $T(n) = \theta(n^{1.5849})$

Q14) $T(n) = 3T(n/3) + \sqrt{n}$
 $\rightarrow a=3, b=3$
 $c = \log_3 3 = 1$
 $n^c = n^1 = n$
 As $\sqrt{n} < n$
 $f(n) < n^c$
 $T(n) = \theta(n)$

$$Q15) T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$\rightarrow a=4, b=2$$

$$c = \log_b a = \log_2 4 = 2$$

$$n^c = n^2$$

$$n < n^2 \text{ (for any constant)}$$

$$f(n) < n^c$$

$$T(n) = \theta(n^2)$$

$$Q16) T(n) = 3T(n/4) + n \log n$$

$$\rightarrow a=3, b=4, f(n) = n \log n$$

$$c = \log_b a = \log_4 3 = 0.792$$

$$n^c = n^{0.792}$$

$$n^{0.792} < n \log n$$

$$T(n) = \theta(n \log n)$$

$$Q17) T(n) = 3T(n/3) + n/2$$

$$\rightarrow a=3; b=3$$

$$c = \log_b a = \log_3 3 = 1$$

$$f(n) = n/2$$

$$\therefore n^c = n^1 = n$$

$$\text{As } n/2 < n$$

$$f(n) < n^c$$

$$\therefore T(n) = \theta(n)$$

$$Q18) T(n) = 6T(n/3) + n^2 \log n$$

$$\rightarrow a=6; b=3$$

$$c = \log_b a = \log_3 6 = 1.6309$$

$$n^c = n^{1.6309}$$

$$\text{As } n^{1.6309} < n^2 \log n$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^2 \log n)$$

$$Q19) T(n) = 4T(n/2) + n/\log n \quad (3)$$

$$\rightarrow a=4, b=2, f(n) = \frac{n}{\log n}$$

$$c = \log_b a = \log_2 4 = 2$$

$$n^c = n^2$$

$$\frac{n}{\log n} < n^2$$

$$T(n) = \theta(n^2)$$

$$Q20) T(n) = 64T(n/8) - n^2 \log n$$

$$\rightarrow a=64, b=8$$

$$c = \log_b a = \log_8 64 = \log_8 (8^2)$$

$$c=2$$

$$n^c = n^2$$

$$\therefore n^2 \log n > n^2$$

$$T(n) = \theta(n^2 \log n)$$

$$Q21) T(n) = 7T(n/3) + n^2$$

$$\rightarrow a=7; b=3; f(n) = n^2$$

$$c = \log_b a = \log_3 7 = 1.7712$$

$$n^c = n^{1.7712}$$

$$n^{1.7712} < n^2$$

$$T(n) = \theta(n^2)$$

$$Q22) T(n) = T(n/2) + n(2 - \cos n)$$

$$\rightarrow a=1, b=2$$

$$c = \log_b a = \log_{0.2} 1 = 0$$

$$n^c = n^0 = 1$$

$$n(2 - \cos n) > n^c$$

$$T(n) = \theta(n(2 - \cos n))$$