

1. Wskaż który przypis odnoszący się do fizjologii układu rozrodczego jest nieprawidłowy?

- a. Estrogeny pobudzają aktywność osteoblastów u dziewcząt oraz odpowiadają za pik wzrostowy podczas okresu dojrzewania
- b. Menarche oznacza pierwszą miesiączkę, a menopauza okres, w którym dochodzi do wystąpienia ostatnich krwawień miesięcznych
- c. Komórki Sertoliego produkują inhibinę oraz ABP
- ☒ d. Pierwszą widoczną zmianą podczas dojrzewania u dziewcząt jest adrenarche
- e. Estrogeny wpływają na depozycję tłuszczu w tkance tłuszczowej podskórnej w okolicy sutka, pośladków, ud u kobiet

2. Hormon β -HCG jest produkowany przez i największe stężenie osiąga w

- a. ciało żółte i trofoblast/ I trymestrze ciąży
- b. u ciężarnych trofoblast, u nieciężarnych jajnik/ w I trymestrze ciąży i podczas owulacji
- c. ciało żółte i trofoblast/ I i II trymestrze ciąży
- ☒ d. trofoblast/ I trymestrze ciąży
- e. u ciężarnych ciało żółte, u nieciężarnych jajnik/ w I trymestrze ciąży i podczas miesiączki

3. Estrogeny mogą wywoływać działania niepożądane w organizmie kobiety podnosząc

- a. Ryzyko rozwoju osteoporozy
- b. Ryzyko rozwoju hipercholesterolemii
- c. Ryzyko rozwoju choroby Alzheimera
- ☒ d. Ryzyko rozwoju raka endometrium
- e. Ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego

4. Zanik przewodów Mullera w trakcie różnicowania płciowego wywołany jest bezpośrednio przez:

- ☒ a. AMH
- b. Testosteron
- c. PRL
- d. Beta-HCG
- e. DHT

5. Najbardziej specyficznym hormonem do oceny prawidłowości przebiegu wczesnej ciąży jest:

- a. Progesteron
- b. Estradiol
- c. AMH
- ☒ d. Beta-HCG
- e. GnRH

6. Wykorzystywany w badaniach diagnostycznych surowiczy poziom stężenia AMH produkowanego przez jajnik odzwierciedla:

- a. Gotowość organizmu do rozpoczęcia pokwitania
- ☒ b. Aktualną płodność kobiety
- c. Termin owulacji w danym cyklu
- d. Termin porodu (u kobiet w ciąży)
- e. Aktualną płodność mężczyzny

7. U 40-letniej kobiety podczas przedłużającego się porodu wyraźnie zmniejszyła się siła skurczów macicy. Podanie którego z hormonów może zlecić lekarz?

- a. Adrenaliny
- b. Noradrenaliny
- c. Progesteronu
- d. Prolaktyny
- ☒ e. Oksytocyny
- f. Estradiolu

8. Menarhe to:

- a. rzadkie miesiączkowanie
- ☒ b. pierwsza samoistna miesiączka w życiu kobiety
- c. ostatnia miesiączka w życiu kobiety, po której następuje co najmniej 6-12 miesięczna przerwa w miesiączkowaniu samoistnym
- d. inne określenie krwawienia miesiączkowego
- e. częste miesiączkowanie

9. Wybierz, które ze stwierdzeń jest prawidłowe dla oceny pokwitania w skali Tanner'a:

- ☒ a. U dziewcząt polega na ocenie rozwoju sutków – telarche i owłosienia łonowego – pubarche
- b. U dziewcząt polega na ocenie rozwoju gonad – gonadarche
- c. U chłopców polega na ocenie cyklu spermatogenezy – spermarche
- d. U dziewcząt i chłopców oceniamy funkcję nadnerczy – adrenarche
- e. U dziewcząt polega na ocenie rozwoju sutków – telarche

10. Która z poniższych odpowiedzi prawidłowo opisuje kolejność pojawiania się drugorzędowych cech płciowych u dziewcząt?

- ☒ a. adrenarche, telarche, pubarche, menarche
- b. telarche, pubarche, menarche, adrenarche
- c. pubarche, menarche, adrenarche, telarche
- d. menarche, adrenarche, telarche, adrenarche
- e. telarche, adrenarche, pubarche, menarche

11. Wskaż prawidłowe stwierdzenia opisujące eumenorrhoea:

- I. Jest to nieregularne krwawienie z macicy występujące nie częściej niż co 60 dni
- II. Najczęściej trwa od 3 do 5 dni
- III. Występuje jedynie u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCO)
- IV. U zdrowej kobiety występuje cyklicznie co około 28 dni
- V. U chorych z eumenorrhoea należy bezwzględnie przeprowadzić diagnostykę histopatologiczną jamy macicy

- a. I, II
- ☒ b. II, IV
- c. IV, V
- d. I, V
- e. II, III

12. Średnia objętość ejakulatu wynosi:

- a. 30–50 ml
- b. 0,3–0,5 ml
- c. 100–200 ml
- ☒ d. 2–6 ml
- e. 1,0–2,0 ml

13. Jądra męskie znajdują się w mosznie, ponieważ:

- ☒ a. optymalna temperatura dla produkcji plemników jest niższa niż normalna temperatura głęboka ciała
- b. optymalna temperatura dla produkcji plemników jest wyższa niż normalna temperatura głęboka ciała
- c. w obrębie miednicy nie ma wystarczająco miejsca, aby jądra mogły być umieszczone wewnątrz
- d. ułatwia to układowi rozrodczemu wydalanie plemników podczas ejakulacji
- e. pozycja w mosznie chroni jądra przed bezpośrednim wpływem hormonów nadnerczowych

14. Całkowicie dojrzały pęcherzyk jajnikowy nosi nazwę:

- a. Pęcherzyk pierwotny
- b. Pęcherzyk wtórny
- ☒ c. Pęcherzyk Graafa
- d. Pęcherzyk Woolfa
- e. Pęcherzyk Mullera