

第 21 章 量子力学简介

一 德布罗意波

- 实物粒子同样具有波粒二象性，波长 λ 由动量确定，频率 ν 由能量确定


$$\boxed{E = mc^2 = h\nu} \quad \xleftrightarrow{E=p^2/2m} \quad \boxed{p = mv = \frac{h}{\lambda}}$$

例 1 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波为 0.04nm ，则 U 约为 _____ V.

解 由德布罗意波， $E = eU = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$ ，因而 $U = \frac{h^2}{2me\lambda^2} = 943\text{V}$

例 2 如图所示，一束动量为 p 的电子通过缝宽为 a 的狭缝。在距离狭缝处放置一荧光屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于 _____.

解 由 $\lambda = \frac{h}{p}$ 转化为第 17 章的问题，结果为 $d = \frac{2Rh}{ap}$



二 不确定性理论

① 动量与位置的不确定关系

$$\boxed{\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}}$$

② 能量和时间的不确定性关系

$$\boxed{\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}}$$

- 微观粒子的(位置和动量)/(处于某个状态的时间与能量)不可能同时准确测定

例 3 波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda = 10^{-4}\text{nm}$ ，试利用不确定关系求光子的 x 坐标的不确定量

解 由光子动量 $p_x = \frac{h}{\lambda}$ ，得 $\Delta p_x = \left| p - p' \right| = \left| \frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \right| = h \left(\frac{\lambda' - \lambda}{\lambda\lambda'} \right) = h \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$

由不确定性关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$ ，得 $\Delta x \geq \frac{h}{2\Delta p_x} = \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda} = 0.199\text{m}$

例 4 一电子处于原子某能态的时间为 10^{-8}s ，计算该能态能量的最小不确定量；设电子从上述能态跃迁到基态所对应的光子能量为 3.39eV ，试确定所辐射光子的波长即其最小不确定量

解 电子处于某能态的时间就是 Δt ，由不确定性关系 $\Delta E \geq \frac{h}{4\pi\Delta t} = 5.276 \times 10^{-27}\text{J}$

由光子能量 $E = hc/\lambda$ ，得 $\lambda = \frac{hc}{E}$ ，因此不确定量 $\Delta\lambda = hc \frac{\Delta E}{E^2} = 3.57 \times 10^{-15}\text{m}$

- 本题型的核心在于将已知或所求的物理量的不确定量与坐标、动量、能量、时间的不确定量相关联

$$\text{若 } y = k/x, \text{ 则 } \Delta y = k\Delta x / x^2$$

三 波函数

1. 波函数与概率密度

- 波函数 $\Psi(x, y, z, t)$ 是空间与时间的函数，里面蕴含了粒子的运动状态
当粒子运动状态不随时间变化时，波函数为定态波函数 $\psi(x, y, z)$
- 波函数的值可能是复数，它的模长平方 $|\Psi(x, y, z, t)|^2 = \Psi^* \Psi$ 代表粒子在对应点出现的概率密度
- 波函数的要求：① $\Psi(x, y, z, t)$ 是单值函数 ② $\Psi(x, y, z, t)$ 是连续函数 ③ $\Psi(x, y, z, t)$ 是有限函数
④ 归一化条件： $\iiint_V \Psi^* \Psi dV = 1$ （粒子在全空间内出现概率应为 1）

2. 一维无限深势阱

- 指粒子在某一区间内势能为 0，其余区间势能为无穷大，由薛定谔方程，其只在该区间内出现

常考：一维波函数分析

已知未归一化的波函数，求归一化常数、概率密度函数、最大概率密度位置、某区间概率等

核心： $\psi^2(x)$ 是粒子出现在 x 处的概率密度

- ① 令 $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^2(x) dx = 1$ ，求出归一化常数 A
- ② 然后代入该常数得到波函数，进而得到概率密度函数 $f(x) = \psi^2(x)$
- ③ 最大概率密度位置通过对 $f(x)$ 求导得到，区间 (a, b) 出现的概率为 $\int_a^b f(x) dx$

本题型唯一的难点就是求定积分，请复习《微积分 I》对应内容（当然求积分值就直接按计算器）

例 5 设一粒子处在宽度为 L 的一维无限深势阱中，当粒子在第一激发态时，其波函数 $\psi(x) = A \sin \frac{2\pi x}{L}$ ， $0 < x < L$ 。求：（1）归一化常量 A ；（2）粒子分布的概率密度函数；（3）粒子出现概率最大的位置；（4）在 $0 \sim L/3$ 范围内发现粒子的概率。

解 （1）由归一化条件： $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^2(x) dx = \int_0^L A^2 \sin^2 \frac{2\pi x}{L} dx = A^2 \frac{L}{2} = 1 \rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{L}}$

（2）概率密度函数 $f(x) = \psi^2(x) = \frac{2}{L} \sin^2 \frac{2\pi x}{L}$

（3）（当波函数为三角函数时， $f(x)$ 求导没有直接从三角函数入手方便）

由三角函数的性质，当 $\sin \frac{2\pi x}{L} = 1$ 时， $f(x)$ 取得最大值

此时 $\frac{2\pi x}{L} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \rightarrow x = (\frac{1}{4} + k)L$ 由于 $0 < x < L$ ，因此 k 取值为 0

因此出现概率最大的位置为 $\frac{L}{4}$

（4）概率为 $\frac{2}{L} \int_0^{L/3} \sin^2 \frac{2\pi x}{L} dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4\pi} \sin \frac{4\pi}{3} = 0.4$