

جبر خطی – تمرین سری اول موعد تحویل: ۱۸ اسفند، ساعت ۲۳:۵۹ مدرس: دکتر حامد ملک نیمسال دوم ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

سوالات تئوري

۱- اگر a . b=7 باشد، بردار b را بیابید. a و $a \times b = 3i+j-5k$ بردار a را بیابید.

۲- فرض کنید حجم متوازی السطوح ساخته شده روی بردارهای b ، a و b برابر a است. حجم متوازی السطوح ساخته شده بر روی بردارهای a-c و a-c ،2a+b و a-c بردارهای a-c ،2a+b

۳- تعیین کنید که آیا موارد زیر یک زیرفضا از C[-1,1] هستند یا خیر؟

- f(1) = f(-1) به طوریکه f(-1,1) = f(-1) مجموعه توابع f(-1) = f(-1)
- f(-1) = 0 یا f(1) = 0 مجموعه توابع f(-1,1) یه طوریکه •

۴- اگر در فضای برداری توابع چند چمله ای درجه ۲ که روی بازه [0,1] تعریف شده باشند و ضرب داخلی به صورت $(f,g)=\int_0^1 f(x)$ باشد، الگوریتم گرام اشمیت را روی پایه ی $(f,g)=\int_0^1 f(x)$ اعمال کرده و پایههای متعامد یکه بسازید.

 Δ مساحت مثلثی که راس هایش نقاط زیر باشد را بیابید.

A = (0, 0, 1)

B = (2, 0, 5)

C = (0, 8, 4)

g(x) و ضرب اسکالر را g(x) و همچنین، بردار صفر را g(x) و ضرب اسکالر را g(x) و همچنین، بردار صفر را g(x) تعریف کنیم ، آنگاه g(x) یک فضای برداری است؟ (اثبات یا رد کنید)

۷- در فضای برداری $V = R^3$ مجموعه $V = R^3$ مجموعه $S=\{(4,5,6), (r,5,1), (4,3,2)\}$ وا داریم. به ازای کدام مقدار $V = R^3$ فضای برداری $V = R^3$ با نیست؟

اگر $V = R^3$ یک فضای برداری باشد:

- اگر H یک زیر مجموعه از V باشد و H={(a,b,c): c2+b2=0, a≥0} ثابت کنید که H یک زیرفضا نمی باشد.
 - اگر W یک زیر مجموعه از V باشد و W={(a,b,c): a2=b2}} ثابت کنید که W یک زیرفضا نمی باشد.

۹- با استفاده از الگوریتم گرام-اشمیت برای مجموعه بردار داده شده یک پایه متعامد یکه پیدا کنید.

$$E = \{<1, -1, 1, -1>, <1, 3, 0, 1>\}$$

سوالات كامپيوتري

هدف از انجام این تمرین بررسی مفهوم پوشش و بردار و تصویرسازی آن به کمک کتابخانه matplotlib در پایتون است. لطفاً برای اینکه تمامی پاسخها یک دست باشد، کدهای مربوط با این تکلیف را در محیط colab نوشته و لینک عمومی آن را ضمیمه پاسخهای خود کنید.

بخش اول - بررسی span

سه ماتریس زیر را در نظر بگیرید. span هر ماتریس را بررسی نمایید (هر ستون از هر ماتریس را به صورت یک بردار در نظر بگیرید.) برای پاسخ این بخش می توانید یک سلول text در کولب بسازید و با markdown توضیحات خود را به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه نمایید.


$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

بخش دوم - نمایش grid


در این بخش لازم است تا با استفاده از کتابخانه matplotlib کدهایی بنویسید تا در نهایت بتوانید مطابق آنچه که در تصویر ۱ ارائه شده است یک grid سه بعدی رسم نمایید.



grid - ا


بخش سوم – نمایش بردارها

در مورد quiver جستجو کنید و به کمک آن ماتریس C را در قالب ۳ بردار رسم کنید. در نهایت نتیجه باید مطابق صورت تصویر ۲ شود.



تصویر ۲- رسم بردارها

در تصویر ۲ بردار سبز مختصات (1, 2, 1)، بردار آبی مختصات (1, 2, 1) و بردار قرمز مختصات (1, 2, 1-) دارد و از مبدا با مختصات (0, 0, 0) رسم شده اند. به کمک تابع view_init در matplotlib این امکان وجود دارد تا زاویه نمودار سه بعدی را تغییر دهید. نمودار بالا با زاویه ۴۵ درجه به صورت تصویر ۳ در می آید. می توانید زوایای مختلف را امتحان کنید تا بهتر متوجه حضور بردارها در فضای سه بعدی شوید.



تصویر ۳- نمودار سه بعدی در زاویه ۴۵ در جه

طبق توضیحات ارائه شده بردار دو ماتریس A و B را نیز رسم نمایید.

بخش چهارم - نمایش span

ماتریس A را در نظر بگیرید. در این بخش هدف این است تا با نمایش span ماتریس A در قالب نقاطی آبی رنگ که هر کدام مشخص کننده یک بردار هستند، درستی پاسخ ارائه شده در بخش اول را بررسی نمایید. آیا خروجی به دست آمده مطابق همان چیزی است که انتظار می رفت؟ به صورت اختیاری می توانید span را برای دو ماتریس B و C نیز نمایش دهید.

نكات

فرمت نام گذاری فایل نهایی ارسالی حتماً به صورت [student name]-[HW1-[student id] باشد. برای نمونه: HW1-12345678-MyName

لینک عمومی نوتبوک و فایل py. خود را ضمیمه پاسخهای بخش تئوری کنید و در نهایت یک فایل فشرده را با فرمت نام گذاری گفته شده در سامانه LMS آپلود نمایید.

هر گونه سوال و ابهام را می توانید در گروه تلگرامی مطرح نمایید.

سلامت و موفق باشید تیم حل تمرین