

Informationen zur Wundversorgung zuhause

Für Patient:innen und Angehörige

Dieses Blatt erklärt Ihnen, worauf Sie bei der Wundversorgung zuhause achten sollten. Bitte lesen Sie es aufmerksam durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandelnden Arzt.

Verbandwechsel

- Wechseln Sie den Verband nur so oft, wie Ihnen gesagt wurde — in der Regel alle **2 bis 3 Tage**.
- Waschen Sie sich **vor jedem Verbandwechsel** gründlich die Hände mit Seife.
- Entfernen Sie den alten Verband vorsichtig. Wenn er klebt, feuchten Sie ihn mit sauberem, lauwarmem Wasser an.
- Reinigen Sie die Wunde nur mit der Lösung, die Ihnen empfohlen wurde.
- Legen Sie den neuen Verband so an, wie es Ihnen gezeigt wurde. Der Verband soll die Wunde vollständig bedecken, aber nicht zu fest sitzen.

Wunde sauber und geschützt halten

- Halten Sie den Verband **trocken**. Beim Duschen können Sie ihn mit Folie oder Duschpflaster schützen.
- Berühren Sie die Wunde **nicht** mit den Fingern.
- Tragen Sie **keine Cremes, Salben oder Hausmittel** auf die Wunde auf, es sei denn verordnet.
- Baden Sie nicht, solange die Wunde offen ist — Duschen ist besser.

Ernährung und Bewegung

Eine ausgewogene Ernährung unterstützt die Wundheilung:

- Ausreichend **Eiweiß** (Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte, Milchprodukte)
- Genug **Flüssigkeit** (mindestens 1,5 Liter pro Tag, sofern nicht anders verordnet)
- **Vitamine und Mineralstoffe** (Obst, Gemüse)
- Bewegen Sie sich regelmäßig, sofern erlaubt. Lagern Sie die betroffene Stelle wenn möglich hoch.

Bei Diabetes: Achten Sie auf eine gute Blutzuckereinstellung. Hohe Blutzuckerwerte verzögern die Wundheilung.

Warnzeichen — Wann Sie sich sofort melden sollten

- Die Wunde wird deutlich **größer** statt kleiner
- **Starke Rötung**, die sich über den Wundrand hinaus ausbreitet
- Die Wunde oder Umgebung wird **heiß** und **geschwollen**
- **Eitriger Ausfluss** (gelblich-grün, dickflüssig)
- **Unangenehmer Geruch**, der neu auftritt oder stärker wird
- **Fieber** (Temperatur über 38,0 °C)
- **Zunehmende Schmerzen**, die nicht auf Schmerzmittel ansprechen
- **Blutung**, die nicht von selbst aufhört
- **Neue Wunden** oder dunkle Stellen in der Nähe

Innerhalb von 1–2 Tagen melden:

- Der Verband ist wiederholt durchnässt
- Die Haut rund um die Wunde wird weißlich und aufgeweicht
- Sie haben das Gefühl, die Wunde heilt nicht weiter
- Der Verband hält nicht oder löst sich immer wieder

Besondere Hinweise bei Diabetes (Diabetisches Fußsyndrom)

- Kontrollieren Sie Ihre Füße **täglich** auf neue Druckstellen, Rötungen oder Blasen.
- Tragen Sie gut sitzende, weiche Schuhe. Laufen Sie **nicht barfuß**.
- Achten Sie auf eine gute **Blutzuckereinstellung**.
- Vermeiden Sie Wärmequellen an den Füßen (Wärmflasche, Heizdecke).
- Gehen Sie regelmäßig zur **medizinischen Fußpflege** (Podologie).

Was Sie NICHT tun sollten

- Entfernen Sie den Verband **nicht** unnötig oder aus Neugier.
- Verwenden Sie **keine Hausmittel** auf der Wunde (kein Honig, keine Zahnpasta, kein Mehl).
- Kratzen oder reiben Sie **nicht** an der Wunde, auch wenn es juckt.
- Setzen Sie die Wunde **keiner direkten Sonneneinstrahlung** aus.

Ihr nächster Termin

Nächste Kontrolle am: _____ um _____ Uhr

Bei: _____

Telefon für Rückfragen: _____

Notizen Ihres Behandlungsteams

Verordneter Verband:

Wundspülung:

Wechselintervall:

Besondere Anweisungen:

Dieses Informationsblatt wurde im Rahmen von WundScan AI erstellt und dient der Unterstützung Ihrer Wundversorgung zuhause. Es ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit Ihrem Behandlungsteam.

Bei dringenden Beschwerden außerhalb der Ordinationszeiten: Rufen Sie die Gesundheitshotline **1450** an oder begeben Sie sich in die nächste Notaufnahme.