

# Übung 6

Niclas Kusenbach, 360227

8th January 2026

## Aufgabe 1: Logik erster Stufe

### 1a) Es gibt mindestens zwei Berge.

**Prädikat:**  $Berg(x)$ :  $x$  ist ein Berg.

Um „mindestens zwei“ auszudrücken, müssen zwei existieren, die nicht identisch sind.

$$\exists x \exists y (Berg(x) \wedge Berg(y) \wedge \neg(x = y))$$

### 1b) Es liegt genau eine Münze in der Kiste.

**Prädikate:**  $Muenze(x)$ :  $x$  ist eine Münze,  $InKiste(x)$ :  $x$  liegt in der Kiste.  
„Genau eine“ bedeutet: Es gibt eine (Existenz) und für alle anderen, die diese Eigenschaft haben, gilt, dass sie mit der ersten identisch sind (Einzigkeit).

$$\exists x (Muenze(x) \wedge InKiste(x) \wedge \forall y ((Muenze(y) \wedge InKiste(y)) \rightarrow x = y))$$

### 1c) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

**Prädikate:**  $RG(x)$ :  $x$  ist Rechtsgeschäft,  $Sittenwidrig(x)$ :  $x$  verstößt gegen Sitten,  $Nichtig(x)$ :  $x$  ist nichtig.

Dies ist eine All-Aussage.

$$\forall x ((RG(x) \wedge Sittenwidrig(x)) \rightarrow Nichtig(x))$$

---

## Aufgabe 2: Resolution in FOL

### 2a) Formalisierung in FOL

**Prädikate:**  $Hat(x, y)$ ,  $Hund(x)$ ,  $Heult(x)$ ,  $Katze(x)$ ,  $Maus(x)$ ,  $LS(x)$  (Leichtschläfer).

**Konstante:** *John*.

i) Alle Hunde heulen in der Nacht.

$$\forall x(Hund(x) \rightarrow Heult(x))$$

ii) Jeder der Katzen hat, hat keine Mäuse.

$$\forall x((\exists y(Katze(y) \wedge Hat(x, y))) \rightarrow \neg \exists z(Maus(z) \wedge Hat(x, z)))$$

iii) Leichtschläfer haben nichts, was nachts heult.

$$\forall x(LS(x) \rightarrow \neg \exists y(Hat(x, y) \wedge Heult(y)))$$

iv) John hat eine Katze oder einen Hund.

$$\exists x(Hat(John, x) \wedge (Katze(x) \vee Hund(x)))$$

**Ziel:** Falls John ein Leichtschläfer ist, hat er keine Mäuse.

$$LS(John) \rightarrow \neg \exists z(Maus(z) \wedge Hat(John, z))$$

## 2b) Umformung in Klauselnormalform (CNF)

Wir negieren zunächst die zu beweisende Schlussfolgerung für den Widerspruchsbeweis.

**Negierte Schlussfolgerung:** Negation von  $A \rightarrow B$  ist  $A \wedge \neg B$ .

$$\begin{aligned} & \neg(LS(John) \rightarrow \neg \exists z(Maus(z) \wedge Hat(John, z))) \\ & \equiv LS(John) \wedge \exists z(Maus(z) \wedge Hat(John, z)) \end{aligned}$$

Skolemisierung: Wir ersetzen  $\exists z$  durch die Skolem-Konstante  $m_{aus}$ .

- $K_1 : \{LS(John)\}$
- $K_2 : \{Maus(m_{aus})\}$
- $K_3 : \{Hat(John, m_{aus})\}$

**Umformung der Axiome: Zu i) Hunde heulen:**

$$\forall x(\neg Hund(x) \vee Heult(x))$$

- $K_4 : \{\neg Hund(x_1), Heult(x_1)\}$

**Zu ii) Katzenbesitzer haben keine Mäuse:** Implikation auflösen  
( $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ ):

$$\forall x(\neg(\exists y(Katze(y) \wedge Hat(x, y))) \vee \neg(\exists z(Maus(z) \wedge Hat(x, z))))$$

Negation reinziehen (De Morgan & Quantorenwechsel):

$$\forall x((\forall y(\neg Katze(y) \vee \neg Hat(x, y))) \vee (\forall z(\neg Maus(z) \vee \neg Hat(x, z))))$$

Variablen umbenennen und Quantoren dropfen:

- $K_5 : \{\neg Katze(y_2), \neg Hat(x_2, y_2), \neg Maus(z_2), \neg Hat(x_2, z_2)\}$

**Zu iii) Leichtschläfer:**

$$\forall x(\neg LS(x) \vee \neg \exists y(Hat(x, y) \wedge Heult(y)))$$

$$\forall x(\neg LS(x) \vee \forall y(\neg Hat(x, y) \vee \neg Heult(y)))$$

- $K_6 : \{\neg LS(x_3), \neg Hat(x_3, y_3), \neg Heult(y_3)\}$

**Zu iv) Johns Tier:** Skolemisierung von  $\exists x$ : Wir ersetzen  $x$  durch Skolem-Konstante  $a$  (Animal).

$$Hat(John, a) \wedge (Katze(a) \vee Hund(a))$$

Dies ergibt zwei Klauseln:

- $K_7 : \{Hat(John, a)\}$
- $K_8 : \{Katze(a), Hund(a)\}$

## 2c) Resolutionsbeweis

Wir versuchen, die leere Klausel  $\square$  abzuleiten.

1. **Schritt 1:** Johns Tier  $a$  heult nicht (aus Leichtschläfer-Eigenschaft).  
Resolviere  $K_6$  und  $K_1$ :

$$\{\neg LS(x_3), \neg Hat(x_3, y_3), \neg Heult(y_3)\} + \{LS(John)\}$$

Unifikation:  $\sigma = \{x_3/John\}$

$$\Rightarrow R_1 : \{\neg Hat(John, y_3), \neg Heult(y_3)\}$$

2. **Schritt 2:** Verknüpfung mit Johns Tier  $a$ .  
Resolviere  $R_1$  und  $K_7$ :

$$\{\neg Hat(John, y_3), \neg Heult(y_3)\} + \{Hat(John, a)\}$$

Unifikation:  $\sigma = \{y_3/a\}$

$$\Rightarrow R_2 : \{\neg Heult(a)\}$$

3. **Schritt 3:** Tier  $a$  ist kein Hund (da Hunde heulen).  
Resolviere  $R_2$  und  $K_4$ :

$$\{\neg Heult(a)\} + \{\neg Hund(x_1), Heult(x_1)\}$$

Unifikation:  $\sigma = \{x_1/a\}$

$$\Rightarrow R_3 : \{\neg Hund(a)\}$$

4. **Schritt 4:** Tier  $a$  ist eine Katze (Disjunktion auflösen).  
Resolviere  $R_3$  und  $K_8$ :

$$\{\neg Hund(a)\} + \{Katze(a), Hund(a)\}$$

Keine Unifikation nötig.

$$\Rightarrow R_4 : \{Katze(a)\}$$

5. **Schritt 5:** Widerspruch zur Maus (Katzenbesitzer-Regel).  
 Resolviere  $R_4$  und  $K_5$ :

$$\{Katze(a)\} + \{\neg Katze(y_2), \neg Hat(x_2, y_2), \neg Maus(z_2), \neg Hat(x_2, z_2)\}$$

Unifikation:  $\sigma = \{y_2/a\}$

$$\Rightarrow R_5 : \{\neg Hat(x_2, a), \neg Maus(z_2), \neg Hat(x_2, z_2)\}$$

6. **Schritt 6:** Spezialisierung auf John (da John  $a$  besitzt).  
 Resolviere  $R_5$  und  $K_7$ :

$$\{\neg Hat(x_2, a), \neg Maus(z_2), \neg Hat(x_2, z_2)\} + \{Hat(John, a)\}$$

Unifikation:  $\sigma = \{x_2/John\}$

$$\Rightarrow R_6 : \{\neg Maus(z_2), \neg Hat(John, z_2)\}$$

(Bedeutung: John besitzt keine Maus).

7. **Schritt 7:** Kollision mit der Annahme, John habe Maus  $m_{aus}$ .  
 Resolviere  $R_6$  und  $K_2$ :

$$\{\neg Maus(z_2), \neg Hat(John, z_2)\} + \{Maus(m_{aus})\}$$

Unifikation:  $\sigma = \{z_2/m_{aus}\}$

$$\Rightarrow R_7 : \{\neg Hat(John, m_{aus})\}$$

8. **Schritt 8:** Abschluss.  
 Resolviere  $R_7$  und  $K_3$ :

$$\{\neg Hat(John, m_{aus})\} + \{Hat(John, m_{aus})\}$$

$\Rightarrow \square$  (Leere Klausel)

Da die leere Klausel abgeleitet werden konnte, ist der Widerspruchsbeweis erbracht. Die ursprüngliche Behauptung ist wahr.