

DDS:

Precaução e Isolamento

POP: HSLC.INST.PS.008





Precauções e Isolamento:

- Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis, evitando assim, a transmissão de micro-organismos dos pacientes infectados para outros pacientes, visitantes ou mesmo para os profissionais.





Precauções e Isolamento:

□ Tipos de Precaução e Isolamento

➤ Precaução Padrão.

➤ Precaução Específica

➤ Precaução de Contato.

➤ Precaução para Gotículas.

➤ Precaução para Aerossol.

➤ Precaução Mista:
Contato + Gotículas;
Contato + Aerossóis.

Precauções e Isolamento:

➤ Precaução Padrão



Higienização das mãos



Luas e Avental



Óculos e Máscara



Caixa perfuro-cortante

Atenção!!!


Visitas: Atentar para a entrada de pessoas com sintomas respiratórios, ou para qualquer sinal de doença transmissível, essas pessoas não devem entrar no quarto

- Deve ser seguida para **TODOS OS PACIENTES** independente da suspeita ou não de infecções.



Precauções e Isolamento:

➤ Precaução de Contato




Ex: Diarréia, Bactérias Multirresistentes.

Obs: no transporte, o colaborador que transportar o paciente vai paramentado e outro colaborador sem paramentação vai abrindo as portas; sempre avisar o setor sobre o tipo de isolamento.

Precauções e Isolamento:

➤ Precaução para Gotículas



Quarto privativo




Ex: Coqueluche; Influenza.

Obs: no transporte o paciente deve utilizar a máscara comum; sempre avisar o setor sobre o tipo de isolamento com antecedência.

Precauções e Isolamento:

➤ Precaução para Aerossol



Ex: Tuberculose e Sarampo.

Obs: no transporte o paciente deve utilizar a máscara comum; sempre avisar o setor sobre o tipo de isolamento com antecedência.



Precauções e Isolamento:

➤ Precaução Mista

☐ Contato + Gotículas



REDE D'OR
SÃO JUIZ

Ex: VSR; Caxumba.

☐ Contato + Aerossóis



Ex: Covid.



Precauções e Isolamento:

➤ Ambiente Protetor

☐ São medidas adotadas para proteção de pacientes imunossuprimidos.

- ☐ Admissão de pacientes pré-transplante de medula óssea;
- ☐ Pacientes pós-transplante de medula óssea (até 100 dias após);
- ☐ Todos os pacientes com diagnóstico de LMA e LLA.
- ☐ Pacientes neutropênicos severos – menor que 500/mm³ de neutrófilos



Precauções e Isolamento:

➤ Ambiente Protetor

☐ Recomendações gerais.

- ☐ Manter as medidas de precaução padrão.
- ☐ Flores ou plantas frescas não devem ser permitidas no quarto de pacientes neutropênicos.
- ☐ Caso o paciente precise sair do quarto, recomenda-se utilizar máscara 95.
- ☐ Os pacientes devem ser alocados em quarto com PRESSÃO POSITIVA.
- ☐ Restringir o número de visitantes, com ênfase na recomendação de evitar receber visita de crianças.
- ☐ Não receber visitantes com doenças infecciosas de transmissão respiratória ou por contato.

Atenção!!!
Em isolamentos por motivo de Ambiente Protetor não é preconizado o uso do avental descartável.



Precauções e Isolamento:

Tabela de Precauções por Doenças



	ANEXO 3				 Complexo
	Vigência 31/01/2026	Revisão 01	Código HSLC.INST.PS.008	Página 1/3	
PRECAUÇÕES POR DOENÇA					

TABELA DE PRECAUÇÕES POR DOENÇA

Legenda: C – precaução de contato; R: precaução para gotícula/respiratória; A: precaução para aerossóis; P: precaução padrão; C+R; C+A; DD: durante duração dos sintomas; DH: durante hospitalização; CN: cultura negativa; I indeterminado

DOENÇA	TIPO DE PRECAUÇÃO	DURAÇÃO
Vírus respiratórios		
Síndrome respiratória aguda grave	C + R	
Influenza, rinovírus, bocavírus, coronavírus	R	
VSR, metapneumovírus, parainfluenza	C+R	
Adenovírus	C+R	
COVID-19	C+A	
Monkeypox (varíola dos macacos)	C+A	
Abscesso/celulite com secreção não contida por curativo	C	DD
Adenovírus (conjuntivite)	C	DD
Arbovirose (Dengue, Febre amarela)	P	
Aspergilose	P	
Bactéria multirresistente	C	Indeterminado
Staphylococcus aureus R a vancomicina, linezolida	C	Indeterminado
Enterococcus spp. R a vancomicina, linezolida	C	Indeterminado
Gram negativos R a meropenem, imipenem, polimixina	C	DH (consultar SCIH)
Candidíase	P	
Caxumba	R	9 dias após da parotida
Citomegalovírus	P	
Clamídia, qualquer localização	P	
Cólera	P	
Conjuntivite bacteriana ou gonocócica	P	
Conjuntivite viral	C	DD
Coqueluche	R	5 dias após início tratamento
Creutzfeld-Jakob	P	
Criptococose	P	
Diarreia incontinente	C	48h após cessar a diarreia
Diarreia por Cryptosporidium, Campylobacter, E. coli, Giardia, Salmonella, Shigella, Yersinia, enterovírus, intoxicação alimentar	P	
Diarreia por Clostridium difficile, norovírus, rotavírus, adenovírus	C	48h após cessar a diarreia
Difteria cutânea	C	com 2 CN
Difteria faríngea	R	com 2 CN
Doença da arranhadura do gato	P	
Ebola, vírus	C	DH

RESERVADA



REDE DOR	ANEXO 3				SÃO LUIZ Campinas
	Vigência 31/01/2026	Revisão 01	Código HSLC.INST.PS.008	Página 2/3	
PRECAUÇÕES POR DOENÇA					

Escabiose	C	24 hs após início tratamento
Esquistossomose	P	
Estreptococia em adultos (estreptococo B hemolítico) Escarlatina, amigdalite	P	
Exantema súbito	P	
Febre tifoide	P	
Gangrena gasosa	P	
Gonorréia	P	
Hantavírus	P	
Helicobacter pylori	P	
Hepatite A	P	
Hepatite A em incontinentes	C	15 dias após início dos sintomas
Hepatite B, C e	P	
Herpes simples disseminado e em imunocomprometidos	C	DD
Herpes simples recorrente (pele, oral, genital) ou encefalite por herpes	P	
Herpes zoster localizado em imunocompetente	P	
Herpes zoster localizado em imunocomprometido	C + A	DD
Herpes zoster disseminado em qualquer paciente (Consecutivos 2 ou mais dermatomos, não consecutivos mais que 2 dermatomos)	C + A	DD
HIV/AIDS	P	
Leptospirose	P	
Listeria	P	
Lyme, doença de	P	
Malária	P	
Meningite sem etiologia OU H. influenzae OU N. meningitidis	R	24h após início tratamento
Meningite por outra etiologia	P	
Micobacteriose atípica	P	
Molusco contagioso	P	
Mononucleose	P	
Parvovírus	R	7 dias
Pediculose	C	24 hs após início tratamento
Pneumonia bacteriana	P	
Pneumonia por Mycoplasma spp.	R	DD
Pneumonia por H. influenzae	R	24 hs após início tratamento
Pneumonia por Pneumocystis jiroveci	P	
Raiva	P	
Riquetsiose (Febre maculosa, Febre Q)	P	
Ritter, síndrome de (Síndrome da pele escaldada)	C	DH

RESERVADA

Precauções e Isolamento:

Fluxograma – Critérios pra Precaução



Atenção!!!

Sempre que levantada alguma suspeita o paciente deve ser isolado, e a retirada do isolamento apenas pode ser feita após avaliação do SCIH!



Isolamento Empírico

- Internação Hospitalar >24horas em outra Instituição nos últimos 3 meses.
- Procedimento cirúrgico em outra Instituição nos últimos 3 meses.
- Procedente de homecare.
- Grande queimado.
- Programa de diálise externo
- Proveniente de outra Instituição e/ou com dispositivo invasivo;
- Pacientes colonizados com bactérias multirresistentes.

Enfermeiro



Instituir isolamento e Lança no Prontuário Eletrônico Tasy

Realiza coleta dos *swab's* de vigilância:
3 – Retais e 1 Swab Nasal
Pesquisa Cultura de Rastreio:

- Acineto Mdr Swab Retal (Matrix)
- Ecr Swab Retal (Matrix)
- Pseudomonas Mdr Swab Retal (Matrix)
- Enterococcus Vre Swab Retal (Matrix)
- Staphylococcus aureus (Matrix)



Precauções e Isolamento:



Precauções e Isolamento:

➤ Sequência Paramentação



Avental
ou Capote



Máscara de Proteção
Respiratória



Óculos ou Protetor
Facial



Gorro



Luvas



Precauções e Isolamento:

➤ Sequência Desparamentação



Luvas



Avental
ou Capote



Gorro



Óculos ou Protetor
Facial



Máscara de Proteção
Respiratória

Precauções e Isolamento:

Educação do Paciente e Familiar



SCIH - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

PACIENTE EM PRECAUÇÕES

As precauções são medidas preventivas para evitar a transmissão de agentes patogênicos. Por isso é **IMPORTANTE** atentar-se as medidas recomendadas nas placas de sinalizações, durante a visita ao paciente. Em caso de dúvidas, consulte a equipe de enfermagem.

Exemplos de placas de precauções:

PRECAUÇÃO PARA GOTÍCULAS CAUTION FOR DROPLETS	PRECAUÇÃO DE CONTATO + GOTÍCULA CAUTION CONTACT + DROPLET	PRECAUÇÃO DE CONTATO CAUTION CONTACT
Usar de máscara cirúrgica (comum).	Usar máscara cirúrgica e avental descartável (manga longa) e luvas de procedimento.	Usar avental descartável (manga longa) e luvas de procedimento.
PRECAUÇÃO PARA AEROSSÓIS AEROSOLS CAUTION	PRECAUÇÃO DE CONTATO + AEROSSÓIS CAUTION CONTACT + AEROSOLS	
Usar máscara N95.	Usar máscara N95 e avental descartável (manga longa) e luvas de procedimento.	

LAVAGEM DAS MÃOS

A lavagem das mãos é uma das medidas mais eficazes no combate à infecção. É por essa que todos os visitantes devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar álcool em gel antes da visita.



Higienização das mãos com solução alcoólica durante 20 a 30 segundos

Higienização das mãos com água e sabão durante 40 a 60 segundos



Precauções e Isolamento

DDS Precaução e Isolamento - Nov
embro 2025





REDE *D'*OR

www.rededor.com.br