## Réflexion d'une onde électromagnétique sur des plans métalliques en incidence oblique

On considère une onde plane progressive se propageant dans le vide, selon le vecteur d'onde  $\vec{k} = k \cos \theta \vec{u_x} + k \sin \theta \vec{u_y}$  et à la pulsation  $\omega$ . Elle arrive sur un plan métallique infiniment conducteur situé sur le demi-espace x>0. On notera  $\vec{E_i}$  et  $\vec{B_i}$  respectivement le champ électrique et le champ magnétique incidents. Le champ électrique est polarisé rectilignement selon Oz et son amplitude est  $E_0$ .

- ♡ Retrouver l'équation de propagation des champs électrique et magnétique. Quelle est la relation de dispersion associée ?
- $\heartsuit$  Expliciter les expressions des champs  $\vec{E_i}$  et  $\vec{B_i}$ .

En arrivant sur l'interface, les relations de passage du champ électromagnétique imposent l'apparition d'une onde réfléchie, dont on notera  $\vec{E_r}$  et  $\vec{B_r}$  les champ électrique et magnétique. On supposera que  $\vec{E_r}$  s'écrit sous la forme :

$$\vec{E_r} = \vec{E_0'} \exp(i\vec{k_r} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

- $\heartsuit$  Que valent les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  à l'intérieur de la plaque ? Justifier.
- $\heartsuit$  En utilisant les relations de passage, écrire  $\vec{E_r}$  en fonction de  $E_0$ , k,  $\omega$  et  $\theta$ . En déduire l'expression du champ magnétique réfléchi,  $\vec{B_r}$ .
- $\heartsuit$  Quelle est alors l'expression du champ électrique  $\vec{E}$  résultant pour x<0 ? De quel type d'onde s'agit-il ?
- $\heartsuit$  On place une seconde plaque métallique en x=-L. Montrer que la présence de la seconde plaque impose une discrétisation du spectre, c'est-à-dire que seules des fréquences  $\omega$  discrètes peuvent se propager pour un angle  $\theta$  donné. Tracer les valeurs prises par  $\omega$  en fonction de  $\theta$ .
- $\heartsuit$  Quelle est la valeur minimale que peut prendre  $\omega$ ? Justifier.
- $\heartsuit$  Démontrer que  $k_y = \vec{k} \cdot \vec{u_y}$  vérifie l'équation dite de dispersion des modes d'une onde transverse électrique :

$$k_y^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \tag{1}$$

- ♥ Quel est le courant surfacique à la surface de la plaque ?
- $\heartsuit$  Calculer l'expression du champ magnétique résultant  $\vec{B}$  entre les deux plaques et en déduire l'expression du vecteur de Poyting. Commenter.

## Propagation d'une onde radio dans un plasma en présence d'un champ magnétique longitudinal

Le plasma ionosphérique est assimilé à un milieu conducteur ionisé de temps de relaxation infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collisions. Le plasma est supposé neutre et sa densité électronique est  $n_0$ . On tient compte ici du champ magnétostatique terrestre désigné par  $\vec{B}_{ext} = B_{ext}\vec{u_z}$ , dirigé selon la direction de propagation Oz d'une OPPM électromagnétique de pulsation  $\omega$ , dont le champ est représenté par :

$$(\vec{E}, \vec{B}) = (\vec{E}_0, \vec{B}_0) \exp[j(\omega t - kz)]$$

On note  $\omega_p = \sqrt{n_0 e^2/m\varepsilon_0}$  la pulsation de plasma du milieu et  $\omega_c = eB_{ext}/m$  la pulsation cyclotron.

♠ Montrer que le champ magnétique terrestre intervient dans la conduction électrique du milieu, qui peut être représenté par une relation linéaire :

$$\vec{j} = [\gamma] \vec{E}$$

où  $[\gamma]$  est une matrice de conductivité complexe, à exprimer en fonction de  $\omega$ ,  $\omega_c$  et  $\omega_p$ .

Une onde est polarisée circulairement lorsque les composantes transverses sont déphasées de  $\pm \pi/2$ , c'est-à-dire dans notre cas, en notation réelle :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e_x} \pm E_0 \sin(\omega t - kz)\vec{e_y}$$
(2)

Un signe "+" correspond à une onde polarisée circulairement "gauche" et le signe "-" à une onde polarisée circulaire "droite". On cherche à comprendre la propagation de ces ondes dans le plasma.

- ♠ Pourquoi appelle t-on cette polarisation "circulaire"?
- ♠ Montrer que l'étude de la propagation des OPPM électromagnétiques peut être ramenée à celle d'ondes polarisées circulairement qui satisfont des relations de dispersion à préciser.
- $\spadesuit$  On note  $\varepsilon_{rg}$  et  $\varepsilon_{rd}$  les permittivités relatives équivalentes associées respectivement à la propagation des ondes circulaires gauche et des ondes circulaires droites, dont les graphes sont donnés ci-dessous. Préciser les domaines du spectre électromagnétique pour lesquels les ondes étudiées se propagent effectivement dans le plasma.

Une onde métrique traverse une épaisseur L de plasma dans les conditions de l'étude effectuée. A l'entrée de la couche de plasma, l'onde est polarisée rectilignement.

- ♠ Montrer, dans le cas général, qu'un onde polarisée rectilignement peur s'écrire comme la superposition d'une onde polarisée circulaire droite et circulaire gauche.
- $\spadesuit$  Justifier alors que l'effet du plasma consiste, aux hautes fréquences, en une rotation de la direction de polarisation de l'onde. Préciser la valeur de cet angle si L=1km et  $\lambda_0=30$ cm.