

① a)
$$E\left(2^{\sum_{m=1}^n \xi_m}\right) = E\left[\prod_{m=1}^n 2^{\xi_m}\right] = \prod_{m=1}^n E[2^{\xi_m}] = E[2^{\xi_1}]^n = (p+1)^n$$

$$E(2^{\xi_1}) = p \cdot 2^1 + (1-p)2^0 = 2p - p + 1 = p+1$$

② b)
$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - p > 0.02\right) \leq e^{-2n(0.02)^2}$$

a)
$$e^{-2\bar{n}(0.02)^2} = 0.01$$

$$-2\bar{n}(0.02)^2 = \log(0.01)$$

$$\bar{n} = \frac{\log(0.01)}{-2 \cdot 4 \cdot 10^{-4}} = \frac{-4.6}{-8 \cdot 10^{-4}}$$

$$\bar{n} = 5750$$

$\forall n > \bar{n}$ a desigualdade é certa $\Rightarrow \forall n > 5000$ não se cumpre


b)
$$e^{-2\bar{n}(0.02)^2} = 0.05$$

$$\bar{n} = \frac{\log(0.05)}{-8 \cdot 10^{-4}} = \frac{-3}{-8 \cdot 10^{-4}}$$

$$\bar{n} = 3750$$

$\forall n > \bar{n}$ a desigualdade é certa. $\Rightarrow \forall n > 4000$ também

③ d) árvore de altura $k=2$



(2)

$$\hat{p}(0|0) = 3/7$$

$$\hat{p}(0|1) = 3/8$$

$$\hat{p}(1|0) = 4/7$$

$$\hat{p}(1|1) = 5/8$$

- Testar se $w=0$ é contexto

$$\Delta(0) = \max_{a,b \in A} |\hat{p}(a|0) - \hat{p}(a|0b)|$$

$$a=0, b=0 \quad \hookrightarrow |\hat{p}(0|0) - \hat{p}(0|00)| = |3/7 - 1/3| = 2/21$$

$$a=0, b=1 \quad |\hat{p}(0|0) - \hat{p}(0|01)| = |3/7 - 1/3| = 2/21$$

$$a=1, b=0 \quad |\hat{p}(1|0) - \hat{p}(1|00)| = |4/7 - 2/3| = 2/21$$

$$a=1, b=1 \quad |\hat{p}(1|0) - \hat{p}(1|01)| = |4/7 - 2/3| = 2/21$$

$$\Delta(0) = 2/21 = 0.095 > \delta \Rightarrow \text{no poder (manter as sequências 00)}$$

- Testar se $w=1$ é contexto

$$\Delta(1) = \max_{a,b \in A} |\hat{p}(a|1) - \hat{p}(a|1b)|$$

$$a=0, b=0 \quad \hookrightarrow |\hat{p}(0|1) - \hat{p}(0|10)| = |3/8 - 2/3| = 7/24$$

$$a=0, b=1 \quad |\hat{p}(0|1) - \hat{p}(0|11)| = |3/8 - 2/5| = 1/40$$

$$a=1, b=0 \quad |\hat{p}(1|1) - \hat{p}(1|10)| = |5/8 - 1/3| = 7/24$$

$$a=1, b=1 \quad |\hat{p}(1|1) - \hat{p}(1|11)| = |5/8 - 3/5| = 1/40$$


$$\Delta(1) = 7/24 = 0.29 > \delta \Rightarrow \text{no poder}$$

A árvore resultante é $\tau = \{00, 10, 01, 11\}$

④ opção correta (a)

⑤ opção correta (a)

⑥^a



$$\hat{p}(0|0) = 3/6$$

$$\hat{p}(0|1) = 2/7$$

$$\hat{p}(1|0) = 3/6$$

$$\hat{p}(1|1) = 5/7$$

$$\hat{p}(0|00) = 1/3$$

$$\hat{p}(0|01) = 1/2$$

$$\hat{p}(0|10) = 1/3$$

$$\hat{p}(0|11) = 1/4$$

$$\hat{p}(1|00) = 2/3$$

$$\hat{p}(1|01) = 1/2$$

$$\hat{p}(1|10) = 2/3$$

$$\hat{p}(1|11) = 3/4$$

$$\Delta(0) = \max_{a,b \in A} |\hat{p}(a|0) - \hat{p}(a|0b)|$$

$$\hookrightarrow |\hat{p}(0|0) - \hat{p}(0|00)| = |3/6 - 1/3| = 1/6$$

$$|\hat{p}(0|0) - \hat{p}(0|01)| = |3/6 - 1/2| = 0$$

$$\Rightarrow \Delta(0) = 1/6 = 0.17$$

$$\Delta(1) = \max_{a,b \in A} |\hat{p}(a|1) - \hat{p}(a|1b)|$$

$$\hookrightarrow |\hat{p}(0|1) - \hat{p}(0|10)| = |2/7 - 1/3| = 1/21$$

$$|\hat{p}(0|1) - \hat{p}(0|11)| = |2/7 - 1/4| = 1/28$$

$$\Rightarrow \Delta(1) = 1/21 = 0.047$$

Para obter $\hat{C} = \{1, 00, 10\}$ precisamos $\Delta(0) > \delta$ e $\Delta(1) < \delta$

$$\Rightarrow 0.047 < \delta < 0.17 \Rightarrow \delta = 0.05$$

7) Opção correta é b.

$$\tau = \{0, 01, 11\}$$

8) ^c
 $X_{-1} = 0$

$$X_0 = \mathbb{1}_{\{U_0 > p(0|C_T(X_{-1}))\}} = \mathbb{1}_{\{U_0 > p(0|0)\}} = 1$$

$$X_1 = \mathbb{1}_{\{U_1 > p(0|C_T(X_{-1}^0))\}} = \mathbb{1}_{\{U_1 > p(0|10)\}} = 1$$

$$X_2 = \mathbb{1}_{\{U_2 > p(0|C_T(X_{-1}^1))\}} = \mathbb{1}_{\{U_2 > p(0|11)\}} = 0$$

$$X_3 = \mathbb{1}_{\{U_3 > p(0|C_T(X_{-1}^2))\}} = \mathbb{1}_{\{U_3 > p(0|10)\}} = 1$$

$$X_4 = \mathbb{1}_{\{U_4 > p(0|C_T(X_{-1}^3))\}} = \mathbb{1}_{\{U_4 > p(0|110)\}} = 1$$

$$X_5 = \mathbb{1}_{\{U_5 > p(0|C_T(X_{-1}^4))\}} = \mathbb{1}_{\{U_5 > p(0|111)\}} = 0$$

$\Rightarrow X_0=1, X_1=1, X_2=0, X_3=1, X_4=1, X_5=0 \Rightarrow \textcircled{c}$

VC

• $S(F, 1) = 2^1 = 2$
 $S(F, 2) < 2^2$

$\Rightarrow VC(F) = 1.$

Casos que não consegue classificar.



• $S(F', 1) = 2^1 = 2$
 $S(F', 2) = 2^2 = 4$
 $S(F', 3) < 2^3$

$\Rightarrow VC(F) = 2$

