Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Учебно-исследовательская работа №1 по дисциплине Моделирование
Статистический анализ результатов измерений

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна
Поток: 2.3

Санкт-Петербург 2026 г.

Содержание

Задание 3
Ход работы 5
Цель работы 5
Задачи 5
Расчёт характеристик исходной последовательности 5
Промежуточные выводы 6
Анализ характера исходной последовательности 7
Промежуточные выводы 7
Автокорреляционный анализ исходной последовательности 8
Промежуточные выводы 8
Гистограмма распределения частот 9
Промежуточные выводы 10
Выбор и расчёт параметров аппроксимирующего закона 11
Промежуточные выводы 11
Реализация генератора гиперэкспоненциального распределения 12
Промежуточные выводы 12
Исследование сгенерированной последовательности 13
Промежуточные выводы 16
Итоговое сравнение последовательностей 17
Промежуточные выводы 19
Вывод 20

Задание

Вариант: 29

Выполнить обработку заданной числовой последовательности для случаев, когда путём измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины. Для каждого объёма выборки необходимо:

- рассчитать оценку математического ожидания;
- рассчитать оценку дисперсии;
- определить среднеквадратическое отклонение;
- определить коэффициент вариации;
- найти доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9, 0,95 и 0,99;
- рассчитать относительные отклонения полученных значений от результатов для выборки из 300 величин.

Результаты расчётов представить в виде таблицы и сформулировать вывод об изменении оценок при увеличении объёма выборки.

Построить график всех 300 значений исходной последовательности. По виду графика определить, является ли последовательность возрастающей, убывающей или периодической; при наличии периодичности оценить её период.

Выполнить автокорреляционный анализ исходной последовательности для сдвигов от 1 до 10. Результаты представить в числовом и графическом виде и сделать вывод о том, можно ли считать последовательность случайной.

Построить интервальный ряд и гистограмму распределения частот исходной числовой последовательности. По виду гистограммы охарактеризовать форму распределения значений.

Выполнить аппроксимацию закона распределения исходной последовательности по двум начальным моментам. Выбрать вид распределения по коэффициенту вариации и рассчитать параметры выбранного закона.

Реализовать программный генератор случайных величин в соответствии с полученным аппроксимирующим законом и сформировать последовательность из 300 значений.

Для сгенерированной последовательности повторить расчёт числовых характеристик, построить график значений и гистограмму с теоретической плотностью, а также выполнить автокорреляционный анализ. Результаты сравнить с одноимёнными характеристиками исходной последовательности.

Выполнить итоговое сравнение исходной и сгенерированной последовательностей: сопоставить их гистограммы, плотность распределения и автокорреляционные функции, заполнить форму 3, вычислить коэффициент корреляции Пирсона и оценить качество построенной модели.

Ход работы

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки её числовых характеристик при различных объёмах выборки.

Задачи

Для первых 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений исходной последовательности необходимо рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы для математического ожидания. Полученные оценки требуется сравнить с результатами для полной выборки из 300 значений.

Расчёт характеристик исходной последовательности

Для выборки объёма n оценка матожидания:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Несмещённая оценка дисперсии и СКО:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}$$

Коэффициент вариации:

$$v = \frac{s}{|\overline{x}|}$$

Полуширина доверительного интервала для математического ожидания с доверительной вероятностью p вычисляется с использованием распределения Стьюдента:

$$h_p = t_{\frac{1+p}{2},n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

Относительное отклонение характеристики, рассчитанной для первых n значений, от результата полной выборки:

$$\delta_{\theta(n)} = \frac{|\theta_n - \theta_{300}|}{|\theta_{300}|} \cdot 100\ \%$$

В таблице 1 приведены результаты расчётов.

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	15,038	16,579	19,886	21,972	18,153	19,626
	%	23,38	15,53	1,33	11,95	7,51	0,00
Дов. инт. 0,9	Знач.	±9,704	±10,880	±7,402	±6,205	±3,477	±3,171
	%	206,04	243,13	133,44	95,69	9,65	0,00
Дов. инт. 0,95	Знач.	±11,976	±13,170	±8,872	±7,415	±4,149	±3,782
	%	216,65	248,23	134,60	96,07	9,70	0,00
Дов. инт. 0,99	Знач.	±17,204	±18,002	±11,832	±9,815	±5,472	±4,982
	%	245,33	261,34	137,50	97,01	9,83	0,00
Дисперсия	Знач.	280,252	791,841	974,620	1396,587	885,238	1107,975
	%	74,71	28,53	12,04	26,05	20,10	0,00
С.к.о.	Знач.	16,741	28,140	31,219	37,371	29,753	33,286
	%	49,71	15,46	6,21	12,27	10,61	0,00
К-т вариации	Знач.	1,113	1,697	1,570	1,701	1,639	1,696
	%	34,36	0,08	7,44	0,29	3,36	0,00

Таблица 1. Характеристики заданной числовой последовательности (вариант 29)

В строках доверительных интервалов указана полуширина интервала, в столбцах - количество чисел от выборки, начиная с начала

Примечание. Относительные отклонения рассчитаны от одноимённых значений для выборки объёма 300, поэтому в последнем столбце они равны нулю, не получилось объединить ячейки.

Промежуточные выводы

При увеличении объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения изменяются немонотонно. Для полной выборки математическое ожидание равно 19,626, дисперсия - 1107,975, а среднеквадратическое отклонение - 33,286.

Полуширина доверительного интервала с вероятностью 0,95 уменьшается с 13,170 при $n = 20$ до 3,782 при $n = 300$, поэтому оценка математического ожидания на большой выборке становится точнее. Коэффициент вариации полной выборки равен 1,696. Значение больше единицы указывает на большой разброс исходных данных относительно среднего значения.

Анализ характера исходной последовательности

Для определения характера исходной последовательности построен график всех 300 значений в порядке их следования.




Рисунок 1. График значений исходной числовой последовательности

Промежуточные выводы

Последовательность не является ни возрастающей, ни убывающей: малые значения чередуются с отдельными резкими выбросами. Повторяющийся рисунок колебаний на графике отсутствует, поэтому явная периодичность и её период на данном этапе не обнаружены. Более строгая проверка периодических зависимостей выполняется с помощью автокорреляционного анализа на следующем этапе.

Автокорреляционный анализ исходной последовательности

Выборочная автокорреляция при сдвиге k рассчитывается по формуле:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k}(x_i - \overline{x})(x_{i+k} - \overline{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$$

Коэффициенты рассчитаны для сдвигов от 1 до 10 и представлены в таблице 2.

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	0,0169	−0,0064	−0,0610	−0,0580	−0,0760	0,0514	0,0120	0,0280	0,0269	0,0951

Таблица 2. Результаты автокорреляционного анализа

Для ориентировочной оценки значимости использованы границы случайных колебаний $\pm 1, \frac{96}{\sqrt{n}}$. При $n = 300$ граница по модулю равна 0,1132.




Рисунок 2. Автокорреляция исходной числовой последовательности

Промежуточные выводы

Все коэффициенты автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 находятся внутри границ $\pm 0,1132$. Максимальный по модулю коэффициент получен при сдвиге 10 и равен 0,0951. Статистически заметной линейной зависимости между соседними и разнесёнными элементами на исследованных сдвигах не обнаружено. Поэтому исходную последовательность можно считать случайной; признаки периодичности также отсутствуют.

Гистограмма распределения частот

Число равных интервалов определено по правилу квадратного корня:

$$m = \lceil \sqrt{n} \rceil = \lceil \sqrt{300} \rceil = 18$$

Ширина интервала рассчитывается по формуле:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{m} = \frac{273,304 - 3,290}{18} = 15,0008$$

Границы интервалов и абсолютные частоты приведены в таблице 3. Последний интервал включает правую границу.

№	Левая граница	Правая граница	Частота
1	3,290	18,291	237
2	18,291	33,292	15
3	33,292	48,292	11
4	48,292	63,293	14
5	63,293	78,294	8
6	78,294	93,295	1
7	93,295	108,295	5
8	108,295	123,296	0
9	123,296	138,297	4
10	138,297	153,298	1
11	153,298	168,299	0
12	168,299	183,299	1
13	183,299	198,300	2
14	198,300	213,301	0
15	213,301	228,302	0
16	228,302	243,302	0
17	243,302	258,303	0
18	258,303	273,304	1

Таблица 3. Границы интервалов и частоты значений исходной ЧП




Рисунок 3. Гистограмма распределения частот исходной ЧП

Промежуточные выводы

В первом интервале от 3,290 до 18,291 находится 237 наблюдений, то есть 79% всей выборки. В первых пяти интервалах сосредоточено 285 значений, или 95% выборки. При увеличении значений частоты быстро уменьшаются, при этом встречаются отдельные наблюдения вплоть до 273,304. Следовательно, распределение имеет выраженную правостороннюю асимметрию и длинный правый хвост. Такая форма вместе с коэффициентом вариации 1,696 служит основанием для рассмотрения гиперэкспоненциального закона на следующем этапе.

Выбор и расчёт параметров аппроксимирующего закона

Коэффициент вариации исходной последовательности больше единицы, поэтому в соответствии с методикой Алиева для аппроксимации выбран двухфазный гиперэкспоненциальный закон H_2. Его плотность имеет вид:

$$f(x) = \frac{q}{t_1}\exp\left(-\frac{x}{t_1}\right) + \frac{1-q}{t_2}\exp\left(-\frac{x}{t_2}\right), \quad x \geq 0$$

Здесь q — вероятность выбора первой экспоненциальной фазы, а t_1 и t_2 — средние значения фаз. Первый и второй начальные моменты распределения:

$$M[X] = qt_1 + (1-q)t_2$$

$$M[X^2] = 2(qt_1^2 + (1-q)t_2^2)$$

При подборе по двум моментам используется моментная дисперсия с делением на n, а не несмещённая оценка с делением на $n-1$, применённая в форме 1. Для исходной последовательности получены:

$$M[X] = 19,626160, \quad M[X^2] = 1489,467689$$

$$D[X] = 1104,281533, \quad \nu = 1,693186$$

Двухфазное гиперэкспоненциальное распределение имеет три параметра, поэтому два момента не определяют их однозначно. Значение q выбирается из условия:

$$q \leq \frac{2}{1+\nu^2} = 0,517213$$

Выбрано простое внутреннее значение $q = 0,25$. Оно удовлетворяет ограничению и оставляет оба средних фаз положительными. Параметры фаз рассчитываются по формулам:

$$t_1 = M[X]\left(1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}(\nu^2-1)}\right)$$

$$t_2 = M[X]\left(1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}(\nu^2-1)}\right)$$

Параметр	Значение
Вероятность первой фазы q	0,250000
Среднее первой фазы t_1	52,468862
Среднее второй фазы t_2	8,678593
Интенсивность $\lambda_1 = \frac{1}{t_1}$	0,019059
Интенсивность $\lambda_2 = \frac{1}{t_2}$	0,115226

Таблица 4. Параметры двухфазного гиперэкспоненциального распределения

Характеристика	Исходная ЧП	H_2
Математическое ожидание	19,626160	19,626160
Второй начальный момент	1489,467689	1489,467689
Дисперсия	1104,281533	1104,281533
Коэффициент вариации	1,693186	1,693186

Таблица 5. Проверка совпадения моментов

Промежуточные выводы

Двухфазное гиперэкспоненциальное распределение с параметрами $q = 0,25$, $t_1 = 52,468862$ и $t_2 = 8,678593$ точно воспроизводит первые два эмпирических момента исходной последовательности. Первая фаза описывает редкие большие значения, вторая — преобладающие малые. Форму модели следует проверить графически на следующем этапе.

Реализация генератора гиперэкспоненциального распределения

Для формирования каждого значения генерируются два независимых равномерных псевдослучайных числа U_0 и U_1 из интервала $(0; 1)$. Первое число определяет экспоненциальную фазу:

$$t = \begin{cases} t_1 & \text{при } U_0 < q \\ t_2 & \text{при } U_0 \geq q \end{cases}$$

После выбора фазы значение получается методом обратного преобразования:

$$X = -t \ln(1 - U_1)$$

При $q = 0,25$ первая фаза со средним $t_1 = 52,468862$ выбирается с вероятностью 0,25, а вторая фаза со средним $t_2 = 8,678593$ — с вероятностью 0,75. Операция повторяется 300 раз.

Для воспроизводимости результатов генератор инициализируется значением `seed = 29`. Программная реализация алгоритма представлена на рисунке 4.

```python
def run() -> None:

    parameters = fit_h2(load_values()) # парсим параметры

    values = generate_values(parameters) # генерим значения

    RESULTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # сохраняем в папку

    header = f"seed={SEED}; q={parameters.q:.6f}; t1={parameters.t1:.6f}; t2={parameters.t2:.6f}"

    np.savetxt(RESULTS_DIR / "generated.txt", values, fmt="%.10f", header=header) # сохраняем в папку

    print(f"6. Сгенерировано {len(values)} значений с seed = {SEED}.")
```

```python
def generate_values(parameters: H2Parameters) -> np.ndarray:

    generator : Generator = np.random.default_rng(SEED) # задаем значения по сиду
    phase_numbers = generator.random(VALUES_COUNT)
    value_numbers = generator.random(VALUES_COUNT)

    # Первое число выбирает фазу, второе преобразуется в экспоненциальную величину
    phase_means = np.where(phase_numbers < parameters.q, parameters.t1, parameters.t2)
    return -phase_means * np.log1p(-value_numbers)
```

Рисунок 4. Программная реализация генератора гиперэкспоненциальной последовательности

Промежуточные выводы

Реализован программный генератор двухфазного гиперэкспоненциального распределения. При `seed = 29` сформировано 300 конечных неотрицательных значений в диапазоне от 0,040155 до 192,973406. Повторный запуск с тем же значением seed создаёт идентичную последовательность. Числовые характеристики и графики сгенерированных данных исследуются на следующем этапе.

Исследование сгенерированной последовательности

Для сгенерированной последовательности рассчитаны те же характеристики при объёмах 10, 20, 50, 100, 200 и 300, что и для исходной. В строках процентов указано относительное отклонение от одноимённой характеристики исходной последовательности при том же объёме выборки.

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	12,205	16,044	20,963	20,309	18,293	18,873
	%	18,84	3,23	5,41	7,57	0,77	3,84
Дов. инт. 0,9	Знач.	±6,941	±10,226	±6,766	±4,446	±3,108	±2,793
	%	28,48	6,01	8,59	28,34	10,61	11,91
Дов. инт. 0,95	Знач.	±8,565	±12,378	±8,110	±5,314	±3,709	±3,332
	%	28,48	6,01	8,59	28,34	10,61	11,91
Дов. инт. 0,99	Знач.	±12,305	±16,920	±10,815	±7,033	±4,891	±4,389
	%	28,48	6,01	8,59	28,34	10,61	11,91
Дисперсия	Знач.	143,355	699,512	814,314	717,136	707,393	859,854
	%	48,85	11,66	16,45	48,65	20,09	22,39
С.к.о.	Знач.	11,973	26,448	28,536	26,779	26,597	29,323
	%	28,48	6,01	8,59	28,34	10,61	11,91
К-т вариации	Знач.	0,981	1,649	1,361	1,319	1,454	1,554
	%	11,87	2,88	13,29	22,47	11,29	8,39

Таблица 6. Характеристики сгенерированной числовой последовательности

Для полной выборки среднее равно 18,873, дисперсия — 859,854, СКО — 29,323, коэффициент вариации — 1,554. Отклонения от характеристик исходной последовательности составляют соответственно 3,84%, 22,39%, 11,91% и 8,39%. Расхождения объясняются конечным объёмом случайной выборки, тогда как теоретические моменты подобранного закона совпадают с исходными точно.




Рисунок 5. График значений сгенерированной ЧП

На графике отсутствуют выраженный рост, снижение и повторяющаяся структура. Малые значения преобладают и чередуются с редкими высокими пиками, как и в исходной последовательности.

Теоретическая плотность вероятности подобранного закона имеет вид:

$$f(x) = 0,\frac{25}{52},468862\exp\left(-\frac{x}{52},468862\right) + 0,\frac{75}{8},678593\exp\left(-\frac{x}{8},678593\right)$$




Рисунок 6. Гистограмма сгенерированной ЧП и теоретическая плотность H_2

Гистограмма согласуется с общей формой теоретической плотности: основная масса наблюдений сосредоточена у малых значений, после чего плотность быстро убывает и переходит в длинный правый хвост.

Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности приведены в таблице 7.

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	0,1014	0,0730	0,0702	−0,0183	−0,0141	−0,0534	0,0533	0,0090	0,0213	0,0035

Таблица 7. Автокорреляция сгенерированной ЧП




Рисунок 7. Автокорреляционный анализ сгенерированной ЧП

Промежуточные выводы

Максимальный по модулю коэффициент автокорреляции равен 0,1014 при сдвиге

1. Все коэффициенты находятся внутри ориентировочных границ $\pm 0,1132$, поэтому статистически заметная зависимость и признаки периодичности

не обнаружены. Сгенерированную последовательность можно считать случайной. По форме графика и гистограммы она воспроизводит основные особенности исходных данных; отклонения числовых характеристик обусловлены случайностью конечной реализации.

Итоговое сравнение последовательностей

Для итоговой оценки качества модели результаты моделирования сопоставлены с исходной последовательностью по форме распределения, числовым характеристикам и автокорреляционной структуре.




Рисунок 8. Гистограмма исходной ЧП и плотность распределения H_2

Теоретическая плотность H_2 воспроизводит главные особенности исходных данных: наибольшую концентрацию наблюдений около нуля и длинный правый хвост. Точного совпадения высот отдельных столбцов ожидать не следует, поскольку гистограмма построена по конечной выборке.




Рисунок 9. Сравнение реализаций исходной и сгенерированной ЧП

Последовательности имеют сходный масштаб и содержат редкие крупные значения. Совпадение элементов в одних и тех же позициях не требуется: модель должна воспроизводить вероятностные свойства исходной ЧП, а не её конкретную реализацию.




Рисунок 10. Сравнение нормированных гистограмм последовательностей

Обе гистограммы имеют выраженную правостороннюю асимметрию. Сгенерированная выборка несколько менее рассеяна, что согласуется с найденным отклонением дисперсии.

Результаты сравнения автокорреляционных коэффициентов представлены в форме 3. Относительное отклонение вычислялось по формуле

$$\delta_k = \left| \frac{r_k^{\text{ген}} - r_k^{\text{исх}}}{r_k^{\text{исх}}} \right| \cdot 100\%.$$

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исходная	0,0169	−0,0064	−0,0610	−0,0580	−0,0760	0,0514	0,0120	0,0280	0,0269	0,0951
Сгенерированная	0,1014	0,0730	0,0702	−0,0183	−0,0141	−0,0534	0,0533	0,0090	0,0213	0,0035
Отклонение, %	500,83	—	215,16	68,45	81,49	203,88	345,58	67,97	21,00	96,33

Таблица 8. Форма 3 — сравнение результатов автокорреляционного анализа




Рисунок 11. Сравнение автокорреляционных функций

Все коэффициенты обеих последовательностей находятся внутри доверительных границ $\pm 0,1132$, поэтому обе реализации можно предварительно считать случайными. Большие относительные отклонения в форме 3 вызваны делением на близкие к нулю исходные коэффициенты и сами по себе не означают сильной зависимости. Для сдвига 2 процент не указан, поскольку $|r_2^{\text{исх}}| < 0,01$.

Для проверки отсутствия прямой связи между двумя реализациями вычислен коэффициент корреляции Пирсона:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{y})^2}} = -0,050932.$$

Значение близко к нулю, что является ожидаемым результатом для независимо сгенерированной реализации.

Промежуточные выводы

Отклонение среднего составило 3,84%, дисперсии — 22,39%, среднего квадратического отклонения — 11,91%, коэффициента вариации — 8,39%. Модель хорошо воспроизводит среднее значение, правостороннюю форму распределения и случайный характер исходных данных. Отличие дисперсии объясняется конечным объёмом реализации и наличием редких больших значений; в целом качество моделирования можно считать удовлетворительным.

Вывод

В ходе первого этапа работы рассчитаны статистические характеристики исходной числовой последовательности варианта 29 для выборок объёмом 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений. Полученные оценки изменяются немонотонно, поскольку каждый следующий объём включает новые наблюдения с большим разбросом.

Для полной выборки математическое ожидание составило 19,626, дисперсия — 1107,975, среднеквадратическое отклонение — 33,286, а коэффициент вариации — 1,696. При увеличении объёма выборки доверительные интервалы в целом сужаются. Это показывает, что оценка математического ожидания становится точнее. Коэффициент вариации больше единицы свидетельствует о существенном разбросе значений относительно среднего.

На втором этапе построен график всех 300 значений исходной последовательности. Выраженная тенденция к росту или снижению отсутствует. Значения изменяются нерегулярно, с отдельными резкими выбросами; явная периодичность по графику не обнаружена.

На третьем этапе рассчитаны коэффициенты автокорреляции при сдвигах от 1 до 10. Все они находятся внутри ориентировочных границ $\pm 0,1132$, а максимальный по модулю коэффициент равен 0,0951 при сдвиге 10. Выраженная автокорреляция и периодичность не обнаружены, поэтому исходную последовательность можно считать случайной.

На четвёртом этапе построена гистограмма по 18 равным интервалам шириной 15,0008. В первом интервале находится 237 наблюдений, или 79% выборки, а в первых пяти — 285 наблюдений, или 95%. Распределение имеет выраженную правостороннюю асимметрию и длинный правый хвост. С учётом коэффициента вариации 1,696 для дальнейшей аппроксимации следует рассмотреть гиперэкспоненциальный закон.

На пятом этапе по двум начальным моментам подобрано двухфазное гиперэкспоненциальное распределение. При допустимой вероятности $q = 0,25$ средние фаз составили $t_1 = 52,468862$ и $t_2 = 8,678593$, а их интенсивности — 0,019059 и 0,115226 соответственно. Модель точно воспроизводит эмпирическое среднее 19,626160, второй начальный момент 1489,467689 и моментный коэффициент вариации 1,693186.

На шестом этапе реализован генератор выбранного закона методом обратного преобразования. При `seed = 29` сформировано 300 конечных неотрицательных значений. Фиксированное значение seed обеспечивает полную воспроизводимость последовательности при повторных запусках программы.

На седьмом этапе исследована сгенерированная выборка. Для 300 значений среднее составило 18,873, дисперсия — 859,854, СКО — 29,323, коэффициент вариации — 1,554. Их отклонения от исходных характеристик равны 3,84%, 22,39%, 11,91% и 8,39% соответственно. Гистограмма согласуется с плотностью H_2 и сохраняет выраженную правостороннюю асимметрию. Все коэффициенты автокорреляции для сдвигов 1–10 находятся внутри границ $\pm 0,1132$, поэтому сгенерированную последовательность можно считать случайной.

Итоговое сравнение подтвердило сходство формы распределения и масштаба двух последовательностей. Коэффициент корреляции Пирсона между независимыми реализациями равен −0,050932. С учётом близости средних, правосторонней формы обеих гистограмм и отсутствия значимой автокорреляции построенная модель H_2 удовлетворительно воспроизводит основные вероятностные свойства исходной ЧП.