





代数概念与题目整理

Ray

目录

1 概念辨析	3
1.1 根理想与谱	3
1.2 Artin 环与 Noether 环	3
1.3 局部环与链条件	3
1.4 Prop 5.3.12 相关辨析	4
1.5 Associated primes 与局部化	5
1.6 Primary ideal 的计算与等价条件	8
1.7 $\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质	11
1.8 整扩张中的上行与下行定理	12
1.9 Galois 扩张与 radical 扩张	13
1.10 范畴论视角	15
1.11 极限、余极限与始对象/终对象的辨析	16
1.12 Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*	18
1.13 Krull 交定理	20
1.14 I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构	20
1.15 短正合列的分裂与投射模/内射模	24
1.16 Semi-simple rings 与 hereditary rings	25
1.17 Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解	26
2 专题整理	30
2.1 投射分解、内射分解与 Tor/Ext 的主线	30
2.2 Morita 等价：用模范畴比较环	32
2.3 Algebra I 中 local ring 的性质与判定	34
2.4 Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系	36
2.5 Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张	39
2.6 CSA 相关概念总联系	41
2.7 滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角	43
2.8 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性	47
2.9 第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q	51
2.10 Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理	57
2.11 Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义	60
2.12 准素分解的适用范围与凝聚层视角	61

3 题目整理	64
3.1 商模的 associated primes 与 support 计算例题	64
3.2 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式	65
3.3 自由模之间单射与满射的秩比较	67
3.4 局部环上矩阵环的阶数与底环由同构决定	68
3.5 全自同态环作用下的不可约性与 Schur 引理逆命题	70
3.6 满射自由模自同态的可逆性	72
3.7 高斯整数上的有限生成模结构	73
3.8 超越单扩张的真中间域	74
3.9 中间域全序条件下有限扩张的原始元	75
3.10 有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界	76
3.11 Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形	77
3.12 p -polynomial 的等价刻画: 根构成加法群的 monic 多项式	78
3.13 纯不可分二项式的不可约性	81
3.14 有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域	81
3.15 正规扩域的 Galois 群: 四元数群 Q_8 的显式实现	82
3.16 交替群对应的固定域: 判别式的 Galois 对应	84
3.17 上中心列与幂零性的等价刻画	85
3.18 有限幂零群的结构: p -群的直积	86
3.19 素数次二项式的不可约性: Bézout 引理的判别法	88
3.20 分圆域的归一化根塔嵌入	89
3.21 素数次不可约方程的根式可解准则: Galois 的二根生成定理	90
3.22 实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍	91
3.23 有限域扩张的范数满射	92
3.24 循环 p -幂扩张的嵌入判别与二次应用	93
3.25 Albert 的 p 次循环扩张构造	94
3.26 通用三项式的仿射群与射影线性群	96
索引	99

1 概念辨析

这里记录容易混淆的定义、命题条件与常见误解。

1.1 根理想与谱

辨析 1.1. Jacobson 根由极大理想控制，而幂零根由素理想控制：

$$J(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A} \mathfrak{m},$$

$$\text{nilrad}(A) = \sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p}.$$

若 A 是 Noether 环，则还可写成极小素理想的有限交：

$$\sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{MinSpec } A} \mathfrak{p}.$$

这里应说“极小素理想”，而不是一般的“极小理想”。

1.2 Artin 环与 Noether 环

辨析 1.2. Artin 环是维数为零的 Noether 环，因此

$$\text{Spec } A = \text{MaxSpec } A \quad (\text{III.Prop 5.3.2}),$$

从而

$$J(A) = \sqrt{0} \quad (\text{III.Cor 5.3.3}),$$

并且该理想幂零：

$$J(A)^N = 0 \quad (N \gg 0) \quad (\text{III.Prop 5.3.6}).$$

此外，Artin 环只有有限多个极大理想 (III.Prop 5.3.5)，并可分解为有限个 Artin 局部环的直积。

1.3 局部环与链条件

辨析 1.3. Artin 局部环中每个元素不是单位就是幂零元，但“局部且极大理想幂零”本身并不能推出 Artin 性。若 A 是 Artin 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，则对任意 $x \in A$ ，有

$$x \notin \mathfrak{m} \Rightarrow x \in A^\times, \quad x \in \mathfrak{m} = \text{nilrad}(A) \Rightarrow x \text{ 幂零}.$$

反例：取域 k ，令 V 为无限维 k -向量空间，并定义

$$A = k \oplus V, \quad (a, v)(b, w) = (ab, aw + bv).$$

则 A 是交换局部环，其极大理想为

$$\mathfrak{m} = 0 \oplus V,$$

且 $\mathfrak{m}^2 = 0$ 。但它不是 Artin 环，因为存在无限严格下降的理想链。

辨析 1.4. 一般局部环的理想不必全是 $\mathfrak{m}^n$ ；若所有理想都形如 $\mathfrak{m}^n$ ，则该局部环必为 Noether。

反例：取

$$A = k[x, y]_{(x, y)},$$

则 A 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m} = (x, y)$ ，但理想 (x) 不是任何 $\mathfrak{m}^n$ 。

若局部环 A 的所有理想都形如 $\mathfrak{m}^n$ （以及 0 ），则理想全序排列，故满足 ACC；因此 A 是 Noether 局部环。

1.4 Prop 5.3.12 相关辨析

辨析 1.5. 若所有理想都只是 $\mathfrak{m}^n$ ，则必有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1.$$

在 Artin 局部环语境下，这正是

$$\text{每个理想都是主理想} \iff \mathfrak{m} \text{ 为主理想} \iff \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$$

的内容，即 (III.Prop 5.3.12)。

辨析 1.6. 由 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$ 推出 $\mathfrak{m}$ 为主理想时，必须先有 $\mathfrak{m}$ 有限生成。

在 (III.Prop 5.3.12) 中，书上假设 A 是 Artin 局部环；由 (III.Thm 5.3.8) 可知 Artin 环必为 Noether 环，因此 $\mathfrak{m}$ 自动有限生成，此时才能对 $\mathfrak{m}$ 使用 Nakayama 引理。

若去掉有限生成条件，仅有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$$

并不能推出 $\mathfrak{m}$ 是主理想。可取

$$B = \bigcup_{n \geq 1} k[[t^{1/n}]],$$

记其极大理想为 $\mathfrak{n}$, 则 $\mathfrak{n}^2 = \mathfrak{n}$ 且 $\mathfrak{n}$ 非有限生成。再构造平凡扩张

$$A = B \ltimes k,$$

则 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k,$$

因而 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$, 但 $\mathfrak{m}$ 仍非主理想。

辨析 1.7. (III.Prop 5.3.12) 的条件 “ A 是 Artin 局部环” 可以放宽为 “ A 是 Noether 局部环”, 且三条条件仍等价。

关键替代仅在于: Artin 情形用到 $\mathfrak{m}$ 幂零; Noether 局部环中则可改用 Krull 交定理

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

因此书中证明同样可以推广。

1.5 Associated primes 与局部化

辨析 1.8. (III.Cor 6.1.5) 可以看作对 (III.Lem 6.1.4) 的最好解释: 局部化不会产生新的 associated primes, 只会保留那些与 S 不相交的 associated primes。也就是说,

$$\text{Ass}_A(S^{-1}M) = f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\},$$

其中 $f: A \rightarrow S^{-1}A$ 是局部化映射。

第一段等式只是收缩记号的展开:

$$f^*(\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)) = \left\{ \text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) \mid \frac{x}{1} \neq 0 \text{ in } S^{-1}M, \text{ann}_{S^{-1}A}\left(\frac{x}{1}\right) \in \text{Spec}(S^{-1}A) \right\},$$

并且若 $P = \text{ann}_{S^{-1}A}(x/1)$, 则

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

等价地,

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = \{a \in A \mid \exists s \in S, sax = 0\}.$$

第二段等式证明如下。

(1) 从右到左。若 $\mathfrak{p} = \text{ann}_A(x) \in \text{Ass}_A(M)$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则 $x/1 \neq 0$, 否则某个 $s \in S$ 满足 $sx = 0$, 从而 $s \in \mathfrak{p}$, 矛盾。再者,

$$\text{ann}_{S^{-1}A}(x/1) = S^{-1}\mathfrak{p}.$$

因为若 $(a/s)(x/1) = 0$, 则存在 $t \in S$ 使 $tax = 0$, 即 $ta \in \mathfrak{p}$ 。由 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 且 $\mathfrak{p}$ 为素理想, 得 $a \in \mathfrak{p}$ 。反向包含显然, 故 $S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 。

(2) 从左到右。若

$$P = \text{ann}_{S^{-1}A}(y) \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M), \quad y = x/u,$$

令

$$\mathfrak{p} = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

书上若写成 $p = P \cap S^{-1}A$, 那只是笔误; 正确应为 $p = P \cap A = f^{-1}(P)$ 。又因 $P \in \text{Spec}(S^{-1}A)$, 故 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 。

由于 A Noetherian, $\mathfrak{p}$ 有有限生成元 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_n)$ 。对每个 i , 由 $(a_i/1)y = 0$ 可取 $t_i \in S$ 使 $t_i a_i x = 0$ 。令 $t = t_1 \cdots t_n \in S$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \text{ann}_A(tx)$ 。反过来, 若 $a(tx) = 0$, 则在局部化后

$$(a/1)(t/1)y = 0.$$

而 $t/1$ 是单位, 故 $(a/1)y = 0$, 即 $a/1 \in P$, 于是 $a \in P \cap A = \mathfrak{p}$ 。所以

$$\text{ann}_A(tx) = \mathfrak{p},$$

从而 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(M)$ 。

因此

$$f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

这也正是 (III.Cor 6.1.5) 的含义: 局部化只保留那些“不碰到 S ”的 associated primes。

辨析 1.9. (III.Cor 6.2.4) 下方的结论

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{r}(\mathfrak{q})\}$$

可直接用来计算商模 $A/\mathfrak{q}$ 的 associated primes。特别地, 若 (x) 本身就是素理想, 则

$$\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\},$$

因为此时 $\mathfrak{r}((x)) = (x)$ 。

辨析 1.10. (III.Prop 6.1.8) 给出的 prime filtration 一般不唯一; 即使不计顺序, 分解中出现的 $\mathfrak{p}_i$ 也未必唯一。

例如取

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

一方面有子模链

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其中 x 表示其在 M 中的像, 且

$$\text{ann}_A(x) = (x, y), \quad Ax \cong A/(x, y).$$

这里 Ax 在 $M = A/(x^2, xy)$ 中正对应于

$$\frac{(x) + (x^2, xy)}{(x^2, xy)} = \frac{(x)}{(x^2, xy)},$$

因此也可写成

$$Ax \cong \frac{(x)}{(x^2, xy)} \cong A/(x, y).$$

于是

$$M/Ax \cong \frac{A/(x^2, xy)}{(x)/(x^2, xy)} \cong A/(x).$$

因此得到一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x, y), (x).$$

另一方面, 可取

$$0 \subset Ay \subset (x, y)/(x^2, xy) \subset M.$$

此时

$$Ay \cong A/(x),$$

并且后两层商都同构于 $A/(x, y)$ 。于是得到另一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x), (x, y), (x, y).$$

这两个 prime multisets 不同, 因此 (III.Prop 6.1.8) 里的 $\mathfrak{p}_i$ 不是唯一确定的。

辨析 1.11. (III.Lem 6.1.9) 中

$$\text{Ass}(M) \subseteq \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M'')$$

一般只能写成包含, 不能改成等号。

反例: 取整环

$$A = k[x],$$

并看短正合列

$$0 \rightarrow (x) \rightarrow A \rightarrow A/(x) \rightarrow 0.$$

因为 A 是整环,

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\}.$$

又由于 $(x) \cong A$ 作为 A -模,

$$\text{Ass}((x)) = \{(0)\},$$

而

$$\text{Ass}(A/(x)) = \{(x)\}.$$

所以

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\} \subsetneq \{(0), (x)\} = \text{Ass}((x)) \cup \text{Ass}(A/(x)).$$

这说明 (III.Lem 6.1.9) 的结论通常是严格包含。

辨析 1.12. (III.Thm 6.2.10) 里出现的

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right)$$

是有意义的，因为任意多个子模的交仍是子模；因此这里既可以是有限交，也可以是无限交。通常有包含

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right) \subseteq \bigcap_i \text{Ass}(N_i).$$

相反， $\bigcup_i N_i$ 一般不是子模，所以通常不写

$$\text{Ass}\left(\bigcup_i N_i\right).$$

这里的关键区别是“是否仍为子模”，而不是“指标集是否有限”。另外，即使把“并”改成“和”，这里通常也只考虑有限和

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

因为无限和虽然仍可定义为由并集 $\bigcup_i N_i$ 生成的子模，但在本处并不提供额外有用的信息，因此一般不单独讨论。

若要替代“并”，真正稳定的对象是**和**

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

它始终是子模；但 associated primes 一般也只有上界

$$\text{Ass}(N_1 + \cdots + N_r) \subseteq \text{Ass}(N_1) \cup \cdots \cup \text{Ass}(N_r),$$

通常不能改写成等号。

1.6 Primary ideal 的计算与等价条件

辨析 1.13. 这对应原书 (III.P50) 中关于 $(q : x)$ 的计算。

设 $q \subset A$ 是 p -primary ideal，其中

$$p = \sqrt{q}.$$

对任意 $x \in A$, 记

$$(\mathfrak{q} : x) = \{y \in A \mid yx \in \mathfrak{q}\}.$$

则有三种基本情形:

$$(\mathfrak{q} : x) = \begin{cases} A, & x \in \mathfrak{q}, \\ \mathfrak{q}, & x \notin p, \\ \text{一个 } p\text{-primary ideal}, & x \in p \setminus \mathfrak{q}. \end{cases}$$

前两种情形较直接: 若 $x \in \mathfrak{q}$, 则任意 y 都满足 $yx \in \mathfrak{q}$, 故

$$(\mathfrak{q} : x) = A.$$

若 $x \notin p = \sqrt{\mathfrak{q}}$, 且 $yx \in \mathfrak{q}$, 则在 $A/\mathfrak{q}$ 中有

$$\bar{y}\bar{x} = 0.$$

而 $\mathfrak{q}$ 准素等价于 $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元; 由于 $x \notin \sqrt{\mathfrak{q}}$, $\bar{x}$ 不是幂零元, 故它不可能是零因子, 只能有 $\bar{y} = 0$, 即 $y \in \mathfrak{q}$ 。因此

$$(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}.$$

再设 $x \in p \setminus \mathfrak{q}$, 令

$$I = (\mathfrak{q} : x).$$

由 $x \notin \mathfrak{q}$ 且 $ax \in \mathfrak{q} \Rightarrow a \in p$ 可知

$$\mathfrak{q} \subset I \subset p,$$

从而

$$\sqrt{I} = p.$$

若 $\bar{a} \in A/I$ 是零因子, 则存在 $b \notin I$ 使

$$ab \in I,$$

也就是

$$abx \in \mathfrak{q}.$$

而 $b \notin I$ 意味着 $bx \notin \mathfrak{q}$ 。于是

$$a(bx) \in \mathfrak{q}, \quad bx \notin \mathfrak{q}.$$

由 $\mathfrak{q}$ 准素, 再次利用“ $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元”的等价刻画, 得到 $a \in p = \sqrt{I}$ 。故 A/I 的零因子全是幂零元, 所以 $I = (\mathfrak{q} : x)$ 仍是 p -primary ideal。

辨析 1.14. 这对应原书 (III.P50) 中关于 $\mathfrak{m}$ -primary ideal 的等价刻画。

设 A 是 Noether 环, $\mathfrak{m} \subset A$ 是极大理想, $\mathfrak{q} \subset A$ 是真理想。则以下三条等价:

$$\mathfrak{q} \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary} \iff \sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m} \iff \mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \text{ for some } k \geq 1.$$

(1) $\Rightarrow$ (2). 这是 primary ideal 的定义结论: 若 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary, 则其根理想就是 $\mathfrak{m}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1). 若 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{m}$ 是唯一包含 $\mathfrak{q}$ 的素理想, 因此

$$\text{Spec}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}/\mathfrak{q}\}.$$

等价地,

$$V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

又因 $A/\mathfrak{q}$ 是有限生成 A -模,

$$\text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = V(\text{Ann}(A/\mathfrak{q})) = V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\} \quad (\text{III.Thm 6.1.6}).$$

另一方面, $A/\mathfrak{q} \neq 0$, 故其 associated primes 非空, 并且由 (III.Thm 6.1.6) 有

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) \subseteq \text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\}.$$

于是

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

这就说明 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素的。也可以直接用“ $A/\mathfrak{q}$ 中零因子全是幂零元”来证, 只是书上这里是从 associated primes 的角度处理。

(3) $\Rightarrow$ (2). 由

$$\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$$

取根理想即可得到

$$\mathfrak{m} = \sqrt{\mathfrak{m}^k} \subseteq \sqrt{\mathfrak{q}} \subseteq \sqrt{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 这里有限生成性正用在 $\mathfrak{m}$ 上。因为 A Noether, 所以

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_r)$$

是有限生成的。由 $x_i \in \sqrt{\mathfrak{q}}$ 可取 $n_i \geq 1$ 使

$$x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}.$$

令

$$N = n_1 + \dots + n_r - r + 1.$$

则任一属于 $\mathfrak{m}^N$ 的次数 N 单项式

$$x_1^{a_1} \cdots x_r^{a_r}, \quad a_1 + \cdots + a_r = N,$$

必有某个 $a_i \geq n_i$, 否则

$$a_1 + \cdots + a_r \leq (n_1 - 1) + \cdots + (n_r - 1) = N - 1,$$

矛盾。于是每个这样的单项式都含有因子 $x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}$, 从而属于 $\mathfrak{q}$ 。因此

$$\mathfrak{m}^N \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}.$$

辨析 1.15. 需要警惕两点:

1. 素理想的幂不一定还是准素的;
2. 仅有 $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$ 也不能单独推出 $\mathfrak{q}$ 就是 p -准素的, 仍需验证 $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元。

一个标准反例是

$$A = k[x, y, z]/(xy - z^2), \quad p = (x, z).$$

这里 p 是素理想, 但

$$p^2 = (x^2, xz, z^2)$$

不是 p -primary。事实上在 A 中有

$$xy = z^2 \in p^2,$$

而

$$x \notin p^2, \quad y \notin p = \sqrt{p^2}.$$

若 p^2 是 primary ideal, 则由 $xy \in p^2$ 与 $x \notin p^2$ 应推出某个 $y^n \in p^2$, 这显然不成立。故 p^2 不是 primary; 这同时也说明 $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$ 本身并不足以保证 $\mathfrak{q}$ 带有 p -primary 结构。

1.7 $\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质

辨析 1.16. (III.Thm 6.1.6) 前回顾了

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

这里

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

表示由理想 I 定义的 Zariski 闭集；它在第一章引入 Zariski 拓扑时第一次出现，具体是在 (III.§1.1) 中、(III.Def 1.1.14) 之前。

其中第一条性质

$$M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$$

正是 (III.Prop 2.2.8) 的直接改写： $M = 0$ 当且仅当对一切素理想 $\mathfrak{p}$ ，都有 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。

第二条性质是：若 M 有限生成，则

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

书中在这里直接作为标准事实使用，前文似乎没有单独列成命题。其证明很短：总有

$$\text{Supp}(M) \subseteq V(\text{Ann}(M)),$$

而有限生成性保证反向包含也成立。等价地，对任意 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ ，有

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \iff \text{Ann}(M) \subseteq \mathfrak{p}, \quad M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \text{Ann}(M) \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

1.8 整扩张中的上行与下行定理

辨析 1.17. (III.Ch 4.1, pp. 29–33) 中关于整扩张 $A \subset B$ 的谱映射

$$\phi^* : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

可以压缩成四句话来看：

1. **Lying-over** ((III.Thm 4.1.14))：若 B 整于 A ，则 ϕ^* 满射；也就是说， A 中每个素理想上方至少有一个 B 的素理想。
2. **Incomparability** ((III.Cor 4.1.13))：若 B 整于 A ，且 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ 在 B 中有相同收缩，则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。因此同一条纤维里不能出现严格包含链。
3. **Going-up** ((III.Thm 4.1.15))：对 A 中的链

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$$

和其下端上方的一点 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ (满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$)，总能向上抬升到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'.$$

直观地说： $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 对素理想链“可以往上跟着走”。

4. **Going-down** ((III.Thm 4.1.24)) : 若进一步假设 A, B 是整环且 A 整闭, 则对

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$$

可以找到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

也就是说, 这时素理想链还可以“向下抬升”。

因此可把三者关系记成:

$$\text{整扩张} \implies \text{lying-over} + \text{incomparability} + \text{going-up},$$

而

$$\text{整扩张} + A \text{ 整闭整环} \implies \text{going-down}.$$

要点不是“ ϕ^* 单射或满射”本身, 而是: 整扩张控制了

$$\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

的纤维与链提升行为。满射来自 lying-over; 同一纤维内无严格包含来自 incomparability; 链能否向上或向下延拓, 则分别由 going-up 与 going-down 描述。

1.9 Galois 扩张与 radical 扩张

辨析 1.18. “Galois 扩张未必是 radical 扩张”的一个标准反例, 实际上可直接取

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_7),$$

其中 ζ_7 是本原 7 次单位根。这一例子见 (I.Prop 1.12.4(i), PDF p. 31)。

先看 $K/\mathbb{Q}$ 。因为 K 是第 7 个分圆域,

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong C_6.$$

该群有唯一的 2 阶子群 H 。令

$$E := K^H,$$

则由 Galois 对应

$$[E : \mathbb{Q}] = [\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) : H] = 3.$$

又因为 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是交换群, $H \triangleleft \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, 故

$$E/\mathbb{Q}$$

本身就是 Galois 扩张, 且

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3.$$

下面说明 $E/\mathbb{Q}$ 不是 radical 扩张。若不然, 因 $[E:\mathbb{Q}] = 3$ 是素数, 任何非平凡中间域都只能是 $\mathbb{Q}$ 或 E , 故可写成

$$E = \mathbb{Q}(u), \quad u^m \in \mathbb{Q}$$

并取 $m \geq 2$ 最小。

令 σ 为 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3$ 的一个生成元。因为

$$\sigma(u)^m = \sigma(u^m) = u^m,$$

故 $\sigma(u)/u$ 是某个 m 次单位根, 记为 ξ 。若 ξ 的阶是 $d < m$, 则

$$\sigma(u^d) = u^d,$$

于是 $u^d \in \mathbb{Q}$, 这与 m 的极小性矛盾。因此 ξ 必是本原 m 次单位根, 可记为 ζ_m 。于是

$$\sigma(u) = \zeta_m u, \quad \zeta_m = \frac{\sigma(u)}{u} \in E.$$

于是

$$\mathbb{Q}(\zeta_m) \subseteq E.$$

但 $[E:\mathbb{Q}] = 3$ 是素数, 而 $\zeta_m \notin \mathbb{Q}$, 所以只能有

$$E = \mathbb{Q}(\zeta_m).$$

这就要求

$$[E:\mathbb{Q}] = \varphi(m) = 3,$$

然而 Euler 函数不可能取值 3。矛盾。

因此

$E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 但不是 radical 扩张。

辨析 1.19. 上面常被误记成“ $x^5 - 2$ 的分裂域是 Galois 但不是 radical”, 这其实不对; 它恰好是一个既 Galois 又 radical 的例子。

设

$$f(x) = x^5 - 2, \quad \alpha = \sqrt[5]{2}, \quad \zeta_5 = e^{2\pi i/5}.$$

则 f 的五个根为

$$\alpha, \zeta_5 \alpha, \zeta_5^2 \alpha, \zeta_5^3 \alpha, \zeta_5^4 \alpha.$$

所以其分裂域是

$$L = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta_5).$$

作为分裂域,

$$L/\mathbb{Q}$$

当然是 Galois 扩张。

同时它也是 radical 扩张, 因为有显式塔

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5) \subset \mathbb{Q}(\zeta_5, \alpha) = L,$$

且

$$\zeta_5^5 = 1 \in \mathbb{Q}, \quad \alpha^5 = 2 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5).$$

也就是说, 第一步是添入一个 5 次根 ζ_5 , 第二步再添入另一个 5 次根 α ; 每一步都满足“某个幂落回前一步域中”的 radical 条件。

因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)/\mathbb{Q}$$

不能作为“Galois 但非 radical”的反例。若要找“分裂域不是 radical 扩张”的例子, 必须改取 Galois 群不可解的情形, 而不是 $x^5 - 2$ 这种 Kummer 型例子。

1.10 范畴论视角

辨析 1.20. Noetherian 与 Artinian 在范畴论里是链条件意义下的形式对偶, 但交换环上的 Artin/Noether 并不是简单的范畴对偶。

更自然的理解是: Noether 条件控制升链, Artin 条件控制降链; 在 Abel 范畴中, 同时满足二者的对象就是有限长度对象。对局部交换代数而言, 更深的联系通常通过 Matlis 对偶体现, 而不是通过“环的直接对偶”体现。

辨析 1.21. Matlis 对偶是在完备 Noether 局部环上把 Noetherian 模与 Artinian 模联系起来的标准反等价。

若 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是完备 Noether 局部环, 记 $E = E_A(k)$ 为剩余域 k 的内射包, 并定义

$$D(M) = \text{Hom}_A(M, E).$$

则

$$\{\text{Noetherian } A\text{-modules}\}^{\text{op}} \simeq \{\text{Artinian } A\text{-modules}\}.$$

这说明 Artinian/Noetherian 的“对偶性”在模块范畴中是严格可表达的。

1.11 极限、余极限与始对象/终对象的辨析

辨析 1.22. 关于极限与余极限，最容易混淆的不是对象本身，而是过渡态射的方向。

- 逆极限 / 投射极限 / 极限 $\varprojlim$ 处理的是一串向左投影的资料

$$\cdots \rightarrow X_3 \rightarrow X_2 \rightarrow X_1,$$

其元素应理解为“各层彼此相容的坐标族”

$$(x_n)_n, \quad f_n(x_{n+1}) = x_n.$$

- 直极限 / 归纳极限 / 余极限 $\varinjlim$ 处理的是一串向右推进的资料

$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \cdots,$$

其元素应理解为“某一层元素在后续各层中的最终等价类”。

因此记忆时不要先看对象名，而要先看：箭头是把信息往前并起来，还是往后投影回来。

最典型的混淆例子就是

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

它既能出现在逆系统里，也能出现在直系统里，但得到的对象完全不同：

- 若取自然投影

$$\cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

则

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

这里 $\mathbb{Z}_p$ 是“模 p^n 余数的相容系统”，正是 Algebra I 第 1.15 节与 Algebra III 第 8.4 节反复出现的 p -进整数。

- 若取向右的嵌入系统，例如阿贝尔群中的标准单射

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}, \quad \bar{x} \mapsto \overline{px},$$

则

$$\varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty),$$

即 Prüfer p -群，也可记作 C_{p^∞} 。

所以应牢牢记住

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p, \quad \varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty).$$

前者是完备化、pro-对象、Krull 拓扑与 I -adic completion 的语言；后者则是“不断往后并起来”的 colimit 语言。

始对象与终对象的直观理解也应一起记住。

在一个范畴里：

- 始对象 I 的意思是：对任意对象 X ，都有唯一态射

$$I \rightarrow X.$$

它像“从这里出发，去任何地方都只有一种最自然的办法”。

- 终对象 T 的意思是：对任意对象 X ，都有唯一态射

$$X \rightarrow T.$$

它像“所有对象都唯一地汇入这里”。

更适理解的方式，是直接看交换图。

- 余极限 $\varinjlim X_i$ 的意思是：若你已经有一族相容态射

$$X_i \rightarrow Y,$$

那么它们都会唯一地经过 $\varinjlim X_i$ 因子分解。也就是存在唯一态射

$$\varinjlim X_i \rightarrow Y$$

使得对每个 i 都有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{\quad} & \varinjlim X_i \\ & \searrow & \swarrow \text{---} \\ & Y & \end{array}$$

所以余极限就是“把各层往外送之后，最自然的总汇出口”。

- 极限 $\varprojlim X_i$ 的意思是：若你已经有一族相容态射

$$Y \rightarrow X_i,$$

那么它们都会唯一地经过 $\varprojlim X_i$ 因子分解。也就是存在唯一态射

$$Y \rightarrow \varprojlim X_i$$

使得对每个 i 都有交换图

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \swarrow \text{---} & & \searrow \\ \varprojlim X_i & \xrightarrow{\quad} & X_i \end{array}$$

所以极限就是“把各层往回看时，最自然的相容总源”。

若勉强和“始对象/终对象”联系，那么也只需记成：

- 余极限之所以像“始对象”，是因为它总是**唯一地流出**到任何别的 cocone ；
- 极限之所以像“终对象”，是因为任何别的 cone 都会**唯一地流入**它。

因此一句话概括就是：

colimit 是“把各层并起来后的最自由出口”，

limit 是“把各层对齐后的最严格相容入口”。

所以实操时最稳妥的判断法是：

1. 先看箭头方向；
2. 再问自己：我要的是“把各层并起来”，还是“找一组相容坐标”；
3. 最后用始对象/终对象的泛性质检查自己写的定义是否方向正确。

1.12 Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*

辨析 1.23. 设

$$A^* = \bigoplus_{r \geq 0} I^r, \quad M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r,$$

并令

$$Q_n := \bigoplus_{r=0}^n M_r.$$

由于 A Noether、 M 有限生成，所以每个 $M_r \subset M$ 都是有限生成 A -模，从而有限直和 Q_n 也是有限生成 A -模。

此处要证明的是：由 Q_n 生成的 A^* -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n$$

是一个有限生成的 A^* -模；并且按定义，

$$M_n^* = M_0 \oplus \cdots \oplus M_n \oplus IM_n \oplus I^2M_n \oplus \cdots \oplus I^rM_n \oplus \cdots.$$

这正是书中显示公式的含义：前 n 层直接保留，而从第 n 层开始，后续各层由 I 的幂反复作用得到。

若取 Q_n 的一组有限 A -生成元

$$v_1, \dots, v_s \in Q_n,$$

则同一组元素也生成 A^* -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n \subset M^*.$$

这里还要区分两类“生成元”的所在对象：

- Q_n 的生成元 v_i 首先是 Q_n 中的元素，因此本质上是有限直和 $\bigoplus_{r=0}^n M_r$ 里的元素，各分量都落在 A -模 M_r 中；
- 当说它们生成 M_n^* 时，必须把同样的 v_i 视为嵌入

$$Q_n \hookrightarrow M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r$$

后的元素；也就是说，此时它们是分次直和 M^* 中的元素，而不再只是 A 或单个 M_r 中的元素。

确实，任意 $x \in M_n^*$ 都可写成有限和

$$x = \sum_{\alpha} a_{\alpha}^* q_{\alpha}, \quad a_{\alpha}^* \in A^*, \quad q_{\alpha} \in Q_n.$$

而每个 q_{α} 又可写成

$$q_{\alpha} = \sum_{i=1}^s b_{\alpha i} v_i, \quad b_{\alpha i} \in A = A_0^* \subset A^*.$$

于是

$$x = \sum_{\alpha, i} (a_{\alpha}^* b_{\alpha i}) v_i,$$

所以 M_n^* 由 $v_1, \dots, v_s$ 作为 A^* -模有限生成。

真正起作用的是分次乘法

$$I^r \cdot M_j \subset M_{r+j},$$

它把 Q_n 中前 n 层的信息向高次数层传递。于是书中引入的升链

$$M_0^* \subset M_1^* \subset \dots \subset M_n^* \subset \dots$$

每一项都是有限生成 A^* -模；再由 A^* Noether，升链稳定，便得到某个 n_0 使

$$M^* = M_{n_0}^*,$$

这正等价于

$$M_{n_0+r} = I^r M_{n_0} \quad (\forall r \geq 0),$$

也就是 filtration 稳定。

1.13 Krull 交定理

辨析 1.24. Krull 交定理最常用的形式是：若 A 是 Noether 环， $I \subset A$ 是理想， M 是有限生成 A -模，则

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = \{x \in M \mid (1-a)x = 0 \text{ for some } a \in I\}.$$

特别地，若 $I \subset \text{Jac}(A)$ ，则右端只能是 0。因此得到最常使用的推论

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

在 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 中取 $I = \mathfrak{m}$ ，便有

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n M = 0, \quad \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

这一定理和 I -adic 拓扑、完备化的联系最直接：自然映射

$$M \longrightarrow \widehat{M} := \varprojlim_n M/I^n M$$

的核正是

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M.$$

因此在 $I \subset \text{Jac}(A)$ 的 Noether 情形下，Krull 交定理说明

$$M \hookrightarrow \widehat{M}$$

是单射。也就是说，完备化不会把有限生成模中的非零元素“压没”。

直观地说，Krull 交定理排除了有限生成模里那种“落在所有 $I^n M$ 中、因此在每一阶 I -adic 截断里都看不见”的伪无限小元素；若 I 已落在 Jacobson 根里，这种元素只能是 0。

1.14 I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构

辨析 1.25. I -adic completion 的典范映射

$$f: A \longrightarrow \widehat{A}$$

即使在 Noether 情形下也不必诱导满射

$$f^* : \operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A.$$

关键点是: completion 常常 flat, 但未必 faithfully flat; 而谱映射满射对应的正是 faithful flatness 这一更强条件。

标准反例是

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (2), \quad \hat{A} = \mathbb{Z}_2.$$

此时

$$\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_2) = \{(0), (2)\},$$

所以

$$\operatorname{Im}(\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_2 \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}) = \{(0), (2)\},$$

并不包含 $(3), (5), \dots$, 故不是满射。

因此对 completion 最稳妥的说法是:

- 在 Noether 情形下, $A \rightarrow \hat{A}$ 常有 flatness;
- 只有再加 faithful flatness 时, $\operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 才满射。

辨析 1.26. (III.§8.5) 前的最后一段, 实质上是在说明: Noether 有限生成情形下, 子模从母模继承的子空间拓扑, 恰好就是它自己的 I -adic 拓扑。

这里应先区分三件事:

- (III.Def 8.0.1) 里的 I -adic 是滤过

$$M \supset IM \supset I^2M \supset \dots,$$

或更一般的 stable I -filtration;

- (III.§8.4) 里的 I -adic topology 是由 $I^n M$ 作为 0 的基本邻域所定义的拓扑;
- 对子模 $N \subset M$, 从母模继承来的首先是诱导过滤

$$I^n M \cap N.$$

因此不能直接把“ N 继承了 I -adic 结构”理解成逐项等式

$$I^n M \cap N = I^n N.$$

真正成立的是: 在 A Noether、 M 有限生成时, Artin-Rees 先说明 $(I^n M \cap N)$ 是 N 上的 stable I -filtration; 再由 (III.Lem 8.0.2) 知, 它与 N 的标准 I -adic filtration 在拓扑意义下等价。

所以这里比较的不是两串过滤是否逐项相同，而是它们是否定义同一个拓扑。逻辑链可压成

$$\text{filtration} \implies \text{topology},$$

$$I^n M \cap N \xrightarrow{\text{Artin-Rees}} \text{stable } I\text{-filtration on } N \xrightarrow{\text{Lem 8.0.2}} \text{same topology as } I^n N.$$

这正是 8.5 节后面讨论 completion 保持短正合列正合性的关键技术准备。

因此可把结论压缩成三层：

1. 在 M 上，任意 stable I -filtration 都与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；
2. 对子模 $N \subset M$ ，若 A Noether 且 M 有限生成，则 N 从 M 继承的子空间拓扑就是 N 自己的 I -adic 拓扑；
3. 因而在上述条件下， N 上得到的拓扑与 M 上 stable I -filtration 的选取无关。

辨析 1.27. (III.§8.2, III.§8.5) 中的 $G_I(M)$ 与 $G(M)$ 要区分：

$$G_I(M) := \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M$$

是对标准 I -adic filtration

$$M \supset IM \supset I^2 M \supset \dots$$

所作的 associated graded；而若 (M_n) 是任意 I -filtration，则书中后面定义

$$G(M) := \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

它是更一般的 associated graded $G_I(A)$ -模。

因此 $G_I(M)$ 只是 $G(M)$ 的特例：当

$$M_n = I^n M$$

时，就有

$$G(M) = G_I(M).$$

但若 (M_n) 只是 stable I -filtration，而并非逐项等于 $I^n M$ ，则一般不能推出

$$G(M) \cong G_I(M).$$

真正相同的是它们在原模 M 上诱导的**拓扑**：由 (III.Lem 8.0.2)，stable I -filtration (M_n) 与标准 I -adic filtration $(I^n M)$ 在 M 上定义同一个 I -adic topology。换言之，“相同”发生在 filtration 对应的 topology 层面，而不是 associated graded 模本身必然同构。

辨析 1.28. (III.Prop 8.5.10) 的核心是：在完备且 separated 的 I -filtration 下，原模 M 的有限生成性与 Noether 性，可以从切片

$$M_n/M_{n+1}$$

组成的分次模

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1}$$

中恢复出来。

这里每一层 M_n/M_{n+1} 都天然都是 A/I -模，因为 $IM_n \subset M_{n+1}$ 。把这些层合在一起后， $G(M)$ 不只是若干商模的直和，而是一个 $G_I(A)$ -模；其意义在于：它既记录每一层的首项信息，也记录这些层如何被 I 的作用彼此连接。

证明思路是先取 $G(M)$ 的有限个齐次生成元

$$\xi_i \in M_{k_i}/M_{k_i+1},$$

并将其提升为 $x_i \in M_{k_i}$ ，从而得到一个自由模到 M 的滤过态射

$$\varphi: F = A^n \rightarrow M.$$

由于这些 ξ_i 生成 $G(M)$ ，对应的分次态射 $G(\varphi)$ 满射；再由 (III.Lem 8.5.9)，完备化后的态射

$$\widehat{\varphi}: \widehat{F} \rightarrow \widehat{M}$$

也满射。此时 A 已 I -adic 完备，故 $F = A^n$ 也完备，从而 $F \cong \widehat{F}$ 。

条件

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

在这里恰好保证自然映射

$$M \rightarrow \widehat{M}$$

单射。若没有这一步，最多只能说明 $\widehat{M}$ 被这些提升元生成，却不能反推出 M 本身已被生成；换言之，这个条件排除了“躲在无限深层、在所有切片中都看不见”的元素。

因此，这个命题可以理解为一种“associated graded 检验原模”：若 $G(M)$ 有限生成，则 M 有限生成；若 $G(M)$ 还是 Noetherian 的 $G_I(A)$ -模，则对任意子模 $N \subset M$ ，诱导滤过 $N_n = N \cap M_n$ 满足

$$G(N) \hookrightarrow G(M),$$

于是 $G(N)$ 也有限生成，再次应用前半部分便知 N 有限生成，从而 M 是 Noether 模。

1.15 短正合列的分裂与投射模/内射模

辨析 1.29. 短正合列

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} M'' \rightarrow 0$$

何时分裂，是模论里最基本也最常用的判据之一。

按 代数学方法第一卷 的 (§6.8, 命题6.8.5)，以下条件彼此等价：

1. 存在截面 $s: M'' \rightarrow M$ ，使

$$q \circ s = \text{id}_{M''};$$

2. 存在收缩 $r: M \rightarrow M'$ ，使

$$r \circ i = \text{id}_{M'};$$

3. 中项分解为直和

$$M \cong M' \oplus M''.$$

所以“短正合列分裂”本质上就是说：中项里可以同时把左端作为一个直和子模、把右端作为一个补模取出来。

代数学方法第一卷 的 (§6.9, 定义6.9.3) 把投射模与内射模定义成两个对偶的正合性条件：

- P 是**投射模**，若函子

$$\text{Hom}(P, -)$$

正合；

- I 是**内射模**，若函子

$$\text{Hom}(-, I)$$

正合。

若再把 平坦模 一并放进来，则三者最适合统一记成下面这组函子刻画：

- P 是 **projective**,

$$\iff \text{Hom}(P, -) \text{ 正合};$$

- I 是 **injective**,

$$\iff \text{Hom}(-, I) \text{ 正合};$$

- F 是 **flat**,

$$\iff - \otimes_A F \text{ 正合}.$$

其中前两者互为对偶，而 flat 则是通过张量积来控制短正合列在左端是否保持正合。

把这两个定义翻成“解 lifting / extension 问题”的语言会更直观：

- 投射模的本质是对满射可提升：若 $M \twoheadrightarrow M''$ 且 $P \rightarrow M''$ 已给出，则可提升成 $P \rightarrow M$ ；
- 内射模的本质是对单射可延拓：若 $M' \hookrightarrow M$ 且 $M' \rightarrow I$ 已给出，则可延拓成 $M \rightarrow I$ 。

因此 代数学方法第一卷 的 (§6.9, 命题6.9.8) 立刻给出一个极常用的分裂判据：

$$0 \rightarrow I \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$$

若左端 I 内射，或右端 P 投射，则该短正合列分裂。

原因很直接：

- 若 P 投射，则恒等映射 $P \rightarrow P$ 可沿满射 $M \twoheadrightarrow P$ 提升，得到截面 $s: P \rightarrow M$ ，故分裂；
- 若 I 内射，则恒等映射 $I \rightarrow I$ 可沿单射 $I \hookrightarrow M$ 延拓，得到收缩 $r: M \rightarrow I$ ，故分裂。

1.16 Semi-simple rings 与 hereditary rings

辨析 1.30. 在 *Cartan-Eilenberg* 第 I 章 §4–§5 中，

$$\text{semi-simple} \implies \text{left hereditary},$$

但反过来一般不成立。

原因是：若 Λ 左半单，则每个左理想都是 Λ 的直和因子；而直和因子必为 projective 模，所以每个左理想都 projective，于是 Λ 左遗传。

真正的差别在于：

- **left hereditary** 只要求每个左理想是 projective Λ -模；
- **semi-simple** 更强，要求每个左理想已经是 Λ 本身的直和因子，甚至等价于所有左 Λ -模都 projective（也都 injective）。

所以这里必须区分

“是 Λ 的直和因子” 和 “是 projective Λ -模”。

辨析 1.31. 按照 *Cartan–Eilenberg* Thm. 2.2,

$$P \text{ projective} \iff P \text{ 是某个自由模的直和因子.}$$

因此 projective 模未必要是 Λ 的直和因子, 只能保证它是某个自由模 $\Lambda^{(I)}$ 的直和因子; 有限生成时常可写作 Λ^n 的直和因子。

标准反例是 $\Lambda = \mathbb{Z}$ 。任意理想 $n\mathbb{Z}$ 都同构于 $\mathbb{Z}$, 因此是 projective $\mathbb{Z}$ -模; 但当 $n \neq 0, \pm 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 并不是 $\mathbb{Z}$ 的直和因子。所以 $\mathbb{Z}$ 是 hereditary, 但不是 semi-simple。

辨析 1.32. *Cartan–Eilenberg* 第 I 章 Thm. 5.4 (第 14 页) 与 Prop. 6.2 (第 15 页) 的差异在于:

$$\text{hereditary} \iff \text{投射模的任意子模均投射} \iff \text{内射模的任意商仍内射,}$$

$$\text{semi-hereditary} \iff \text{投射模的有限生成子模均投射.}$$

后者没有相应的内射商结论: 验证 Q/Q' 内射时, 必须对任意嵌入 $P' \hookrightarrow P$ 延拓映射 $P' \rightarrow Q/Q'$; 证明须先用 P' 的投射性提升到 Q , 再用 Q 的内射性延拓。这里的 P' 一般并非有限生成, 故 Prop. 6.2 不足以使用。等价地, Baer 判别法要求检验所有左理想, 而不只是有限生成左理想。

因此“内射模的商仍内射”是 hereditary 的刻画, 不能由一般的 semi-hereditary 推出; 若 Λ 左 Noether, 所有左理想有限生成, 二者才重合。

1.17 Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解

辨析 1.33. *Algebra I* 第 2.8、2.10、2.11 节给出模论版本; *Jacobson, Basic Algebra II* 第 3.3、3.4 节则先在 groups with operators 的框架下证明 Schreier refinement theorem 与 Jordan–Hölder theorem, 再把模看成加法阿贝尔群并带有标量作用的 Λ -group。这里不是把模完全遗忘成普通阿贝尔群: Λ -subgroup 正是子模, 因而 composition series 的因子仍是简单 Λ -模。

Jordan–Hölder 讨论的是滤过商:

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M,$$

其中每个商

$$M_i/M_{i-1}$$

是 simple module; 这些商是 composition factors, 也就是 $JH(M)$, 不是 M 的直和分量。Algebra I Thm. 2.8.2 说明:

若 composition series 存在, 则其长度和简单因子多重集唯一。

Thm. 2.8.4 进一步给出存在性的精确条件:

$$M \text{ Noetherian 且 Artinian} \iff M \text{ 有 composition series} \iff \ell(M) < \infty.$$

短正合列中还满足

$$\ell(M) = \ell(M') + \ell(M''), \quad JH(M) = JH(M') \cup JH(M'').$$

因此 JH 描述的是“从简单层看 M 有哪些成分、出现几次”，但它不记录扩张如何粘合。典型地

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \text{与} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

有相同的 Jordan–Hölder factors, 却不同构。只有在 M 半单时, composition factors 才能直接实现为 simple 直和项:

$$M \cong \bigoplus_i S_i$$

。

Krull–Schmidt 讨论的是**直和分解**:

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r,$$

其中 M_i 是 indecomposable。它描述的是 M 作为整体能否拆成不可再拆的直和块, 而不是只看简单商。关键技术链条是

$$\text{finite length} \implies \text{Fitting lemma} \implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \implies \text{直和项唯一}.$$

在 Algebra I 中对应 Thm. 2.10.8 与 Thm. 2.11.2; 在 Jacobson II 中对应 Fitting’s lemma、Thm. 3.7 与 Krull–Schmidt theorem。具体地,

$$\begin{aligned} &M_i \text{ indecomposable 且满足两侧链条件} \\ &\implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \quad (\text{strongly indecomposable}), \end{aligned}$$

而自同态环 local 才是唯一性证明里的真正齿轮。

因此:

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \iff \text{JH 可用},$$

但

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \implies \text{KS 可用}$$

只是书中采用的充分条件; KS 的本质条件更接近“已经有有限个 strongly indecomposable 直和项”。

辨析 1.34. JH 的反例很直接。作为 $\mathbb{Z}$ -模, $\mathbb{Z}$ 是 Noetherian 但不是 Artinian, 没有 composition series; Prüfer 群

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}(p^\infty)$$

则是 Artinian 但不是 Noetherian, 也没有 composition series。它们说明 JH 的存在性确实要求有限长度, 而不是只要一侧链条件。

KS 的边界更微妙。 *Algebra I* Remark 2.11.3 指出: 若只假设 M Noetherian 或只假设 M Artinian, Krull-Schmidt 定理可能失效。一个标准的 Noetherian 反例来自 Dedekind 整环

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

取非主理想

$$I = (2, 1 + \sqrt{-5}).$$

由 Dedekind 整环上有限生成无挠模的 Steinitz 分解, 非零理想满足

$$I \oplus J \cong R \oplus IJ.$$

令 $J = I^{-1}$, 得到

$$I \oplus I^{-1} \cong R \oplus R.$$

这里 R, I, I^{-1} 作为 R -模都是 indecomposable: 张量到分式域 $K = \text{Frac}(R)$ 后都是一维 K -向量空间, 若有非平凡直和分解会推出

$$K \cong K \oplus K,$$

矛盾。由于 I 非主, $I \not\cong R$, 故

$$R \oplus R \cong I \oplus I^{-1}$$

给出两个不可由排列和同构互相识别的 indecomposable 分解。该模是 Noetherian, 但不是 Artinian。

另一方面, KS 分解可以存在而不要求有限长度。例如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模既非 Noetherian 也非 Artinian, 但

$$\text{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$$

是域, 因而是 local ring。所以 $\mathbb{Q}$ strongly indecomposable, 特别 indecomposable, 并有唯一的平凡 KS 分解

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}.$$

辨析 1.35. 还要区分 Krull-Schmidt 的**存在性**与**唯一性**。Jacobson II 第 3.4 节在进入定理前已经提醒：并非每个模都能写成有限个 indecomposable submodules 的直和；例如无限维向量空间不可能是有限个一维不可分解向量空间的直和。

更一般地，不能说任意模都可写成 indecomposable modules 的直和；有限长度条件保证的是

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r, \quad M_i \text{ indecomposable},$$

并且这个有限分解唯一到同构和排列。但离开有限长度或其他额外假设后，可能出现三种层次：

不能分解为 indecomposable 直和

能分解为 indecomposable 直和，但分解不唯一

能分解且唯一，即 Krull-Schmidt 成立。

例如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模本身 indecomposable，所以它有平凡分解；这只能说明 KS 不求有限长度，不能说明所有模都有 indecomposable 直和分解。事实上，在阿贝尔群范畴中存在不能写成 indecomposable 阿贝尔群直和的例子；常见标准例子是 Baer-Specker 群

$$\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$$

(可数多个 $\mathbb{Z}$ 的直积)，它不是 indecomposable groups 的直和。

因此正确表述应为：

有限长度模一定有有限 indecomposable 直和分解，且满足唯一性；

而不是

任意模都能分解为 indecomposable 直和，只是可能不唯一。

2 专题整理

2.1 投射分解、内射分解与 Tor/Ext 的主线

这一块最好和代数学方法第一卷的 (§6.8, §6.9) 一起看：前者讲短正合列与分裂，后者讲投射模、内射模、平坦模。书中虽然尚未系统展开同调代数，但逻辑上已经自然通向投射分解、内射分解以及 Tor 、 Ext 。

第一步：用“好模”逼近一般模。

任意 A -模 M 总可由自由模满射覆盖：

$$P_0 \twoheadrightarrow M.$$

再对其核继续取自由模满射，便得到一条向左延伸的正合列

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中各 P_i 取投射模时，称为 M 的**投射分解**；取自由模时则是其特例。对偶地，把 M 嵌入一个内射模 I^0 ，再对余核重复，得到

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots,$$

这称为 M 的**内射分解**。

它们的意义在于：许多函子本身并不正合，但在投射模或内射模上表现良好，于是可以先分解、再施函子、最后取同调。

第二步： Tor 衡量张量积的“左正合失效”。

张量积函子

$$- \otimes_A N$$

总是右正合，但一般不左正合。若 $P_\bullet \rightarrow M \rightarrow 0$ 是投射分解，则对其张量 N 得到复形

$$\cdots \rightarrow P_2 \otimes_A N \rightarrow P_1 \otimes_A N \rightarrow P_0 \otimes_A N \rightarrow 0.$$

其同调定义为

$$\text{Tor}_i^A(M, N) := H_i(P_\bullet \otimes_A N) \quad (i \geq 0).$$

其中

$$\text{Tor}_0^A(M, N) \cong M \otimes_A N.$$

因此

$$\text{Tor}_1^A(M, N)$$

首先刻画的就是：把短正合列张量以后，左端到底损失了多少正合性。特别地，

$$N \text{ flat} \iff \text{Tor}_1^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } M \iff \text{Tor}_i^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } i \geq 1, M.$$

第三步：Ext 衡量 Hom 的“右正合失效”与扩张类。

函子

$$\text{Hom}_A(M, -)$$

总是左正合，但一般不右正合。若

$$0 \rightarrow N \rightarrow I^\bullet$$

是 N 的内射分解，则对其施以 $\text{Hom}_A(M, -)$ 得到上链复形

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^0) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^1) \rightarrow \cdots,$$

并定义

$$\text{Ext}_A^i(M, N) := H^i(\text{Hom}_A(M, I^\bullet)).$$

等价地，也可对第一变量取投射分解来计算 Ext。

其中

$$\text{Ext}_A^0(M, N) \cong \text{Hom}_A(M, N).$$

而最重要的第一层是

$$\text{Ext}_A^1(M'', M'),$$

它分类短正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow E \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

的扩张类；零元恰对应分裂扩张。于是“所有这类短正合列都分裂”等价于

$$\text{Ext}_A^1(M'', M') = 0.$$

第四步：与投射模、内射模、全局维数的关系。

- P 投射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(P, N) = 0$$

对任意 N ；

- I 内射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(M, I) = 0$$

对任意 M ；

- N 平坦当且仅当

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$$

对任意 M 。

更高阶的 $\mathrm{Ext}^i, \mathrm{Tor}_i$ 则记录“需要多少步投射/内射分解才能把问题化简掉”。这正是 (III.§10.5) 讨论 homological dimension 与 regular rings 的背景：当投射维数、全局维数有限时，regular 性、depth、Koszul 复形与 $\mathrm{Ext} / \mathrm{Tor}$ 的消失现象会被统一起来。

一句话压缩：

projective/injective resolutions $\implies$ derived functors

$\implies \mathrm{Tor}, \mathrm{Ext}$

$\implies$ flatness / splitting / homological dimension.

2.2 Morita 等价：用模范畴比较环

Morita 等价的核心观点是：研究一个环 A 时，真正有结构的信息不只是环本身，而是它的模范畴。两个含么环 A, B 称为 **Morita 等价**，若其左模范畴等价：

$$A\text{-Mod} \simeq B\text{-Mod}.$$

也就是说，虽然 A 与 B 作为环可以不同构，但它们的表示论、模论和同调性质在范畴意义下是同一个对象。

1. 最标准的例子：矩阵环不改变模论。

对任意环 A 与 $n \geq 1$ ，有

$$A\text{-Mod} \simeq M_n(A)\text{-Mod}.$$

直观地说， $M_n(A)$ -模相当于把 A -模按 n 个分量打包；矩阵环改变了“坐标描述”，但没有改变模范畴。这和 Algebra I 中

$$\mathrm{End}_F(F^n) \cong M_n(F)$$

以及 Schur 引理后出现的

$$\mathrm{End}_R(M^{\oplus n}) \cong M_n(\mathrm{End}_R(M))$$

是同一条线：矩阵环天然作为某个有限直和对象的自同态环出现。

2. Morita 定理的常用形式：progenerator 控制等价。

若 P 是一个左 A -模, 令

$$B := \text{End}_A(P)^{\text{op}}.$$

若 P 是 **progenerator**, 即

P 有限生成、投射, 且是生成元,

则函子

$$\text{Hom}_A(P, -) : A\text{-Mod} \longrightarrow B\text{-Mod}$$

给出 Morita 等价, 其准逆可写成

$$P \otimes_B - : B\text{-Mod} \longrightarrow A\text{-Mod}.$$

这里“生成元”可以理解为: 所有 A -模都能由 P 的若干拷贝通过商模构造出来。于是 Morita 理论把“两个环的模范畴等价”化成“一个足够好的投射生成模的自同态环”。

3. 它起到的作用: 把环换成更方便但模论等价的环。

Morita 等价会保持许多只依赖模范畴的性质, 例如:

simple modules, projective/injective modules, exact sequences,
semisimplicity, global dimension, Ext/Tor 型同调信息.

因此它的作用不是判断两个环是否“元素级相同”, 而是判断它们是否有同一套模论。典型应用是把一个环替换为矩阵环、块代数或某个生成模的自同态环, 从而让计算更方便。

4. 与教材中已有内容的连接。

- Algebra I 的 (§2.7) 中, Schur 引理说明 simple module 的自同态环是除环; 随后 $\text{End}_R(M^{\oplus n})$ 给出矩阵环, 这是 Morita 理论的最早影子。
- Algebra I 的 (§2.10, §2.11) 中, indecomposable 与 strongly indecomposable 都依赖 $\text{End}_R(M)$; Krull-Schmidt 定理的唯一性也由 local endomorphism ring 控制。
- Jacobson-Basic Algebra II 的 (§1.4) 先给出范畴等价的语言; (§3.12, §3.14, §3.15) 分别讨论 Morita contexts、generators/progenerators 与 module categories 的等价。
- Cartan-Eilenberg 中 semi-simple、hereditary、projective 与 injective modules 的刻画都是模范畴性质; 因此它们天然应在 Morita 等价下保持。

一句话压缩:

Morita 等价不是说 $A \cong B$, 而是说 A 与 B 的模范畴等价。

2.3 Algebra I 中 local ring 的性质与判定

这里集中整理 Algebra I 中关于 local ring 的几条主线，主要出处是 (I.§2.10) 第 75–78 页，以及 (I.§3.3) 第 91–93 页。

1. 定义：local 的核心是“非单位形成一个理想”。

按 (I.Def 2.10.2)，一个含么环 A 称为 local，若 A 中所有非单位构成一个双边理想。记这个理想为

$$\mathfrak{m}.$$

于是

$$A^\times = A \setminus \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = \{x \in A \mid x \text{ non-unit}\}.$$

这一定义对非交换环也适用；这里的单位指同时有左逆和右逆的元素。

2. 判定：唯一极大左/右理想与 Jacobson 根。

(I.Lem 2.10.3) 给出等价刻画：

$$\begin{aligned} & A \text{ 有唯一极大左理想} \\ \iff & A \text{ 有唯一极大右理想} \\ \iff & A/\text{rad}(A) \text{ 是除环} \\ \iff & A \text{ 是 local.} \end{aligned}$$

在 local 情形下，

$$\text{rad}(A) = \mathfrak{m},$$

也就是 Jacobson radical 正是唯一极大理想；这也在 (I.Ex 3.3.5(2)) 中再次出现。

更一般地，(I.Lem 3.3.2) 说明

$$y \in \text{rad}(A) \iff 1 - xy \text{ 对任意 } x \in A \text{ 有左逆}.$$

因此在 local ring 中， $\mathfrak{m}$ 的元素可以理解为“在所有简单模上都看不见”的坏元素；而

$$1 - \mathfrak{m} \subset A^\times$$

是最常用的快速判断。

3. 幂零判定：若元素不是单位就是幂零，则环 local。

(I.Lem 2.10.9) 给出一个很实用的充分条件：若环 A 中每个元素都满足

$$x \text{ nilpotent} \quad \text{或} \quad x \in A^\times,$$

则 A 是 local，且其极大理想为

$$\mathfrak{m} = \{x \in A \mid x \text{ nilpotent}\}.$$

注意这只是充分条件，不是 local ring 的一般定义；例如 Algebra I 在 (I.Rem 3.4.3) 附近提到

$$F[[t]]$$

是 local, $\text{rad}(F[[t]]) = tF[[t]]$ ，但其中非零元素 t 并非幂零。

4. 幂等元判定：local ring 没有非平凡幂等元。

(I.Def 2.10.4) 后指出：若 A 是 local，则

$$e^2 = e \implies e = 0 \text{ 或 } e = 1.$$

理由很短：若 $e \neq 0, 1$ ，则 e 与 $1 - e$ 都不是单位，故都落在 $\mathfrak{m}$ ，于是

$$1 = e + (1 - e) \in \mathfrak{m},$$

矛盾。

这个结论常被用来判定模不可分解：若 $M = M_1 \oplus M_2$ ，投影给出 $\text{End}_R(M)$ 中非平凡幂等元。因此

$$\text{End}_R(M) \text{ local} \implies M \text{ indecomposable}.$$

Algebra I 把满足

$$M \neq 0, \quad \text{End}_R(M) \text{ local}$$

的模称为 strongly indecomposable。

5. 有限长度不可分解模的自同态环是 local。

(I.Thm 2.10.8) 由 Fitting lemma 推出：若 M indecomposable 且同时满足 Noetherian 与 Artinian 条件，则任意

$$f \in \text{End}_R(M)$$

要么是 nilpotent，要么是 automorphism。结合上一条幂零判定，得到

$$\text{End}_R(M) \text{ local}.$$

这正是 Krull-Schmidt 定理唯一性证明里真正用到的 local ring 输入：在 local endomorphism ring 中，若

$$1 = \sum_j u_j v_j,$$

则至少有一个 $u_j v_j$ 是单位，否则右端会落入唯一极大理想。

6. Nakayama 引理：local ring 上“模掉 $\mathfrak{m}$ ”可控制有限生成模。

(I.Rem 3.3.7) 把 Nakayama 引理专门写成 local ring $(R, \mathfrak{m})$ 的常用形式：

- 若 $M \neq 0$ 是有限生成 R -模, 则

$$\mathfrak{m}M \neq M.$$

- 若 $x_1, \dots, x_n \in M$ 的像生成

$$M/\mathfrak{m}M$$

作为 $R/\mathfrak{m}$ -向量空间, 则 $x_1, \dots, x_n$ 生成 M 。

- 若 $f: M \rightarrow N$ 且 N 有限生成, 若诱导映射

$$\bar{f}: M/\mathfrak{m}M \rightarrow N/\mathfrak{m}N$$

满射, 则 f 满射。

直观上, local ring 只有一个闭点; 所以有限生成模的许多性质可以先看唯一纤维

$$M/\mathfrak{m}M.$$

这也是后续交换代数中 regular local ring、切空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 、以及 local criterion of flatness 会反复使用 local ring 的原因。

一句话压缩:

local ring = 只有一个极大方向;
非单位、Jacobson 根、Nakayama 与自同态环判定都围绕这个唯一方向展开。

2.4 Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系

这里把 Algebra I 第 1.12 节与第 1.13 节压缩成一条主线。核心不是简单地问

$$\text{Galois} \stackrel{?}{\implies} \text{radical}$$

或

$$\text{radical} \stackrel{?}{\implies} \text{Galois},$$

而是要区分“扩张本身是不是 radical”与“分裂域是否包含在某个 radical 扩张里”这两层。

第一层: radical 扩张本身的基本性质。

按 (I.Def 1.12.4), 有限扩张 K/F 是 radical, 指存在塔

$$F = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = K,$$

其中每一步都形如

$$K_i = K_{i-1}(u_i), \quad u_i^{m_i} \in K_{i-1}.$$

因此 radical 的本质就是“可由逐步开方、开 m 次根得到”。但这类扩张一般不必 Galois；例如单步扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$$

就是 radical，但不是正规扩张。

第二层：Galois 与 radical 之间没有直接蕴含。

- **radical $\nRightarrow$ Galois:** 上面的 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 已给出反例。
- **Galois $\nRightarrow$ radical:** 由 (I.Prop 1.12.4(i)),

$$\mathbb{Q}(\zeta_7)$$

是 radical 扩张，但其一个三次中间域 $E/\mathbb{Q}$ 虽然是 Galois，却不是 radical。

所以真正成立的结论不是二者彼此蕴含，而是下面这一条“经过 Galois 闭包后的可解性结论”。

第三层：radical 扩张的 Galois 闭包具有可解 Galois 群。

(I.Prop 1.12.5) 说明：若 E/F 是有限 radical 扩张， K/F 是其 Galois 闭包，则

$$K/F \text{ 仍包含在 radical 框架里，且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解。}$$

直观上，这是因为：

1. 单步扩张 $x^n - a$ 的分裂域 Galois 群可解 ((I.Prop 1.12.3))；
2. 有限次复合 radical 扩张后，Galois 闭包仍由这些“开根步骤”的共轭拼起来；
3. 可解群对扩张与复合稳定。

第四层：反过来，有限可解 Galois 扩张总能嵌入某个 radical 扩张。

(I.Thm 1.12.7) 给出逆向主定理：

$$K/F \text{ 有限 Galois 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解} \implies K \subset L$$

其中 L/F 是某个 radical 扩张。

其证明思路是：

1. 在可解群中取一个素数指标的正规子群；

2. 先添入相应的原始 p 次单位根;
3. 把素数次 Galois 扩张化成一个单步 radical 扩张 ((I.Lem 1.12.6));
4. 再做归纳。

注意这里结论只是

$$K \subset L,$$

即 K 包含在某个 radical 扩张中, 而不一定 K 本身就是 radical 扩张。这正是书上 $E/\mathbb{Q}$ 那个三次子域反例要提醒的地方。

第五层: 与“方程可由根式解”之间的对应。

(I.Def 1.13.1) 把“多项式可由根式解”定义为: 它的分裂域 K_f 包含在某个 radical 扩张中。于是 (I.Thm 1.13.3) 得到经典等价:

$$f \text{ solvable by radicals} \iff \text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解}.$$

这里最容易混淆的一点是: 上式**不是**在说

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f/F \text{ 本身是 radical}.$$

正确表述应分成两层:

1.

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff f \text{ solvable by radicals};$$

2.

$$f \text{ solvable by radicals} \iff K_f \subset L \text{ for some radical } L/F.$$

但一般**不能**推出

$$K_f/F \text{ 本身是 radical}.$$

书上紧接着就在 (I.Rem 1.13.2) 明说了这一点: 前面

$$E/\mathbb{Q}$$

那个三次 Galois 子域正是一个标准反例: 它的 Galois 群 C_3 可解, 因此对应方程确实“可由根式解”, 但 $E/\mathbb{Q}$ 自身并不是 radical 扩张。

因此, 对分裂域 K_f/F 而言, 真正的等价式是

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f \text{ 可嵌入某个 radical 扩张}.$$

再抽象一层看, 一般有限扩张里的 radical 与 solvable 关系是:

1. 若 E/F 是 radical 扩张, 则其 Galois 闭包 K/F 满足

$$\text{Gal}(K/F) \text{ 可解};$$

2. 若 K/F 是有限 Galois 扩张且 $\text{Gal}(K/F)$ 可解, 则

$$K \subset L$$

对某个 radical 扩张 L/F 成立;

3. 但这两个方向都只说明“与 radical 有关”或“能嵌入 radical”, 并不说明该扩张对象本身就是 radical。

所以“radical”和“solvable”的正确对应关系应压缩成:

$$\begin{aligned} \text{radical} &\implies \text{solvable Galois closure,} \\ \text{solvable Galois} &\implies \text{contained in a radical extension.} \end{aligned}$$

因此整条主线应理解为

$$\text{radical extension} \implies \text{solvable Galois closure} \implies \text{solvable Galois group},$$

以及反向的

$$\text{solvable finite Galois extension} \implies \text{contained in a radical extension}.$$

把两边合起来, 得到“根式可解”与“Galois 群可解”的桥梁; 这才是第 1.12 节与第 1.13 节真正要服务的结论。

一句话压缩:

radical 不是 Galois 的同义词;
真正对应的是“可解 Galois 群”与“可嵌入某个 radical 扩张”

2.5 Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张

这两类扩张是“如何把某些 cyclic Galois 扩张写成显式方程”的两套标准模型; 前者适用于 $\text{char } F \nmid n$, 后者适用于 $\text{char } F = p$ 。

1. Kummer 扩张: 乘法型的 cyclic 扩张。

设 $\text{char } F \nmid n$, 并且 F 中已经含有全部 n 次单位根 μ_n 。这时最典型的扩张是

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n = a \in F.$$

若 $x^n - a$ 在 F 上不可约, 则

$$[E : F] = n.$$

因为 $\mu_n \subset F$, 任一 F -自同构都必须把 α 送到另一个 n 次根

$$\sigma(\alpha) = \zeta\alpha, \quad \zeta \in \mu_n,$$

故

$$\text{Gal}(E/F) \hookrightarrow \mu_n.$$

特别地, 当 $[E : F] = n$ 时, $\text{Gal}(E/F)$ 是一个循环群; 反过来, 经典 Kummer 理论说明: 若

$$E/F \text{ 是次数 } n \text{ 的 cyclic Galois 扩张, 且 } \mu_n \subset F,$$

则

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n \in F.$$

因此 Kummer 扩张刻画的是: 在底域已含足够单位根时, **cyclic** 扩张可以写成“开 n 次根”得到。它和前面 radical 扩张的关系也很直接: Kummer 扩张本身就是最标准的单步 radical 扩张; 但它额外带有 $\mu_n \subset F$ 与 cyclic/Galois 这两层结构。

2. Artin–Schreier 扩张: 特征 p 下的加法型模型。

现在设 $\text{char } F = p > 0$ 。这时 $x^p - a$ 的形式会退化, 因为

$$(X + Y)^p = X^p + Y^p.$$

真正替代 Kummer 理论的, 是多项式

$$T^p - T - a \quad (a \in F).$$

若 α 满足

$$\alpha^p - \alpha = a,$$

则对任意 $c \in \mathbb{F}_p$ 都有

$$(\alpha + c)^p - (\alpha + c) = a,$$

所以所有根都是

$$\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p - 1).$$

由此可见: 若 $T^p - T - a$ 在 F 上不可约, 则其分裂域就是

$$E = F(\alpha),$$

并且

$$[E : F] = p, \quad \text{Gal}(E/F) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

其中生成元可写成

$$\sigma(\alpha) = \alpha + 1.$$

反过来, Artin-Schreier 理论说明: 特征 p 下每个次数 p 的 **cyclic Galois** 扩张, 都可写成

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha \in F.$$

并且这种扩张由商群

$$F/(F^p - F)$$

控制; 也就是说, a 与 $a + b^p - b$ 给出同一个扩张。

3. 两者的平行关系。

理论	方程	控制的 cyclic 扩张
Kummer	$T^n - a$	$\text{char } F \nmid n, \mu_n \subset F$
Artin-Schreier	$T^p - T - a$	$\text{char } F = p$

更概念化地说:

- Kummer 理论是**乘法群** $F^\times$ 的理论, 参数落在

$$F^\times / (F^\times)^n;$$

- Artin-Schreier 理论是**加法群** F 的理论, 参数落在

$$F/(F^p - F).$$

所以它们并不是彼此无关的两个技巧, 而是分别在

$$\text{char } F \nmid n \quad \text{与} \quad \text{char } F = p$$

这两种环境下, 对 “**cyclic Galois 扩张的显式描述**” 给出的标准答案。

一句话压缩:

Kummer = 乘法型开根模型, Artin-Schreier = 特征 p 下的加法型 cyclic 模型。

2.6 CSA 相关概念总联系

这里集中整理 Algebra I 中中心单代数 (central simple algebra, CSA) 的主线关系, 便于把 Brauer 群、分裂域与中心化子放进同一框架里理解。

- CSA 的定义是“单环 + 中心等于底域 F ”；有限维情形下，由 Wedderburn-Artin 理论，

$$A \simeq M_n(D),$$

其中 D 是中心除 F -代数。因此研究有限维 CSA，本质上就是研究中心除代数。

- 张量积是组织 CSA 的基本运算：若 A, B 是 CSA，则 $A \otimes_F B$ 仍是 CSA；而

$$A \otimes_F A^{\text{op}}$$

与 $\text{End}_F(A)$ 紧密相关，这也是 Brauer 群中逆元由对立代数给出的原因。

- 分裂域刻画“一个 CSA 离矩阵代数有多远”：若某扩域 K/F 使

$$A_K := A \otimes_F K \simeq M_r(K),$$

则称 K 分裂 A 。若 $A \simeq M_n(D)$ ，则分裂 A 与分裂 D 等价，所以问题进一步归约到中心除代数。

- 中心除代数内部最关键的对象是极大子域。书中证明：每个极大子域 $K \subset D$ 都分裂 D ，并满足

$$C_D(K) = K, \quad (\dim_F K)^2 = \dim_F D.$$

因而“极大子域”同时联系了分裂域、中心化子与维数公式。

- Skolem-Noether 定理说明 CSA 内部嵌入的刚性：任意两个从单代数 A 到 CSA B 的 F -代数同态都相差一个内共轭。于是自同构是内自同构，同构子域彼此共轭。
- 双中心化子定理给出内部结构分解：对合适子代数 $A \subseteq B$ ，有

$$C_B(C_B(A)) = A,$$

且当 A 为单代数时，

$$\dim_F B = (\dim_F A) \cdot (\dim_F C_B(A)).$$

这说明子代数与其中心化子互相决定。

- Brauer 群把所有 CSA 的“相似类”组织成交换群。分裂的 CSA 对应平凡元；中心除代数则是每个 Brauer 类的最简代表。

2.7 滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角

(III.Def 8.0.1) 中的 filtration 是环论语言：给定环 A 、理想 $I \subset A$ 与 A -模 M ，一系列降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset \cdots \supset M^n \supset \cdots$$

称为 filtration；若

$$IM^n \subset M^{n+1} \quad (\forall n),$$

则称为 I -filtration；若最终满足 $IM^n = M^{n+1}$ ，则是稳定 I -filtration；若

$$M^n = I^n M \quad (\forall n),$$

则是 I -adic filtration。

把它放到范畴论里看，重点不是“有一串子模”，而是“有一个逆系统”。对每个 n 都有商模

$$M/M^n,$$

以及自然投影

$$M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n.$$

因此 filtration 给出一个 Mod_A 中的 pro-对象，或者更朴素地说，给出一个逆向系统

$$\cdots \longrightarrow M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n \longrightarrow \cdots \longrightarrow M/M^1.$$

这正是《代数学方法》第二卷附录 B 所说的 pro-对象思路：对象不是一次性看完，而是由一串有限层次近似的逆极限来逼近。于是 completion 的自然写法就是

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M^n.$$

第二卷关于滤过复形也采用同样观点：完备性就是典范映射

$$X \longrightarrow \varprojlim_p X/F^p X$$

为同构；而第一卷 §5.5 的环完备化也是

$$A \longrightarrow \varprojlim_n A/\mathfrak{a}^n$$

的语言。这说明 (III.Def 8.0.1) 的 I -adic 过滤并不是孤立定义，而是“由逆系统诱导拓扑，再对该拓扑完备化”的交换代数特例。

I -adic 与数论里的 p -adic 完全相容。取

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (p),$$

则 I -adic filtration 就是

$$\mathbb{Z} \supset p\mathbb{Z} \supset p^2\mathbb{Z} \supset \cdots,$$

其完备化为

$$\widehat{\mathbb{Z}}^{(p)} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

所以环论里的 I -adic 在 $I = (p)$ 时就是数论里的 p -adic; 进一步局部化得到

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p).$$

《代数学方法》第一卷 §5.5 与 §10.2 正是沿这条线说明:

$\mathbb{Z}_p$ 是 $\mathbb{Z}$ 对 $p\mathbb{Z}$ -进拓扑的完备化,

而

$\mathbb{Q}_p$ 也可看成 $\mathbb{Q}$ 对 v_p 或 $|\cdot|_p$ 的完备化.

因此两种语言只是出发点不同:

- 从交换环论出发, 看的是理想幂 I^n 给出的邻域基与商环 A/I^n ;
- 从赋值论出发, 看的是 v_p 或 $|\cdot|_p$ 给出的拓扑与 Cauchy 完备化.

对 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 而言, 两者得到的是同一个对象。

范畴论里并没有一个与 p -adic 对应的全新“神秘定义”, 但有清楚的外壳。

- 第一层外壳是 **逆极限 / pro-对象**: $\mathbb{Z}_p$ 本身就是

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

这种逆系统的极限。

- 第二层外壳是 **拓扑群或拓扑环**: 第一卷把完备化放在拓扑群、拓扑环的框架中处理; 第二卷附录 B 则强调 pro-有限群是有限群的滤过逆极限。
- 第三层外壳是 **pro-有限/Stone 视角**。第二卷说明

$$\text{Stone spaces} \simeq \text{Pro}(\text{FinSet}).$$

而 $\mathbb{Z}_p$ 作为紧 Hausdorff 且完全不连通的空间, 正可以放进这种 pro-有限背景里理解; 其加法群也是典型的 pro- p 对象, 因此当然也是 pro-有限对象。

所以最简洁的统一说法是：

$$\text{filtration} \rightsquigarrow \text{inverse system} \rightsquigarrow \text{completion as } \varprojlim,$$

而

$$p\text{-adic} = (p)\text{-adic 在 } \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \text{ 上的具体实现.}$$

还要区分《代数学方法》第一卷中的“滤子”与这里的“滤过”。

第一卷第 §10.1 讲的是 **滤子** (filter), 它属于拓扑语言: 用来描述邻域系统、Cauchy 条件、极限与完备化。书中随后用它来统一处理赋值诱导的拓扑、 p -进完备化以及局部域。这里的关键词是

$$\text{filter 而不是 filtration.}$$

而 (III.Def 8.0.1) 以及第二卷谱序列部分讲的则是 **滤过** (filtration), 即对象上的降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset M^2 \supset \cdots.$$

它本身是代数数据, 不是滤子; 但是一旦把 M^n 视为 0 的一组基本邻域, 便得到一个线性拓扑, 于是可以谈 Cauchy 滤子与完备化。因此两者的关系是

$$\text{filtration} \implies \text{topology} \implies \text{filters / Cauchy filters.}$$

从范畴论看, 同一个 filtration 还会导出逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M^{n+1} \rightarrow M/M^n,$$

所以又给出一个 pro-对象。换言之：

$$\text{第一卷的滤子是拓扑层语言,}$$

$$\text{这里的滤过是产生该拓扑与该 pro-对象的代数输入。}$$

还要把分次环、滤过环与 **completion/pro-对象** 严格区分开。

(III.Def 8.1.1) 定义的是 **分次环** (graded ring), 不是滤过环: 它要求

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, \quad A_m A_n \subseteq A_{m+n}.$$

这比“底层阿贝尔群由若干 A_n 拼起来”更强, 因为它同时记住了:

- 这是一个直和分解, 所以元素的齐次分量分解是唯一的;
- 乘法与次数相容, 即 degree 会相加。

因此分次环的本质是“内部直和分解加上次数结构”，而不是单纯某族对象的余极限。

与此不同，**completion/pro-对象**天然来自滤过，而不是直接来自分次。若

$$A = F^0 A \supseteq F^1 A \supseteq F^2 A \supseteq \cdots$$

是一个降滤过，则商环之间有自然满射

$$A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A,$$

于是得到逆向系统

$$\cdots \longrightarrow A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A \longrightarrow \cdots \longrightarrow A/F^1 A,$$

也就是一个 pro-对象；其逆极限

$$\widehat{A} = \varprojlim_n A/F^n A$$

就是 completion。对 I -adic 情形，只是取 $F^n A = I^n$ 。

分次与滤过之间的桥梁是 **伴随分次环**。若给定滤过 $F^\bullet A$ ，则可构造

$$\mathrm{gr}_F(A) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n A / F^{n+1} A.$$

这是一般滤过的写法；当取 $F^n A = I^n$ 为 I -adic 滤过时，就得到书上第 8.3 节使用的记号

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1} = \mathrm{gr}_I(A).$$

它记录的是“每一层新出现的部分”；而 completion 看的是所有截断

$$A/F^n A$$

如何兼容拼接起来。简言之：

$$\text{graded} = \text{按层切片}, \quad \text{filtered} = \text{给出层层截断},$$

$$\text{pro-object} = \{A/F^n A\}_{n \geq 0}, \quad \text{completion} = \varprojlim_n A/F^n A.$$

所以 (III.Def 8.1.1) 的分次结构并不是 completion 本身；真正通向 completion/pro-对象的是后续由滤过产生的逆系统。

2.8 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性

第 8 章信息量大，但主线其实很集中：先把 I -filtration 变成分次对象与拓扑对象，再用 Artin-Rees 控制子模，再把 completion 与 associated graded 结合起来，最后回到 flatness 与 Noether 性。若只抓最核心的结构关系，可以压成下面几条链。

第一条主线：同一个 filtration 同时导出两个对象。

给定 A -模上的 I -filtration

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots, \quad IM_n \subset M_{n+1},$$

它一方面给出 associated graded

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

另一方面给出截断逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M_{n+1} \rightarrow M/M_n \rightarrow \cdots \rightarrow M/M_1,$$

从而导出 completion

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n.$$

因此这一章真正的核心不是把 graded、filtered、topological 拆开看，而是看同一个 filtration 如何分裂出两个互补视角：

$$\begin{array}{ccc} & (M_n) & \\ \swarrow & & \searrow \\ G(M) = \bigoplus_n M_n / M_{n+1} & & \widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n. \end{array}$$

这里还要严格区分 filtered 与 graded：原模 M 连同降链 (M_n) 本身一般只是一个 filtered module，因为数据只是

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots,$$

并没有给出

$$M \cong \bigoplus_{n \geq 0} M^{(n)}$$

这样的直和分解；因此不能把 M 连同 (M_n) 直接看成 graded module。真正天然带分次结构的是

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

因为这里已经显式取了各层商模的直和。只有在额外给出某个分次分解，且该滤过正是由该分次诱导出来时， M 才会同时兼具 graded 与 filtered 两种结构。(III.Lem 8.0.2) 说明 stable I -filtration 与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；因此拓扑层面只关心 filtration 的“尾部行为”，而 graded 层面则保留每一层的首项数据。

第二条主线：Artin-Rees 把“子模与过滤不相容”的问题强行稳定化。

(III.Lem 8.2.1) 给出 stable filtration 与有限生成 graded module 的等价：

$$(M_n) \text{ stable} \iff M^* \text{ finitely generated over } A^*.$$

在此基础上，(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理说明：若 $N \subset M$ ，则诱导过滤

$$N \cap M_n$$

仍然稳定。它解决的是“先取子模再取 I -adic 过滤”与“先过滤再限制到子模”之间的兼容性问题：

$$\begin{array}{ccc} N & \hookrightarrow & M \\ \uparrow & & \uparrow \\ N \cap M_n & \hookrightarrow & M_n \end{array}$$

并且在 I -adic 情形下，最终有

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N) \quad (n \gg 0).$$

这一步是后面一切正合性与完备化结论的技术基础，因为它保证子空间拓扑就是子模自己的 I -adic 拓扑。

第三条主线：completion 不是孤立构造，而是与短正合列相容。

(III.§8.4) 先在拓扑阿贝尔群层面证明

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n,$$

然后借 (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 得到完备化对短正合列的正合性控制。真正服务于交换代数的是下面这张图：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{M'} & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{M''} \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中纵向是 completion map。对 finitely generated Noether 情形，(III.Prop 8.5.1) 正是利用 Artin-Rees 把这一图落实到 I -adic completion 上。

第四条主线：flatness 检验与 associated graded 检验本质上都在比较“原对象”和“各阶切片”。

(III.Thm 8.3.1) 的局部平坦判据把 flatness 化为分次对象上的等价条件。最紧凑的理解方式是：若

$$M_n = M/I^{n+1}M, \quad A_n = A/I^{n+1},$$

则 “ M flat over A ” 可以沿着

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \longrightarrow G_I(M)$$

来检查；这里看的是每一阶 infinitesimal layer 是否与底层 M/IM 相容。也就是说，flatness 在第 8 章里不是直接检验所有张量，而是转化为检验各阶商模与 associated graded 是否按预期拼起来。

第五条主线：Noether 性在 completion 与 associated graded 之间双向传递。

(III.Prop 8.5.8) 说明：若 A Noether，则

$$G_I(A) \simeq G_{I\hat{A}}(\hat{A}),$$

且 finitely generated 模的 stable filtration 会给出 finitely generated 的 associated graded。反过来，(III.Prop 8.5.10) 说明：若 A 已完备、 $\bigcap M_n = 0$ ，且 $G(M)$ 足够好，则可从 graded 数据恢复 M 的有限生成与 Noether 性。它们合起来形成这一章最重要的闭环：

$$\begin{array}{ccc} M \text{ finitely generated / Noether} & \xrightarrow{\text{(III.Prop 8.5.8)}} & G(M) \text{ finitely generated / Noether} \\ \uparrow \text{completion} & & \\ \hat{M} \text{ finitely generated / Noether} & \xleftarrow{\text{(III.Prop 8.5.10)}} & G(\hat{M}) \end{array}$$

其中右上到左下这一步要借助完备性与

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

排除“躲在无限深层的元素”。因此第 8 章后半的真正结论不是单独的“完备化保持 Noether”，而是：

Noether 性 $\iff$ 可由 associated graded 控制 $\iff$ completion 仍可控。


若想把第 8 章中 I -filtration / stable / 有限生成 / Noether 之间的依赖关系一次看清，可记下面这张条件网络图：

$$\begin{array}{ccc} I\text{-filtration} & \dashrightarrow & \text{associated graded } G(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{quotient tower } \{M/M_n\} & \dashrightarrow & \hat{M} = \varprojlim M/M_n \end{array}$$

上图只说明：任意 I -filtration 立刻给出两类对象

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1}, \quad \widehat{M} = \varprojlim_n M / M_n,$$

但这时一般还不能推出稳定性、拓扑等价、Artin-Rees、或有限生成性质。




这张图说明：

- I -adic filtration 一定 stable;
- stable 的直接用途是：由 (III.Lem 8.0.2)，它与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；
- 但 “stable $\iff M^*$ 有限生成 over A^* ” 这一等价，不是对一般情形成立，而是要加上

$$A \text{ Noether}, \quad M \text{ finitely generated over } A$$

才能使用 (III.Lem 8.2.1)。



这说明在第 8 章前半，有限生成性更多是前提而不是结论：它与 Noether 性一起保证 Artin-Rees 可用，也保证稳定滤过能被 associated graded 的有限生成性刻画，并最终推出 completion 的正合性与平坦性。

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ finitely generated over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ finitely generated over } A$$

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ Noetherian over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ Noetherian over } A$$

而到了第 8 章后半, 有限生成性才开始作为**结论**出现: 只要环已完备、滤过 separated, 且 associated graded 足够好, 就能把 graded 层面的有限生成或 Noether 性拉回原模。

因此若只记一句话, 可以记成:

I -filtration 给对象, stable 给拓扑, Artin-Rees 给子模兼容;

有限生成/Noether 让这些技术可用, 而完备 + separated + graded 有限生成

又能把有限生成性与 Noether 性从 graded 层面拉回原模。

若只记第 8 章最重要的概念关系, 可以记下面这一张总图:

$$\begin{array}{ccc}
 I\text{-filtration} & \xrightarrow{\text{slice}} & \text{associated graded } G(M) \\
 \text{quotient tower} \downarrow & & \downarrow \text{flatness / Noether tests} \\
 I\text{-adic topology} & \xrightarrow{\text{completion}} & I\text{-adic completion } \widehat{M}
 \end{array}$$

而 Artin-Rees 的位置正好在左边, 负责保证“子模也沿同一张图运转”; 8.3 节与 8.5 节则分别站在右上和右下, 把 flatness 与 Noether 性接回来。

2.9 第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q

在 (III.§9.2) 里, Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 的维数不是直接从素理想链出发, 而是先引入两个更“可计算”的量:

$$d(A) := d(G_{\mathfrak{m}}(A)), \quad \delta(A) := \min\{\mu(\mathfrak{q}) \mid \mathfrak{q} \subset A \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary ideal}\},$$

其中 $\mu(\mathfrak{q})$ 表示理想 $\mathfrak{q}$ 的最少生成元个数。书中 (III.Not 9.2.1) 也把

$$\delta(A) = \min\{n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}, \ell(A/(x_1, \dots, x_n)) < \infty\}$$

作为等价定义: 也就是说, $\delta(A)$ 测的是“最少用多少个元素, 才能切出一个 $\mathfrak{m}$ -primary ideal”, 而不是极大理想 $\mathfrak{m}$ 自身的最少生成元个数。

$d(A)$ 有三种等价的读法。

- 按 (III.Def 9.1.2),

$$d(A) = d(G_{\mathfrak{m}}(A))$$

是 Hilbert series

$$P(G_{\mathfrak{m}}(A), t)$$

在 $t = 1$ 处极点的重数。

- 由 (III.Cor 9.1.3), 当分次生成元次数全为 1 时, 存在 Hilbert 多项式

$$\phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)}(n) = \ell(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \quad (n \gg 0),$$

且

$$\deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} = d(A) - 1.$$

- 再由 (III.Prop 9.1.6), 存在 $\chi_{\mathfrak{m}}(t) \in \mathbb{Q}[t]$ 使

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且

$$\deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A).$$

因此

$$d(A) = \text{ord}_{t=1} P(G_{\mathfrak{m}}(A), t) = \deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} + 1 = \deg \chi_{\mathfrak{m}}.$$

$\delta(A)$ 与 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 不是同一个量。

- $\delta(A)$ 关注的是某个 **m-primary ideal** 的最少生成元个数;
- $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 则由 Nakayama 引理等于极大理想 **m** 本身的最少生成元个数。

两者的关系是

$$\dim A = \delta(A) \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad (\text{III.Thm 9.2.7, III.Cor 9.2.9}).$$

等号不一定成立; 等号成立正是第 10 章 regular local ring 的定义:

$$A \text{ regular} \iff \dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

因此可以把它们理解成:

$$\delta(A) \text{ 衡量 “参数个数”,} \quad \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \text{ 衡量 “切空间维数”}.$$

χ_q 的作用不只是记号, 它是第 9 章把 “长度增长” 转成 “维数” 的桥。

对任意 **m-primary ideal** $\mathfrak{q}$, (III.Prop 9.1.6) 给出

$$\chi_q(n) = \ell(A/\mathfrak{q}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且 χ_q 的次数与最高次项只依赖于 $(A, \mathfrak{q})$ 的渐近结构。它在本章中的几项直接用途是:

- 由 (III.Prop 9.1.7),

$$\deg \chi_q = \deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A),$$

所以不论选哪一个 $\mathfrak{m}$ -primary ideal 来做长度函数, 得到的“增长次数”都是同一个维数不变量。

- 在 (III.Prop 9.2.2) 中, 若 x 是非零因子, 则

$$\deg \chi_q^{M/xM} \leq \deg \chi_q^M - 1,$$

这正是后面推出

$$d(A/(x)) \leq d(A) - 1$$

以及最终证明

$$\dim A \leq d(A)$$

的核心递降机制。

- 由 (III.Cor 9.2.13), 完备化不改变 χ 的次数, 因此也不改变 $d(A)$ 与 $\dim A$ 。这说明 χ_q 对 m -adic completion 是稳定的。
- 更往后看, χ_q 的最高次项系数 (差一个 $d!$ 的归一化) 就是 Hilbert–Samuel multiplicity 的来源; 因此 χ_q 不仅编码维数, 也编码“局部厚度/重数”。书里本节主要使用的是次数, 而几何与更深入的交换代数里常进一步使用**首项系数**。

把 (III.§9.2) 的主线压成一句话, 就是:

$$\chi_q \text{ 记录长度增长, } d(A) \text{ 读出增长次数, } \delta(A) \text{ 读出参数个数,}$$

而 Krull 定理 (III.Thm 9.2.7) 说明这三种维数观最终一致: $\dim A = d(A) = \delta(A)$ 。

system of parameters 是 $\delta(A) = \dim A$ 的具体实现。

当 A 是维数 d 的 Noether 局部环时, (III.Def 9.2.14) 把

$$x_1, \dots, x_d \in A$$

称为一个 **system of parameters**, 如果

$$(x_1, \dots, x_d)$$

是 $\mathfrak{m}$ -primary ideal。于是 system of parameters 不是“随便取 d 个元素”, 而是“恰好用 d 个元素切出一个零维商环”的意思。它和前面的不变量关系正是

$$\#\{\text{parameters}\} = d = \dim A = \delta(A).$$

因此 $\delta(A)$ 的抽象定义, 最终是由 parameter ideals 具体实现出来的。

(III.Prop 9.2.15) 说的是: **parameter ideal 在 associated graded 里没有新的低次齐次关系。**

设 $x_1, \dots, x_d$ 是一个 system of parameters, $\mathfrak{q} = (x_1, \dots, x_d)$ 。若

$$f(t_1, \dots, t_d) \in A[t_1, \dots, t_d]$$

是次数为 s 的齐次多项式, 并满足

$$f(x_1, \dots, x_d) \in \mathfrak{q}^{s+1},$$

那么 (III.Prop 9.2.15) 说明: f 的所有系数都落在 $\mathfrak{m}$ 中。把它翻成 associated graded 的语言, 就是说:

$$\alpha : (A/\mathfrak{m})[t_1, \dots, t_d] \longrightarrow G_{\mathfrak{q}}(A), \quad t_i \mapsto x_i \bmod \mathfrak{q}^2$$

在最低次数层面上没有“系数不在 $\mathfrak{m}$ 中”的非平凡齐次关系。换言之, 若某个齐次关系在 A 里成立到“高一阶”的程度, 那它在首项层面上只能是平凡的。

(III.Cor 9.2.16) 进一步说明: **参数系在剩余域上代数无关。**

若 $k \subset A$ 映到剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 同构, 且 $x_1, \dots, x_d$ 是 system of parameters, 则

$$x_1, \dots, x_d$$

对 k 代数无关。证明的核心正是把任意代数关系

$$f(x_1, \dots, x_d) = 0$$

拿出其最低次齐次部分 f_s , 再用 (III.Prop 9.2.15) 说明: 若 $f_s \neq 0$, 则其系数都应落在 $\mathfrak{m}$; 但系数本来在 k 中, 而 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 是同构, 只能推出 $f_s = 0$, 矛盾。

因此这一组命题的用途可以压成一条链:

$$\begin{aligned} \text{system of parameters} &\implies \text{parameter ideal} \\ &\implies \text{associated graded 中首项无低次关系} \\ &\implies \text{在系数域上代数无关.} \end{aligned}$$

这也正是 9.3 节把局部维数和 transcendence degree 联系起来时要用到的桥梁。

9.3 节正是沿着这条桥, 把局部维数和超越次数接起来。

设 A 是有限生成 k -代数整环, $K = \text{Frac}(A)$, $\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A$ 。书中先对局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 应用上面的参数系结论, 得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} \leq \text{tr. deg}(K | k).$$

这一步的核心就是：若 $x_1, \dots, x_d$ 是 $A_{\mathfrak{m}}$ 的一组参数，则它们在系数域上代数无关，因此参数个数 $d = \dim A_{\mathfrak{m}}$ 不会超过超越次数。

反向不等式则来自 Noether normalization。由 (III.Thm 4.3.1)，可取

$$t_1, \dots, t_d \in A$$

在 k 上代数无关，且 A 整于

$$B := k[t_1, \dots, t_d].$$

于是

$$\text{tr. deg}(K | k) = d.$$

再令 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} \cap B$ ，由 (III.Lem 9.3.1) 的整扩张局部维数比较，

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim B_{\mathfrak{n}}.$$

而 $B_{\mathfrak{n}}$ 是多项式环的局部化，所以

$$\dim B_{\mathfrak{n}} = d.$$

从而得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

因此 9.2 与 9.3 合起来，给出一条很完整的维数主线：

$$\begin{aligned} \dim A_{\mathfrak{m}} &= \delta(A_{\mathfrak{m}}) = d(A_{\mathfrak{m}}) \\ &\leq \text{tr. deg}(K | k) \quad (\text{由参数系代数无关}) \\ &\leq \dim A_{\mathfrak{m}} \quad (\text{由 Noether normalization} + \text{整扩张保维数}). \end{aligned}$$

最终便得到 (III.Thm 9.3.2)：

$$\dim A = \dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

这说明第 9 章前半并不是几段孤立技术，而是在把

$$\text{局部长度增长} \longrightarrow \text{局部维数} \longrightarrow \text{参数系} \longrightarrow \text{超越次数}$$

这一整条链逐步打通。

顺着这条主线看 (III.Thm 10.1.2)， $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$ 的直观意思是：在 $\mathfrak{m}$ -adic 的“首项世界”里， A 看起来就像一个没有额外关系的多项式环。

这里

$$G_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

虽然是一个无限直和，但

$$k[t_1, \dots, t_d]$$

作为分次环同样也是按次数分层的无限直和：

$$k[t_1, \dots, t_d] = \bigoplus_{n \geq 0} k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此定理说的不是“高次层消失了”，而是说每一层

$$\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

都恰好像多项式环的次数 n 齐次部分

$$k[t_1, \dots, t_d]_n,$$

并且层与层之间的乘法规则也完全一致。

若 A 是 regular local ring，取

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d), \quad d = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

则 x_i 在 associated graded 里的首项

$$\overline{x_i} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

就对应于多项式变量 t_i 。于是第 n 层中的典型元素

$$\overline{x_1}^{a_1} \cdots \overline{x_d}^{a_d}, \quad a_1 + \cdots + a_d = n,$$

正对应于多项式环中的次数 n 单项式

$$t_1^{a_1} \cdots t_d^{a_d}.$$

所以 regular 的本质是：极大理想的一阶信息 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 自由地产生了全部高阶首项信息，没有再冒出新的关系。

具体地看：

- 第 0 层是

$$A/\mathfrak{m} = k;$$

- 第 1 层是

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

它像 $kt_1 \oplus \cdots \oplus kt_d$;

- 第 2 层

$$\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$$

对应于所有二次单项式;

- 一般第 n 层

$$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此其维数满足

$$\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = \dim_k k[t_1, \dots, t_d]_n = \binom{n+d-1}{d-1}.$$

从这个角度看, (III.Thm 10.1.2) 其实是在说:

$$G_{\mathfrak{m}}(A) \cong \mathrm{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \cong k[t_1, \dots, t_d].$$

也就是说, regular local ring 在 tangent cone / associated graded 的层面上, 表现得像一个“光滑点附近”的局部模型。

2.10 Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理

两本书都把“拓扑群”的核心思想写得很清楚: 群结构与拓扑结构兼容以后, 很多全局拓扑性质都可压缩到单位元附近来检查。但它们各自服务的方向不同。

在 Algebra I 中, 拓扑群集中出现在 Infinite Galois theory 一节, 页码范围约为 PDF 第 38–42 页。

对应内容主线是:

- (I.Def 1.15.1) 定义拓扑群, 并立刻强调平移

$$L_a : G \rightarrow G$$

是同胚, 因此拓扑由单位元邻域基决定。

- (I.Lem 1.15.3) 说明: 子群带子空间拓扑后仍是拓扑群; 子群闭包仍是子群; 正规子群的闭包仍正规; 并且

$$G \text{ Hausdorff} \iff \{e\} \text{ closed}.$$

- (I.Lem 1.15.4) 进一步把“开/闭/有限指数”联系起来: 开子群必闭; 有限指数闭子群必开; 在紧情形下开子群也必有限指数。

- 随后立刻转入**逆极限与 pro-有限群**：逆系统的极限在拓扑群范畴中仍存在，有限离散群的逆极限称为 profinite group，并满足

$$\text{compact} + \text{Hausdorff} + \text{totally disconnected}.$$

- 最后把这些一般性质专门用于 **Krull topology**：无限 Galois 群

$$G = \text{Gal}(K/F)$$

的邻域基由开正规子群

$$\text{Gal}(K/E)$$

给出，并证明

$$G \simeq \varprojlim_E \text{Gal}(E/F),$$

从而 G 自动是 compact Hausdorff totally disconnected。

因此，Algebra I 中拓扑群的主要衍生方向是：

$$\begin{aligned} \text{topological groups} &\longrightarrow \text{profinite groups} \\ &\longrightarrow \text{Krull topology} \\ &\longrightarrow \text{infinite Galois theory.} \end{aligned}$$

在 Algebra III 中，拓扑群主要出现在 Chapter 8 的 **Topology and completion**，页码范围约为 PDF 第 65–68 页。

这里书上实际上收缩到了**拓扑阿贝尔群**，因为后面要服务于交换环与模的完备化。其主线是：

- 一开始就强调：对拓扑阿贝尔群 G ，平移

$$T_a : G \rightarrow G$$

是同胚，所以拓扑同样由 0 的邻域基唯一决定；并且

$$0 \text{ closed} \iff G \text{ Hausdorff}.$$

- (III.Lem 8.4.2) 抽出

$$H = \bigcap_{U \ni 0} U$$

这一“不可分辨部分”，说明 H 是子群， G/H Hausdorff，且

$$G \text{ Hausdorff} \iff H = 0.$$

- (III.Def 8.4.3) 用 Cauchy 列构造 completion

$$\widehat{G},$$

再由 (III.Lem 8.4.4) 得

$$\ker(G \rightarrow \widehat{G}) = \bigcap_{U \ni 0} U,$$

因而 Hausdorff 正好对应典范映射的单射性。

- 当拓扑由一系列开闭子群

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots$$

给出时, (III.Prop 8.4.5) 直接把 completion 写成

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n.$$

- (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 说明逆极限与完备化的正合性, 这一步随后立刻用于环与模。
- 再把一般拓扑群语言专门施加到

$$A \supset I \supset I^2 \supset \cdots, \quad M \supset IM \supset I^2M \supset \cdots$$

上, 得到 ***I*-adic topology**、**topological ring**、**topological module**、***I*-adic completion**。

因此, Algebra III 中拓扑群的主要衍生方向是:

$$\begin{aligned} \text{topological abelian groups} &\longrightarrow \text{completion} \\ &\longrightarrow \text{topological rings/modules} \\ &\longrightarrow I\text{-adic topology and completion.} \end{aligned}$$

两本书放在一起看, 可以得到一条非常清楚的对照:

- Algebra I 更强调**外部构造**: 从有限离散群的逆极限出发, 把无限 Galois 群理解成 profinite group。
- Algebra III 更强调**内部完备化**: 从单位元邻域基、Cauchy 条件与商群 G/G_n 出发, 把环与模的完备化写成逆极限。
- 前者最终结合的是 **Galois 对应**、**Krull 拓扑**、**profinite 几何**; 后者最终结合的是 **Artin-Rees**、***I*-adic completion**、**flatness**、**formal neighborhood**。
- 共同的技术骨架则是同一个:

$$\begin{aligned} \text{translation invariance} &\implies \text{neighborhood basis at the identity} \\ &\implies \text{inverse limit / completion.} \end{aligned}$$

2.11 Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义

(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理在几何上控制的是：沿闭子概形

$$V(I) \subset \operatorname{Spec} A$$

的无穷邻域里，子模 $N \subset M$ 与 I -adic 过滤如何相容。公式

$$I^n M \cap N = I^{n-k} (I^k M \cap N) \quad (n \gg 0)$$

说明这种相容性在高阶处会稳定下来，因此 N 上诱导的 I -adic 拓扑与它作为 M 的子对象所继承的子空间拓扑一致。几何上，这意味着 coherent sheaf 在形式邻域中的限制、子层与商层的完备化、以及短正合列经过 completion 后的正合性都可被统一控制；因此 Artin-Rees 是 formal neighborhood、formal completion 与 infinitesimal thickening 的基础技术。

(III.Thm 8.3.1) 的 local criterion of flatness 则把“平坦”拆成了闭纤维上的条件与各阶无穷小层次上的相容性。书中使用的 associated graded 记号是

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}, \quad G_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M,$$

而判据中的条件

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \xrightarrow{\sim} G_I(M)$$

表示 M 沿 $V(I)$ 的各阶厚化没有出现额外扭曲；换言之， M 在特殊纤维 A/I 上的行为，确实能按 I -adic 方向一致地延伸到所有 infinitesimal neighborhoods。于是 8.3 节在代数几何中的作用，就是把 flatness 的检验转化为：

- 先看闭子概形 $V(I)$ 上的模 M/IM 是否平坦；
- 再看 associated graded 是否与 I -adic 过滤严格匹配。

因此，Artin-Rees 与 8.3 节合起来提供了一条标准几何主线：

$$\begin{aligned} \text{closed subscheme } V(I) &\longrightarrow \text{infinitesimal thickenings} \\ &\longrightarrow \text{completion / formal neighborhood} \\ &\longrightarrow \text{flatness test.} \end{aligned}$$

它们也是 blow-up、normal cone、tangent cone 与 formal geometry 中反复出现的背景工具，因为这些对象本身就由 I^n/I^{n+1} 、 A/I^n 与由此得到的 filtered/graded 数据组织出来。

2.12 准素分解的适用范围与凝聚层视角

这一段最好把 (III.Thm 6.2.10) 与 (III.Cor 6.2.11) 分开理解, 否则很容易把“任意模”与“有限生成模”混在一起。

- **Thm 6.2.10** 先处理的是零子模。设 A 是 Noether 环, $M \neq 0$ 是任意 A -模。对每个

$$\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M),$$

书中构造一个 $\mathfrak{p}$ -primary submodule $Q(\mathfrak{p}) \subset M$, 使得

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}).$$

这一步并没有自动给出“有限个”准素子模; 只有当 $\text{Ass}(M)$ 有限时, 才得到通常意义下的有限准素分解。书上紧接着写出的 “In particular, if $\text{Ass}(M)$ is finite (e.g. M is finitely generated)” 正是这个意思。

- **Cor 6.2.11** 才推出有限生成模的任意子模可分解。若 M 是 Noether 环上的有限生成模, $N \subset M$, 则 M/N 仍有限生成, 于是

$$\text{Ass}(M/N)$$

是有限集; 对商模 M/N 应用 Thm 6.2.10, 就得到

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$$

的有限准素分解。因此在 Noether 环上, “任意子模都可做准素分解” 真正成立的对象是有限生成模的子模, 而不是任意模的任意子模。

- 所以 Noether 环上的一般模, 失败点主要在有限性。对一般 A -模 M , 即使 A Noether, 也可能出现

$$\text{Ass}(M)$$

或

$$\text{Ass}(M/N)$$

无穷, 从而只能写成无穷交

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}),$$

但这通常不再称为有限 primary decomposition。也就是说, 书中理论并不是对“任意模”完全失效, 而是失去了几何上最有用的有限控制。

- 环若不是 Noether, 情况会更差。这时 associated primes 可能不存在良好的有限性, 极小素理想也未必有限, 子模链缺少 ACC, 很多准素分解定理都会失效。通常需要额外加入 Laskerian、weakly Laskerian、coherent、finite type 等条件, 或者改研究较弱的分解, 例如只追踪根理想、支撑或 radical decomposition。因而“非 Noether 情形有一套统一的 primary decomposition 理论”并不准确; 更常见的是按附加假设分别处理。
- Artin 环上的理想分解是一个特别整齐的特例。若 A 是 Artin 环, 则所有素理想都是极大理想, 因此彼此不可比。对任意理想 $I \subset A$, 商环 A/I 仍是 Artin 环, 所以 $\text{Ass}(A/I)$ 中出现的素理想全都是极小元; 于是最小准素分解里出现的根理想集合没有“嵌入素理想”的歧义, 本身就是唯一的。更进一步, 若

$$\text{Ass}(A/I) = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\},$$

则 I 可唯一写成各个 $\mathfrak{m}_i$ -primary ideal 的交; 等价地, 这正对应于 Artin 环按局部因子

$$A \simeq \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}$$

的分解。

从几何上看, 真正的转向不是“放弃模而改用层”, 而是把有限生成模的局部化组织成 sheaf, 这样既保留有限性, 又能在不同开集上拼接。

- 对任意环 A 与任意 A -模 M , 在

$$X = \text{Spec } A$$

上都可构造拟凝聚层 $\widetilde{M}$ 。在基本开集 $D(f)$ 上,

$$\widetilde{M}(D(f)) = M_f,$$

所以 sheaf 的本质就是把“对每个素理想做局部化”系统地组织起来。

- 当 A 是 Noether 环且 M 有限生成时, $\widetilde{M}$ 是凝聚层 (coherent sheaf)。在局部 Noether 概形上, 凝聚层正是几何里对应“有限生成模”的对象: 它对局部化稳定, 并且在核、余核、扩张下封闭, 因此适合做闭子概形、理想层、有限型模等几何构造。
- 在仿射情形 $X = \text{Spec } A$ 上, 有限生成 A -模与 X 上的凝聚层一一对应; 有限生成子模则对应凝聚子层。因此代数里的准素分解结果可以在每个仿射开集上局部使用, 再转译成对支撑、associated points、不可约分支以及理想层的描述。

- 这也解释了为什么几何里强调的是 locally Noetherian schemes 上的 coherent sheaves: 目标不是给任意模做一个全局有限分解, 而是保证**每个足够小的仿射开集上都回到 Noether 环上的有限生成模**, 从而可以使用局部代数工具, 再把结果沿层的限制映射粘起来。

因此, 更准确的主线是:

Noether 环 + 有限生成模 $\longrightarrow$ 有限准素分解,

locally Noetherian scheme + coherent sheaf $\longrightarrow$ 局部有限控制与可粘合的几何对象.

而在非 Noether 情形下, 往往只能保留部分信息, 例如根理想、支撑、associated points 的替代版本, 或在额外有限性假设下恢复某种分解。

3 题目整理

这里记录经典题目、常用方法，以及做错后值得保留的修正思路。

3.1 商模的 associated primes 与 support 计算例题

题目 3.1. 令

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

求 $\text{Spec } A$ 的典型结构，并计算 $\text{Ass}_A(M)$ 与 $\text{Supp}(M)$ 。

解答要点：

首先， $\text{Spec } k[x, y]$ 不必理解成一个“可完全枚举的列表”，它就是 $k[x, y]$ 的全体素理想所成的集合。由于 $k[x, y]$ 是二维 UFD，其素理想按高度可分成三类：

$$(0), \quad (f) \text{ 其中 } f \text{ 不可约}, \quad \mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A.$$

若 k 代数闭，则极大理想都形如

$$(x - a, y - b) \quad (a, b \in k).$$

对模 $M = A/(x^2, xy)$ ，先算 associated primes。记 x, y 在 M 中的像仍为 x, y 。则

$$\text{ann}_A(y) = (x),$$

因为 $fy \in (x^2, xy)$ 当且仅当 $f \in (x)$ ；故

$$(x) \in \text{Ass}_A(M).$$

另一方面，

$$\text{ann}_A(x) = (x, y),$$

故

$$(x, y) \in \text{Ass}_A(M).$$

而在辨析 1.9 已构造出 prime filtration

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其商分别同构于

$$Ax \cong A/(x, y), \quad M/Ax \cong A/(x).$$

因此由 (III.Lem 6.1.9) 可知

$$\text{Ass}_A(M) \subseteq \{(x), (x, y)\}.$$

综合两边包含, 得到

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\}.$$

再算 support。因为 M 有限生成, 由 (III.Thm 6.1.6) 前使用的标准事实,

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

这里

$$\text{Ann}(M) = \text{ann}(1 \bmod (x^2, xy)) = (x^2, xy) = x(x, y),$$

所以

$$\text{Supp}(M) = V(x^2, xy).$$

又因为

$$\sqrt{(x^2, xy)} = (x),$$

故

$$V(x^2, xy) = V(x).$$

因此

$$\text{Supp}(M) = V(x) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid x \in \mathfrak{p}\}.$$

这也确实包含

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\},$$

与 (III.Thm 6.1.6) 一致。

3.2 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式

题目 3.2. 设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态, M 是有限生成 A -模。证明

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)),$$

其中

$$f^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A, \quad \mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A.$$

解答要点:

取任意 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$, 记

$$\mathfrak{p} = f^*(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap A.$$

要证的就是

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0 \iff M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

首先有标准同构

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_A M \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}.$$

最后一个同构的原因是：\$A \setminus \mathfrak{p}\$ 中元素在 \$B_{\mathfrak{q}}\$ 里的像都变成单位，因此 \$A \rightarrow B_{\mathfrak{q}}\$ 由局部化泛性质唯一分解为

$$A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}},$$

而

$$M_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}} \otimes_A M.$$

于是由张量积结合律得到所需改写。

若 \$M_{\mathfrak{p}} = 0\$，则显然

$$B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0.$$

反过来，若 \$M_{\mathfrak{p}} \neq 0\$，则因 \$M\$ 有限生成，\$M_{\mathfrak{p}}\$ 是局部环 \$A_{\mathfrak{p}}\$ 上有限生成模。由 Nakayama 引理，

$$M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

设

$$k(\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}), \quad k(\mathfrak{q}) = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}.$$

则 \$k(\mathfrak{q})\$ 是 \$k(\mathfrak{p})\$ 的域扩张，并且

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{q}}} k(\mathfrak{q}) \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{q}) \cong (M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}}) \otimes_{k(\mathfrak{p})} k(\mathfrak{q}).$$

右端是非零向量空间对域扩张做张量，因此仍非零。故

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0.$$

综上，

$$\mathfrak{q} \in \text{Supp}_B(B \otimes_A M) \iff f^*(\mathfrak{q}) \in \text{Supp}_A(M),$$

也就是

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)).$$

这里有限生成性只用在一处：为了对 \$M_{\mathfrak{p}}\$ 应用 Nakayama，引出

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \Rightarrow M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

3.3 自由模之间单射与满射的秩比较

题目 3.3. 设 A 是交换环, 且

$$f: A^m \rightarrow A^n$$

是 A -模同态。证明:

- 若 f 满射, 则 $m \geq n$;
- 若 f 单射, 则 $m \leq n$ 。

解答:

若 f 满射, 则对任意极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$ 局部化后仍满射:

$$f_{\mathfrak{m}}: A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n.$$

再模去 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$, 得到剩余域 $k(\mathfrak{m})$ 上的满射

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n.$$

有限维向量空间之间满射必满足维数不减, 因此

$$m \geq n.$$

若 f 单射, 令 $C = \text{coker}(f)$, 则有短正合列

$$0 \rightarrow A^m \rightarrow A^n \rightarrow C \rightarrow 0.$$

局部化得

$$0 \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

再对其张量剩余域 $k(\mathfrak{m})$, 得到右正合列

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

于是

$$n = \dim_{k(\mathfrak{m})} k(\mathfrak{m})^n \geq \dim_{k(\mathfrak{m})} \text{Im}(k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n) \geq m,$$

故

$$m \leq n.$$

因此在交换环语境下, 自由模之间的满射与单射分别给出

$$A^m \twoheadrightarrow A^n \Rightarrow m \geq n, \quad A^m \hookrightarrow A^n \Rightarrow m \leq n.$$

补充一句: 若 A 是一般环, 上述结论需要 A 至少满足 IBN (invariant basis number) 一类条件; 否则可能出现 $A^m \simeq A^n$ 但 $m \neq n$ 。

3.4 局部环上矩阵环的阶数与底环由同构决定

题目 3.4. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 116, Section 3.4, Exercise 6)

Use Theorem 3.6 to prove that if $R^{(1)}$ and $R^{(2)}$ are local rings and n_1, n_2 are positive integers such that

$$M_{n_1}(R^{(1)}) \cong M_{n_2}(R^{(2)}),$$

then

$$n_1 = n_2, \quad R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

解答:

记

$$S_i := M_{n_i}(R^{(i)}) \quad (i = 1, 2).$$

在 S_i 中取标准矩阵幂等元

$$e_1^{(i)}, \dots, e_{n_i}^{(i)}.$$

作为右 S_i -模, 正则模有直和分解

$$(S_i)_{S_i} = e_1^{(i)} S_i \oplus \dots \oplus e_{n_i}^{(i)} S_i.$$

每个 $e_a^{(i)} S_i$ 的自同态环为

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)} S_i) \cong e_a^{(i)} S_i e_a^{(i)} \cong R^{(i)}.$$

因为 $R^{(i)}$ 是 local ring, 所以

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)} S_i)$$

也是 local ring; 因此每个 $e_a^{(i)} S_i$ 都是 strongly indecomposable。

设

$$\varphi: S_1 \xrightarrow{\sim} S_2$$

是题设给出的环同构。借助 φ , 可以把 $(S_2)_{S_2}$ 看成右 S_1 -模; 同时正则模同构给出

$$(S_1)_{S_1} \cong (S_2)_{S_2}.$$

于是同一个模有两种有限直和分解:

$$(S_1)_{S_1} = \bigoplus_{a=1}^{n_1} e_a^{(1)} S_1, \quad (S_2)_{S_2} = \bigoplus_{b=1}^{n_2} e_b^{(2)} S_2,$$

且各直和项都是 strongly indecomposable。由 Jacobson II 的 Theorem 3.6 (Krull-Schmidt 唯一性形式) 可得

$$n_1 = n_2,$$

并且经过适当重排后

$$e_a^{(1)} S_1 \cong e_a^{(2)} S_2$$

作为对应的右模同构。

最后比较同构直和项的自同态环：

$$R^{(1)} \cong \text{End}_{(S_1)^{\text{op}}}(e_a^{(1)} S_1) \cong \text{End}_{(S_2)^{\text{op}}}(e_a^{(2)} S_2) \cong R^{(2)}.$$

因此

$$n_1 = n_2, \quad R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

方法要点：矩阵环本身先被分解成 n 个由标准幂等元切出的右理想；local 性保证这些右理想 strongly indecomposable；然后 Theorem 3.6 强迫分量个数和分量自同态环都保持不变。

辨析 3.1 (左理想与右理想的自同态环差一个反环)。这里必须注意左右模约定。对任意含么环 A 与幂等元 $e^2 = e$ ，有两条标准公式：

$$\text{End}_A(Ae) \cong (eAe)^{\text{op}}, \quad \text{End}_{A^{\text{op}}}(eA) \cong eAe.$$

前者把 Ae 视为左 A -模，后者等价于把 eA 视为右 A -模。

先看左模 Ae 。任意左 A -模同态

$$f: Ae \rightarrow Ae$$

由 $f(e)$ 唯一决定，因为

$$f(ae) = af(e).$$

又

$$f(e) = f(e^2) = ef(e),$$

所以 $f(e) \in eAe$ 。反过来，任取 $x \in eAe$ ，公式

$$f_x(ae) := ax$$

给出一个左 A -模自同态 $Ae \rightarrow Ae$ 。于是作为集合有

$$\text{End}_A(Ae) \leftrightarrow eAe, \quad f \mapsto f(e).$$

但乘法方向会反过来：若 $f_x(e) = x$ 、 $f_y(e) = y$ ，则

$$(f_x \circ f_y)(e) = f_x(y) = yx.$$

所以

$$\text{End}_A(Ae) \cong (eAe)^{\text{op}}.$$

而对右模 eA , 右 A -线性自同态同样由 $f(e) \in eAe$ 决定; 若 $f_x(e) = x, f_y(e) = y$, 则

$$(f_x \circ f_y)(e) = f_x(y) = xy,$$

此时乘法方向不反, 所以

$$\text{End}_{A^{\text{op}}}(eA) \cong eAe.$$

本题证明中使用的是右 S_i -模

$$e_a^{(i)} S_i,$$

因此得到的是

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)} S_i) \cong e_a^{(i)} S_i e_a^{(i)} \cong R^{(i)},$$

没有反环。如果改用左 S_i -模 $S_i e_a^{(i)}$, 则会得到

$$\text{End}_{S_i}(S_i e_a^{(i)}) \cong (e_a^{(i)} S_i e_a^{(i)})^{\text{op}} \cong (R^{(i)})^{\text{op}}.$$

这不会影响结论, 因为 R local 当且仅当 R^{op} local, 并且

$$(R^{(1)})^{\text{op}} \cong (R^{(2)})^{\text{op}} \implies R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

3.5 全自同态环作用下的不可约性与 Schur 引理逆命题

题目 3.5. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 122, Section 3.5, Exercises 1–2)

题目 1. Let M be a finite dimensional left vector space over a field F . Show that M , regarded as a right module for

$$R = \text{End}_F(M)$$

in the natural way, is irreducible. Does this hold if F is replaced by a division ring? Does it hold if the finiteness condition is dropped?

解答: 设 $0 \neq N \subset M$ 是右 R -子模。取 $0 \neq v \in N$ 。对任意 $w \in M$, 都可以构造一个 F -线性自同态 $T \in \text{End}_F(M)$ 使得

$$T(v) = w.$$

有限维时, 只需把 v 扩成一组基, 再规定 T 在这组基上的值; 无限维时同样可用基扩张完成构造。因此

$$w = T(v) = vT \in N.$$

由于 w 任意, $N = M$ 。所以 M_R 是不可约模。

若 F 换成 division ring, 同样成立; 证明只需把“向量空间”理解为 division ring 上的左向量空间, 线性映射仍可由基上的取值决定。有限维条件也可以去掉。

题目 2. Let M be the vector space with basis e_1, e_2 over a field F . Let R' be the set of linear transformations a of M such that

$$a(e_1) = \alpha e_1, \quad a(e_2) = \beta e_1 + \gamma e_2, \quad \alpha, \beta, \gamma \in F.$$

Show that R' is a ring of endomorphisms and that if M is regarded in the natural way as a right R' -module, then M is not irreducible. Show that $\text{End}_{R'}(M)$ is the field consisting of the scalar multiplications $x \mapsto \lambda x$. This example shows that the converse of Schur's lemma does not hold.

解答: 在基 e_1, e_2 下, R' 正是所有上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma \in F.$$

上三角矩阵对加法、乘法封闭, 并含有恒等变换, 所以 $R' \subset \text{End}_F(M)$ 是子环。

由于

$$a(e_1) = \alpha e_1$$

对所有 $a \in R'$ 都成立, 一维子空间

$$Fe_1 \subset M$$

在右 R' -作用下稳定。因此 $M_{R'}$ 有非零真子模 Fe_1 , 不是不可约模。

现在计算 $\text{End}_{R'}(M)$ 。一个右 R' -模自同态就是一个与所有 R' 中元素可交换的 F -线性变换。设

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

因为 T 与

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in R'$$

交换, 直接比较 $TE_{11} = E_{11}T$ 得

$$b = c = 0.$$

因此 $T = \text{diag}(a, d)$ 。再令

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in R',$$

由 $TE_{12} = E_{12}T$ 得

$$a = d.$$

所以

$$T = aI.$$

反过来, 任意标量乘法当然与 R' 中所有变换可交换。因此

$$\text{End}_{R'}(M) \cong F.$$

这说明: $\text{End}_{R'}(M)$ 是除环并不能推出 M 不可约; Schur 引理只给出

$$M \text{ irreducible} \implies \text{End}_{R'}(M) \text{ is a division ring,}$$

其逆命题一般不成立。

3.6 满射自由模自同态的可逆性

题目 3.6. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 174, Section 3.4, Exercise 4)

Let R be commutative. Show that if η is a surjective endomorphism of $R^{(n)}$, then η is bijective. Does the same conclusion hold if η is injective?

解答:

(1) 满射情形。 η 在标准基下由矩阵 $A \in M_n(R)$ 表示。设 $e_1, \dots, e_n$ 是标准基。由于 η 满射, 对每个 j 可选取 $v_j \in R^{(n)}$ 使得

$$Av_j = e_j.$$

以 $v_1, \dots, v_n$ 为列构成矩阵 B , 便有

$$AB = I_n.$$

因为 R 是交换环, 可取行列式:

$$\det(A) \det(B) = \det(AB) = 1.$$

所以 $\det(A)$ 是 R 中的单位。由伴随矩阵公式

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A)A = \det(A)I_n,$$

知

$$A^{-1} = \det(A)^{-1} \text{adj}(A)$$

存在, 因而 η 是可逆的, 也就是双射。

(2) 单射并不足以推出满射。取

$$R = k[t], \quad n = 1, \quad \eta: R \longrightarrow R, \quad f(t) \longmapsto tf(t).$$

由于 $k[t]$ 是整环, $tf(t) = 0$ 蕴含 $f(t) = 0$, 所以 η 是单射; 但 $1 \notin tR$, 故 η 不满射。因此

$$\text{满射} \implies \text{双射}, \quad \text{单射} \not\implies \text{双射}.$$

3.7 高斯整数上的有限生成模结构

题目 3.7. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 188, Section 3.8, Exercise 2)

令 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i]$, 且 $K \subset D^{(3)}$ 由

$$f_1 = (1, 3, 6), \quad f_2 = (2 + 3i, -3i, 12 - 18i), \quad f_3 = (2 - 3i, 6 + 9i, -18i)$$

生成。求

$$M = D^{(3)}/K$$

的结构, 并说明它是有限模, 其阶为 352512。

解答:

把 f_1, f_2, f_3 作为列向量, 得到矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 + 3i & 2 - 3i \\ 3 & -3i & 6 + 9i \\ 6 & 12 - 18i & -18i \end{pmatrix}.$$

由于 $D = \mathbb{Z}[i]$ 是 Euclidean domain, 故可在 D 上取 Smith 标准形。记 Δ_r 为所有 r 阶子式的最大公因子, 则不变因子满足

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_1 d_2 = \Delta_2, \quad d_1 d_2 d_3 = \Delta_3.$$

矩阵中已有元素 1, 故

$$\Delta_1 = 1.$$

二阶子式为

$$\begin{aligned} & -6 - 12i, \quad 18i, \quad -6 + 42i, \quad -36i, \quad -12, \\ & 84 + 36i, \quad 36 - 36i, \quad -36 - 108i, \quad -288, \end{aligned}$$

它们在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的最大公因子与 6 相伴, 所以可取

$$\Delta_2 = 6.$$

又

$$\det A = -576 + 144i.$$

因此可取

$$d_1 = 1, \quad d_2 = 6, \quad d_3 = \frac{-576 + 144i}{6} = -96 + 24i.$$

忽略单位因子后,

$$M \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i).$$

最后用范数验证阶数。对非零 $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$, 有

$$|D/(\alpha)| = N(\alpha) = a^2 + b^2.$$

于是

$$|M| = N(6) N(-96 + 24i) = 36(96^2 + 24^2) = 36 \cdot 9792 = 352512.$$

这也说明 M 是有限 D -模。

3.8 超越单扩张的真中间域

题目 3.8. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 8)

设

$$E = F(u), \quad u \text{ 超越于 } F,$$

且 K 是扩张 E/F 的一个中间域。证明: u 关于 K 代数。

解答:

若 $u \in K$, 则 u 关于 K 满足一次方程

$$X - u = 0,$$

结论显然成立。以下设 $u \notin K$ 。

取任意 $a \in K \setminus F$ 。由于 $E = F(u)$, 可写成

$$a = \frac{f(u)}{g(u)},$$

其中 $f, g \in F[X]$, $g \neq 0$, 且该分式不是常数。于是 u 满足

$$f(X) - ag(X) = 0.$$

这是一个系数在 K 中的非常数多项式: 若它在 $K[X]$ 中为零多项式, 则比较 X 的各项系数使得 $a \in F$, 矛盾。因此 u 关于 K 代数。

也就是说, 纯超越扩张 $F(u)/F$ 的任一真中间域 K 都使得上层元素 u 反而变成 K 上的代数元。

3.9 中间域全序条件下有限扩张的原始元

题目 3.9. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 9)

设 E/F 是域扩张, 满足:

- $[E : F] < \infty$;
- 任意两个含 F 的子域 $E_1, E_2 \subseteq E$ 都可比较, 即

$$E_1 \subseteq E_2 \quad \text{或} \quad E_2 \subseteq E_1.$$

证明: E/F 有原始元。

解答:

若 $E = F$ 则无事可证。以下设 $E \neq F$ 。在所有真中间域里取一个极大者 K ; 由于子域按包含全序排列, 这个极大者也就是唯一的最大真中间域。

任取 $\alpha \in E \setminus K$ 。则

$$F(\alpha) \not\subseteq K,$$

而子域全序迫使

$$K \subseteq F(\alpha).$$

于是

$$F \subsetneq K \subseteq F(\alpha) \subseteq E.$$

但 K 是最大真中间域, 所以只能有

$$F(\alpha) = E.$$

故 α 就是 E/F 的一个原始元。

换句话说, 这个条件说明中间域格是一条有限链; 因此只要取一个不在最大真中间域中的元素, 它立刻生成整个扩张。

辨析 3.2. 相关知识点: 该题中的条件 $[E : F] < \infty$ 不能省去。

反例正是上一题的纯超越单扩张

$$E = F(u).$$

它本身满足“任意两个含 F 的中间域都可比较”这一链条件, 例如

$$F(u) \supset F(u^2) \supset F(u^4) \supset \dots$$

是一条可比较链; 更重要的是, 对任意真中间域 $K \subsetneq F(u)$, 上一题已经说明 u 关于 K 代数, 因此不可能有

$$K = F(v) \quad \text{且} \quad u \in K(v) = K$$

来直接在一般情形下套用“原始元”式结论。

更本质地说, 没有有限性条件时, 中间域链可以无限下降, 而本题证明里“取最大真中间域 K ”这一步就未必成立; 因此第一个条件正是保证该论证可行的关键。

3.10 有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界

题目 3.10. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 228, Section 4.3, Exercise 5)

设 E/F 是有限扩张, 且

$$[E : F] = n < \infty.$$

又设 K/F 是任意扩张域。证明: E/F 到 K/F 的 monomorphism 个数不超过 n 。

解答:

这里的 monomorphism of E/F into K/F 指固定 F 的域嵌入

$$\sigma : E \hookrightarrow K.$$

记这类嵌入的集合为 $\text{Hom}_F(E, K)$ 。要证

$$\#\text{Hom}_F(E, K) \leq [E : F].$$

对 $n = [E : F]$ 归纳。若 $n = 1$, 则 $E = F$, 固定 F 的嵌入只有一个, 结论成立。

设 $n > 1$ 。取 $u \in E \setminus F$, 令

$$L = F(u), \quad d = [L : F].$$

则 $d > 1$, 且

$$[E : L] = \frac{n}{d} < n.$$

设 $m_u(x) \in F[x]$ 是 u 在 F 上的最小多项式。任意

$$\sigma \in \text{Hom}_F(E, K)$$

限制到 L 后由 $\sigma(u)$ 唯一决定, 而 $\sigma(u)$ 必须是 $m_u(x)$ 在 K 中的一个根。因此

$$\#\text{Hom}_F(L, K) \leq d.$$

现在固定一个 F -嵌入

$$\tau : L \hookrightarrow K.$$

把 K 通过 τ 看成 L -扩张域。由归纳假设应用于有限扩张 E/L , 可知把 τ 延拓到 E 的嵌入个数至多为

$$[E : L] = \frac{n}{d}.$$

于是所有 F -嵌入 $E \hookrightarrow K$ 先按其在 L 上的限制分类, 得到

$$\# \operatorname{Hom}_F(E, K) \leq d \cdot \frac{n}{d} = n.$$

这正是 Theorem 4.4 证明中“先数 $F(u)$ 的嵌入, 再数每个嵌入的延拓”的方法, 只是不要求 K 是分裂域, 也不要求等号成立。

3.11 Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形

题目 3.11. 分别给出或判定下列类型的环:

1. left Noetherian 但不是 right Noetherian;
2. Noetherian 但不是 Artinian;
3. Artinian 但不是 Noetherian;
4. 既不是 Noetherian 也不是 Artinian。

解答:

1. (出处: *Cartan-Eilenberg*, Chapter I, §7, p. 16) 令

$$A = \mathbb{Z}\langle x, y \rangle / (yx, y^2), \quad F = \mathbb{Z}[x].$$

每个元素唯一写成 $f + gy$ ($f, g \in F$), 故 $A = F \oplus Fy$ 是有限生成左 F -模; 由 F Noether 可知 A left Noetherian。另一方面

$$I = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbb{Z}x^n y$$

是右理想, 且 $Ix = Iy = 0$ 。右乘无法产生更高次的 $x^n y$, 所以 I 不是有限生成右 A -模; 因此 A 不是 right Noetherian。

2. 取 $A = k[t]$ 。它是 PID, 故 Noetherian; 但

$$(t) \supsetneq (t^2) \supsetneq (t^3) \supsetneq \cdots$$

不稳定, 故不是 Artinian。这也与 (III.Thm 5.3.8) 一致: $\dim k[t] = 1 \neq 0$ 。

3. 不存在 (此处 Artinian 与 Noetherian 取同一侧的通常约定)。Hopkins-Levitzki 定理给出: 任一左 Artinian 环必左 Noetherian。

在本书的交换环语境中, (III.Thm 5.3.8) 直接给出

$$A \text{ Artinian} \implies A \text{ Noetherian}.$$

4. 取无限变量多项式环

$$A = k[x_1, x_2, x_3, \dots].$$

升链

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \dots$$

说明它不是 Noetherian; 降链

$$(x_1) \supsetneq (x_1^2) \supsetneq (x_1^3) \supsetneq \dots$$

说明它也不是 Artinian。

3.12 p -polynomial 的等价刻画: 根构成加法群的 monic 多项式

题目 3.12. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 234, Section 4.4, Exercise 3)

设 F 是特征 p 的域。 $F[x]$ 中的多项式 $f(x)$ 称为 p -polynomial, 若它具有形式

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \dots + a_m x,$$

即形如 x^{p^k} 的 F -线性组合。证明: 一个正次数的首一多项式是 p -polynomial 当且仅当其所有根构成分裂域加法群的一个有限子群, 且每个根的重数都相同, 同为某个 p^e 。

证明. (1) 必要性 ($\Rightarrow$): p -polynomial 的根构成加法子群。

设

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \dots + a_m x \in F[x]$$

是 p -polynomial。注意 $f(0) = 0$ 且 $f(x)$ 没有常数项。

在特征 p 下, $(x+y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k}$ (Freshman's dream), 且对任意 $c \in F$ 有 $(cx)^{p^k} = c^{p^k} x^{p^k}$ 。因此

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (\forall x, y),$$

即 $f(x)$ 作为从分裂域到自身的映射是加法群同态。于是:

- 若 r_1, r_2 是 f 的根, 则 $f(r_1 + r_2) = f(r_1) + f(r_2) = 0$, 和仍是根;
- 若 r 是根, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}$, $f(nr) = nf(r) = 0$, 整数倍仍在根集中。

特别地, 根集在 $\mathbb{F}_p$ -标量乘法下封闭, 故构成分裂域加法群的有限子群 (且是 $\mathbb{F}_p$ -向量空间)。

再处理重数。若 $a_m \neq 0$, 则 $f'(x) = a_m$ 是非零常数, 由 (§4.4, Thm 4.5) 知 $(f, f') = 1$, 故 f 的所有根都是单根, 重数为 $p^0 = 1$ 。

若 $a_m = a_{m-1} = \cdots = a_{m-k+1} = 0$ 而 $a_{m-k} \neq 0$ ($k \geq 1$), 则

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_{m-k} x^{p^k} = g(x)^{p^k},$$

其中

$$g(x) = x^{p^{m-k}} + a_1 x^{p^{m-k-1}} + \cdots + a_{m-k} x$$

仍是 p -polynomial 且 $g'(x) = a_{m-k} \neq 0$, 故 g 可分的。在分裂域中, 若 $\{\beta_j\}$ 是 g 的单根集, 则

$$f(x) = g(x)^{p^k} = \prod_j (x^{p^k} - \beta_j) = \prod_j (x - \gamma_j)^{p^k},$$

其中 $\gamma_j^{p^k} = \beta_j$ (在特征 p 下 $x^{p^k} - \beta_j$ 在分裂域中有唯一根, 因为 $x \mapsto x^{p^k}$ 是单射且分裂域含有所需的根)。因此 f 的每个根的重数恰为 p^k , 且全体相同。

综上, 任何 p -polynomial 的根集是有限加法子群, 且每个根的重数相同 (为某个 p^e)。

(2) 充分性 ($\Leftarrow$): 根构成加法子群 $\Rightarrow$ 是 p -polynomial。

设 $f(x) \in F[x]$ 是正次数首一多项式, E 是其分裂域。记 $V \subseteq E$ 为 $f(x)$ 的互异根集。由假设:

- V 是 $(E, +)$ 的有限子群;
- 每个根的重数为 p^e ($e \geq 0$)。

由于 $\text{char } F = p$, 有限加法群 V 自动是 $\mathbb{F}_p$ -向量空间。设

$$\dim_{\mathbb{F}_p} V = m,$$

则 $|V| = p^m$ 。

令

$$g(x) = \prod_{v \in V} (x - v) \in E[x].$$

则 $\deg g = p^m$, 且 V 恰为 $g(x)$ 的单根集。因为任一 F -嵌入把 V 映到自身, 故 $g(x)$ 的系数在 Galois 群作用下不变 (若 F 非完备, 则考虑可分闭包中的对应作用), 从而 $g(x) \in F[x]$ 。

由重数条件,

$$f(x) = g(x)^{p^e}.$$

若能证明 $g(x)$ 是 p -polynomial 且一次项系数非零, 则

$$f(x) = (x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x)^{p^e} = x^{p^{m+e}} + a_1^{p^e} x^{p^{m+e-1}} + \cdots + a_m^{p^e} x^{p^e},$$

它仍是 p -polynomial (最后 e 个系数为零)。

用 Moore 行列式证明 $g(x)$ 是 p -polynomial。

取 V 的一组 $\mathbb{F}_p$ -基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。考虑 $(m+1) \times (m+1)$ 行列式:

$$\Delta(x) = \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_m & x \\ \alpha_1^p & \alpha_2^p & \cdots & \alpha_m^p & x^p \\ \alpha_1^{p^2} & \alpha_2^{p^2} & \cdots & \alpha_m^{p^2} & x^{p^2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1^{p^m} & \alpha_2^{p^m} & \cdots & \alpha_m^{p^m} & x^{p^m} \end{pmatrix}.$$

沿最后一列展开:

$$\Delta(x) = c_0 x + c_1 x^p + c_2 x^{p^2} + \cdots + c_m x^{p^m},$$

其中

$$c_m = \det(\alpha_j^{p^i})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 0 \leq i \leq m-1}}$$

是 $\{\alpha_j\}$ 的 **Moore 行列式**。Moore 行列式非零当且仅当 $\{\alpha_j\}$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上线性无关——这正是基的条件, 故 $c_m \neq 0$ 。

类似地,

$$c_0 = \det(\alpha_j^{p^i})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq m}}$$

也是 Moore 行列式 (行取 $p^1, \dots, p^m$), 同样非零。

关键观察: 对任意 $v = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \in V$ ($\lambda_j \in \mathbb{F}_p$),

$$v^{p^k} = \left(\sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \right)^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j^{p^k} \alpha_j^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j^{p^k} \quad (\because \lambda_j \in \mathbb{F}_p \Rightarrow \lambda_j^{p^k} = \lambda_j).$$

于是当 $x = v$ 时, $\Delta(x)$ 的最后一列是前 m 列的 $\mathbb{F}_p$ -线性组合, 行列式为零:

$$\Delta(v) = 0 \quad (\forall v \in V).$$

而 $\deg \Delta(x) = p^m = |V|$, 且 $\Delta'(x) = c_0 \neq 0$, 故 $\Delta(x)$ 恰以 V 为单根集。归一化得

$$g(x) = \frac{\Delta(x)}{c_m} = x^{p^m} + \frac{c_{m-1}}{c_m} x^{p^{m-1}} + \cdots + \frac{c_0}{c_m} x,$$

它是 $F[x]$ 中的首一 p -polynomial, 且一次项系数 $c_0/c_m \neq 0$ 。

因此 $f(x) = g(x)^{p^e}$ 也是 p -polynomial。 □

注: 本题与 Section 4.4 的 Exercise 2 紧密衔接: Exercise 2 说明不可约多项式在特征 p 下每个根的重数相同; 本题则进一步刻画了“根集是加法群”这一条件恰好对应 p -polynomial。Moore 行列式在这里扮演的角色, 可类比为 Vandermonde 行列式在普通多项式插值中的角色——它把 $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构转化成了 x^{p^k} 的线性组合。

3.13 纯不可分二项式的不可约性

题目 3.13. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, Section 4.4, Exercise 4)

设 F 是特征 $p > 0$ 的不完美域, 取 $a \in F \setminus F^p$. 证明对每个 $e = 0, 1, 2, \dots$,

$$X^{p^e} - a$$

在 $F[X]$ 中不可约。

解答:

当 $e = 0$ 时, 多项式为 $X - a$, 显然不可约。以下设 $e \geq 1$, 在代数闭包中取 α 满足 $\alpha^{p^e} = a$ 。特征 p 下

$$X^{p^e} - a = (X - \alpha)^{p^e},$$

故 α 的最小多项式 $m_\alpha(X)$ 的全部根都等于 α 。又 $\alpha \notin F$, 否则 $a = \alpha^{p^e} \in F^p$ 。

对特征 p 下的不可约多项式反复提出 p 次幂, 可写成

$$m_\alpha(X) = g(X^{p^r}), \quad g'(X) \neq 0,$$

其中 g 仍不可约。由于 m_α 只有根 α , g 只有根 α^{p^r} ; 但 $g' \neq 0$ 意味着 g 可分, 故 g 只能一次。因此

$$m_\alpha(X) = X^{p^r} - b, \quad b = \alpha^{p^r} \in F.$$

又 $m_\alpha \mid X^{p^e} - a$, 所以 $r \leq e$, 并且

$$a = \alpha^{p^e} = b^{p^{e-r}}.$$

若 $r < e$, 便有 $a \in F^p$, 与选择 $a \notin F^p$ 矛盾; 故 $r = e$, 从而

$$m_\alpha(X) = X^{p^e} - a.$$

这正说明该多项式不可约。

要点: 不完美性只用于保证 $F \setminus F^p \neq \emptyset$; 一旦给定 $a \notin F^p$, 结论只依赖于这一条件。该扩张是次数 p^e 的纯不可分扩张, 且在代数闭包中只有一个根 α , 重数为 p^e 。

3.14 有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域

题目 3.14. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 243, Section 4.5, Exercise 8)

设 $E = (\mathbb{Z}/(p))(t) = \mathbb{F}_p(t)$, 其中 t 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越。令 G 为 E 的自同构群, 由所有形如

$$t \mapsto at + b, \quad a, b \in \mathbb{F}_p, \quad a \neq 0$$

的自同构组成 (此即 Exercise 7 中平移子群的推广)。试求固定域 $F = \text{Inv } G$ 及次数 $[E : F]$ 。

证明. G 正是 $\mathbb{F}_p$ 上的仿射线性变换群 $\text{AGL}(1, p)$ 。其阶为

$$|G| = p(p-1),$$

因 a 有 $p-1$ 种选择, b 有 p 种选择, 且不同选择给出不同的自同构。

由 Artin 引理 (Lemma 2, p. 235), $[E : F] \leq |G| = p(p-1)$ 。

分两步构造中间域。先考虑平移子群

$$T = \{t \mapsto t + b \mid b \in \mathbb{F}_p\}, \quad |T| = p.$$

由 Exercise 7,

$$\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t), \quad [E : \text{Inv } T] = p.$$

在 $\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t)$ 上, 记 $u := t^p - t$ 。伸缩子群 $D \cong \mathbb{F}_p^\times$ 的作用为

$$u \mapsto (at + b)^p - (at + b) = a(t^p - t) + (b^p - b) = au,$$

其中 $b^p = b$ 使用了 $\mathbb{F}_p$ 中元素的性质。由于 $\mathbb{F}_p^\times$ 是 $p-1$ 阶循环群, 且 $a^{p-1} = 1$, 元素

$$v := u^{p-1} = (t^p - t)^{p-1}$$

在 D 作用下不变: $au \mapsto a^{p-1}u^{p-1} = v$ 。

又 $G = T \rtimes D$ (半直积), 故 D 的固定域在 G 下也固定。因此

$$F = \mathbb{F}_p((t^p - t)^{p-1}).$$

其次数:

$$[E : F] = [E : \mathbb{F}_p(t^p - t)] \cdot [\mathbb{F}_p(t^p - t) : F] = p \cdot (p-1) = p(p-1) = |G|,$$

与 Artin 引理的上界一致。

注: 固定域也可以理解为: $\text{AGL}(1, p)$ 在有理函数域上的固定域由 $(t^p - t)^{p-1}$ 生成; 该扩域是 Section 4.5 第二类标准例子 (对称有理函数域) 之外的另一类显式 Galois 扩张模型。 $\square$

3.15 正规扩域的 Galois 群: 四元数群 Q_8 的显式实现

题目 3.15. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 9)

设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$, 其中 $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$ 。证明 $E/\mathbb{Q}$ 正规, 并确定 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 。

证明. **Step 1. 域的塔与次数。** 记 $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$, 并记 $s = 9 - 5b$, $t = 2 - a$ 。令 $F = \mathbb{Q}(a, b)$ 。则

$$[F : \mathbb{Q}] = 4, \quad \text{Gal}(F/\mathbb{Q}) \cong V_4.$$

若 $st = u^2$ 是 F 中平方元, 则其相对于二次扩张 $F/\mathbb{Q}(a)$ 的范数

$$N_{F/\mathbb{Q}(a)}(st) = t^2(9 - 5b)(9 + 5b) = 6t^2$$

也应为 $\mathbb{Q}(a)$ 中的平方元。这将迫使 6 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的平方元; 但 $(x + ya)^2 = 6$ 给出 $2xy = 0$, 进而要求 $x^2 = 6$ 或 $2y^2 = 6$, 均不可能。故 $u \notin F$, 从而

$$[E : F] = 2, \quad [E : \mathbb{Q}] = 8.$$

Step 2. 正规性。 $F/\mathbb{Q}$ 的四个自同构由 $a \mapsto \pm a$, $b \mapsto \pm b$ 给出。 u 的相应共轭根均已在 E 中:

$$u, \quad \frac{as}{u}, \quad \frac{abt}{u}, \quad \frac{2b}{u}.$$

事实上, 它们的平方依次为

$$st, \quad s(2 + a), \quad (9 + 5b)t, \quad (9 + 5b)(2 + a).$$

故 E 包含 u 的所有 $\mathbb{Q}$ -共轭, 并且 $E/\mathbb{Q}$ 正规 (特征为零时自动可分)。

Step 3. Galois 群。 定义 $r, \tau \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 为

	a	b	u
r	$-a$	b	as/u
τ	a	$-b$	abt/u

上一步的平方计算保证这些赋值保持关系 $u^2 = st$, 因而确实给出自同构。令 z 为固定 a, b 而令 $u \mapsto -u$ 的自同构, 则

$$r^2(u) = \tau^2(u) = -u, \quad r^2 = \tau^2 = z.$$

另一方面, $r\tau$ 与 τr 在 a, b 上都取负号, 且直接代入得

$$r\tau(u) = -\tau r(u), \quad \text{即} \quad r\tau = z\tau r.$$

于是 $r^4 = \tau^4 = 1$, $r^2 = \tau^2 = z \neq 1$, 且 $r\tau = -\tau r$ 。这些正是四元数群的关系; 又 $[E : \mathbb{Q}] = 8$, 故

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1.$$

其中可取 $i = r$, $j = \tau$, $k = r\tau$, 群中符号 -1 对应自同构 z 。 □

3.16 交替群对应的固定域：判别式的 Galois 对应

题目 3.16. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 13)

设 F 是特征 $\neq 2$ 的域。令 $G = \text{Gal}(E/F(p_1, \dots, p_n))$, 其中 $E = F(x_1, \dots, x_n)$, p_i 为初等对称多项式。由 Section 4.5 的第二个例子, $G \cong S_n$ 。令 H 为相应于交错群 A_n 的子群, 即

$$H = \{\sigma \in G \mid \sigma \text{ 对应偶排列}\}.$$

证明

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta),$$

其中

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

为 Vandermonde 判别式。

证明. 由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = [G : H] = \frac{|S_n|}{|A_n|} = 2.$$

因此只需证 $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$ 且 $\Delta \in \text{Inv } H$, 由此即得 $\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n)(\Delta) = F(p_1, \dots, p_n, \Delta)$ 。

1. $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$ 。取转置 $\tau = (1 \ 2) \in S_n$ 。则 $\tau(\Delta) = -\Delta$ (因为 Δ 中仅因子 $(x_1 - x_2)$ 变号, 其余因子在 τ 下不变或成对互换)。若 $\Delta \in F(p_1, \dots, p_n) = \text{Inv } G$, 则应有 $\tau(\Delta) = \Delta$, 这与 $\tau(\Delta) = -\Delta$ 且 $\text{char } F \neq 2$ (从而 $-\Delta \neq \Delta$, 因为 $\Delta \neq 0$) 矛盾。

2. $\Delta \in \text{Inv } H$ 。对任意偶排列 $\pi \in A_n$, 将 π 分解为偶数个转置之积。每个转置使 Δ 变号, 故偶数个转置后 $\pi(\Delta) = \Delta$ 。因此 Δ 在 A_n (从而在 H) 作用下固定。

3. 结论。 已知 $F(p_1, \dots, p_n) \subset F(p_1, \dots, p_n, \Delta) \subseteq \text{Inv } H$ 。由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2,$$

而 $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$ 说明上述包含是真包含。因此

$$[F(p_1, \dots, p_n, \Delta) : F(p_1, \dots, p_n)] \geq 2,$$

结合 $[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2$ 便推出等式:

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta).$$

注: 二次扩域 $F(p_1, \dots, p_n, \Delta)/F(p_1, \dots, p_n)$ 的生成元 Δ 满足 $\Delta^2 = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2 \in F(p_1, \dots, p_n)$, 这正是判别式 disc 的来源。由此可看出经典的判别式理论是 Galois 基本定理在 S_n/A_n 情形下的直接推论。 $\square$

3.17 上中心列与幂零性的等价刻画

题目 3.17. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 10)

设 G 是有限群。定义下中心列 (lower central series) 为

$$G^1 = G, \quad G^{i+1} = (G^i, G) \quad (i \geq 1),$$

其中 (H, K) 表示由所有换位子 $(h, k) = h^{-1}k^{-1}hk$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群。 G 称为幂零 (nilpotent), 若存在整数 k 使得 $G^{k+1} = 1$ 。

定义上中心列 (upper central series) 为

$$1 = C_0 \subset C_1 \subset C_2 \subset \cdots$$

其中 $C_1 = C(G)$ 为 G 的中心, 且 C_i 由条件

$$C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$$

递推定义; 等价地,

$$C_i = \{x \in G \mid (x, g) \in C_{i-1} \text{ 对一切 } g \in G\}.$$

证明: 有限群 G 幂零当且仅当上中心列在有限步终止于 G (即存在 k 使 $C_k = G$)。由此与 Theorem 4.8 的证明过程结合, 推出任意 p -群必幂零。

证明. 1. 两个中心列之间的基本关系。

由定义直接得到

$$(C_i, G) \subseteq C_{i-1}, \quad (G^i, G) = G^{i+1}.$$

第一条来自 $C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$: $x \in C_i$ 意味着 $\bar{x}$ 在 G/C_{i-1} 的中心里, 故对所有 $g \in G$ 有 $\overline{(x, g)} = \bar{1}$, 即 $(x, g) \in C_{i-1}$ 。

2. 下中心列终止 $\implies$ 上中心列到达 G 。

设 $G^{k+1} = 1$ 。我们归纳证明

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$ 时 $G^{k+1} \subseteq 1 = C_0$ 成立。设 $G^{k+1-i} \subseteq C_i$, 任取 $x \in G^{k-i}$ 。对任意 $g \in G$,

$$(x, g) \in (G^{k-i}, G) = G^{k+1-i} \subseteq C_i,$$

故 $x \in C_{i+1}$ 。因此 $G^{k-i} \subseteq C_{i+1}$ 。取 $i = k$ 即得 $G = G^1 \subseteq C_k$, 从而 $C_k = G$ 。

3. 上中心列到达 $G \implies$ 下中心列终止。

设 $C_k = G$ 。我们归纳证明

$$G^{i+1} \subseteq C_{k-i} \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$ 时 $G^1 = G = C_k$ 成立。设 $G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$, 则

$$G^{i+2} = (G^{i+1}, G) \subseteq (C_{k-i}, G) \subseteq C_{k-i-1},$$

最后一步由基本关系 $(C_j, G) \subseteq C_{j-1}$ 保证。取 $i = k$ 即得 $G^{k+1} \subseteq C_0 = 1$, 故 $G^{k+1} = 1$ 。

4. 注记。

上述两步中使用的关系

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i, \quad G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$$

表明两种中心列以相反方向相互控制：上中心列的第 i 层夹住下中心列的第 $k+1-i$ 层。由此可读出一个更强的结论——若两种中心列均在 k 步终止，则幂零类恰为 k ，且两列长度相等。

5. p -群幂零。

Theorem 4.8 的证明对任意有限 p -群 G 显式构造了上中心列：取 $C_1 = Z(G) \neq 1$ (p -群有非平凡中心)，再对商群 G/C_1 (仍为 p -群) 取中心得 C_2/C_1 ，如此递推。由于 G 有限，必在某步到达 $G = C_k$ 。由本命题即知 G 幂零。□

3.18 有限幂零群的结构： p -群的直积

题目 3.18. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 11)

证明：有限群 G 幂零当且仅当它是有限个 p -群 (对不同素数 p) 的直积。

证明. 1. 充分性： p -群的直积必幂零。

首先，任意有限 p -群是幂零的——这由 Exercise 10 与 Theorem 4.8 直接得到：Theorem 4.8 对 p -群显式构造了到达全群的上中心列，再由上中心列刻画即得幂零性。

其次，直积保持幂零性：若 A, B 幂零，令 $c = \max(\text{cl}(A), \text{cl}(B))$ ，只需验证 $(A \times B)^{c+1} = 1$ 。直接计算

$$(A \times B)^1 = A \times B, \quad (A \times B, A \times B) = (A, A) \times (B, B),$$

归纳即得 $(A \times B)^i = A^i \times B^i$ 对一切 $i \geq 1$ 成立。当 $i = c+1$ 时 $A^{c+1} = B^{c+1} = 1$ ，故直积也平凡。有限个因子的情形成立同样的归纳。

因此 p_1 -群 $\times \cdots \times p_r$ -群是幂零群。

2. 必要性：有限幂零群必为 p -群的直积。

设 G 是有限幂零群, $|G| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$ 为其素数幂分解。由 Exercise 9, 幂零群的每个 Sylow 子群皆正规, 且对每个素数 p_i 只存在唯一 Sylow p_i -子群, 记为 P_i 。于是

$$P_i \triangleleft G \quad (i = 1, \dots, r).$$

互素阶元可交换。 取 $i \neq j$ 及 $x \in P_i, y \in P_j$ 。考虑换位子

$$(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy.$$

因 $P_i \triangleleft G$, 有 $y^{-1}xy \in P_i$, 故 $(x, y) \in P_i$; 同理 $(x, y) = x^{-1}(y^{-1}xy) = (x^{-1}y^{-1}x)y \in P_j$ (因 $P_j \triangleleft G$)。于是

$$(x, y) \in P_i \cap P_j.$$

但 $|P_i| = p_i^{a_i}, |P_j| = p_j^{a_j}, p_i \neq p_j$, Lagrange 定理迫使 $P_i \cap P_j = \{1\}$ 。故 $(x, y) = 1$, 即

$$xy = yx \quad (\forall x \in P_i, y \in P_j, i \neq j).$$

构造直积同构。 定义乘积映射

$$\varphi: P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_r \longrightarrow G, \quad (x_1, x_2, \dots, x_r) \longmapsto x_1 x_2 \cdots x_r.$$

因不同 P_i 的元素两两可换, φ 是群同态:

$$(x_1 \cdots x_r)(y_1 \cdots y_r) = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_r y_r.$$

φ 是单射: 若 $x_1 x_2 \cdots x_r = 1$, 则对每个 i ,

$$x_i = (x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_r)^{-1}.$$

等式左端 x_i 的阶整除 $p_i^{a_i}$, 右端属于由所有 P_j ($j \neq i$) 生成的子群, 其阶整除 $\prod_{j \neq i} p_j^{a_j}$ 。由于 $\gcd(p_i^{a_i}, \prod_{j \neq i} p_j^{a_j}) = 1$, 只能 $x_i = 1$ 。这对所有 i 成立, 故 $\ker \varphi$ 平凡。

φ 是满射: $|P_1 \times \cdots \times P_r| = \prod_{i=1}^r |P_i| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i} = |G|$, 既为单射, 由有限性即为满射。

因此 φ 是同构, $G \cong P_1 \times \cdots \times P_r$ 。

3. 总结。

综合两方向:

$$G \text{ 有限幂零} \iff G \cong P_1 \times \cdots \times P_r, \quad P_i \text{ 为 } p_i\text{-群}.$$

换言之, 有限幂零群正是其所有 Sylow 子群的直积。这一结构定理彻底刻画了有限幂零群: 它们由一些彼此可换、具有互素阶的 p -群拼成, 群的整体性质 (可解性、正规子群结构等) 完全被各 Sylow 分支单独决定。 $\square$

3.19 素数次二项式的不可约性: Bézout 引理的判别法

题目 3.19. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 247, Section 4.7, Exercise 1)

设 p 为素数, $\text{char } F \neq p$, $a \in F$ 。证明: $X^p - a \in F[X]$ 要么在 F 上不可约, 要么在 F 中有根。

证明. 若 $a = 0$ 则 X^p 以 $0 \in F$ 为根, 结论成立。下设 $a \neq 0$ 。

设 $X^p - a$ 在 $F[X]$ 中可约。取 $g(X) \in F[X]$ 为一首一不可约因子, 令 $d = \deg g$, 则 $1 \leq d \leq p-1$ ($d=1$ 直接给出 F 中的根)。设 β 为 g 在某个扩域中的一个根, 则 $\beta^p = a$ 。

在代数闭包中, $X^p - a$ 的全部根为

$$\beta, \zeta\beta, \zeta^2\beta, \dots, \zeta^{p-1}\beta,$$

其中 ζ 为某个本原 p 次单位根 (因为 $\text{char } F \neq p$, $X^p - a$ 可分, 其导数 $pX^{p-1} \neq 0$, 且根集作成 μ_p -齐性空间)。

1. 从常数项提取 β^d 的信息。 g 作为 $X^p - a$ 的因子, 其 d 个根均取自上述 p 个根。记这些根为 $\zeta^{i_1}\beta, \dots, \zeta^{i_d}\beta$, 令 $s = i_1 + \dots + i_d$ 。 g 的常数项属于 F :

$$a_d := (-1)^d \prod_{k=1}^d (\zeta^{i_k}\beta) = (-1)^d \zeta^s \beta^d \in F.$$

故

$$c := (-1)^d a_d = \zeta^s \beta^d \in F.$$

2. 用 Bézout 恒等式拼出根。 因为 p 是素数且 $1 \leq d \leq p-1$, 有 $\gcd(d, p) = 1$ 。由整数环上的 Bézout 恒等式, 存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得

$$ud + vp = 1.$$

现在从 $\beta^d = \zeta^{-s}c$ (其中 $c \in F$) 与 $\beta^p = a \in F$ 出发:

$$\beta = \beta^{ud+vp} = (\beta^d)^u \cdot (\beta^p)^v = (\zeta^{-s}c)^u \cdot a^v = \zeta^{-su} \cdot c^u a^v.$$

令

$$\gamma := c^u a^v \in F.$$

则 $\beta = \zeta^{-su}\gamma$ 。

3. 计算 γ^p 。

$$\gamma^p = (\zeta^{su}\beta)^p = \zeta^{sup} \beta^p = 1 \cdot a = a.$$

因此 $\gamma \in F$ 且 $\gamma^p = a$, 即 γ 是 $X^p - a$ 在 F 中的根。

4. 结论. 若 $X^p - a$ 可约但无 F 中的一次因子, 则从任一次数 d ($2 \leq d \leq p-1$) 的不可约因子的常数项出发, Bézout 恒等式保证了 a 必为 F 中某个元素的 p 次幂, 与假设矛盾。因此 $X^p - a$ 若有真因子, 必有一次因子, 从而在 F 中有根。等价地, 若 $X^p - a$ 在 F 中无根, 则它在 $F[X]$ 上不可约。 $\square$

3.20 分圆域的归一化根塔嵌入

题目 3.20. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 247, Section 4.7, Exercise 3)

设 F 为特征 0 的域, p 为素数, E/F 为 p 次分圆域 (即 $E = F(\zeta)$, ζ 为本原 p 次单位根)。称一串扩域

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_s = K$$

为 F 上的归一化根塔 (normalized root tower), 若每一步 $F_{i+1} = F_i(u_i)$ 满足 $u_i^{n_i} \in F_i$ 且 n_i 为素数, 并且 $[F_{i+1} : F_i] = n_i$ 。证明: E 可嵌入某个对 F 具有归一化根塔的扩域 K 中。

证明. 对素数 p 作强归纳。 $p = 2$ 时 $\zeta = -1$, $E = F$, 取 $K = E$ 即得空塔。

下设 $p > 2$ 且结论对所有素数 $q < p$ 成立。令

$$d := [E : F], \quad G := \text{Gal}(E/F) \leq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

G 是 $p-1$ 的循环子群, 从而为 d 阶循环群。

若 $d = 1$, 则 $E = F$, 平凡。下设 $d > 1$, 取 d 的一个素因子 q 。

第一步: 提取 q 次循环中间域。 令 $H \leq G$ 为唯一的 d/q 阶子群,

$$M := E^H, \quad [M : F] = q,$$

且 M/F 是 q 次循环 Galois 扩张。

第二步: 用归纳假设处理 q 次单位根。 由于 $q \mid d \mid (p-1)$, 有 $q < p$ 。对素数 q 应用归纳假设: 分圆域 $F(\zeta_q)/F$ 可嵌入某个对 F 具有归一化根塔的域 L 中, 即存在根塔

$$F = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_t = L,$$

每步为归一化的素数幂根扩张, 且 $F(\zeta_q) \subseteq L$ 。特别地, L 含有本原 q 次单位根。

第三步: 在 L 上添加 q 次根提升 M 。 考虑合成域 LM 。由 Galois 理论,

$$\text{Gal}(LM/L) \cong \text{Gal}(M/(M \cap L)) \leq \text{Gal}(M/F) \cong C_q,$$

故 $[LM : L]$ 为 1 或 q 。

- 若 $[LM : L] = 1$, 则 $M \subseteq L$, 此步无需新增扩张。
- 若 $[LM : L] = q$: L 含 q 次单位根, 且 LM/L 为 q 次循环 Galois 扩张。由 Lemma 3 (Section 4.7, *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 253), 存在 v 使 $LM = L(v)$ 且 $v^q \in L$, 并且 $[LM : L] = q$ 。这恰好是一次归一化的 q 次根塔步。

将这一步接在 L 的根塔之后, LM 即对 F 具有归一化根塔。

第四步: 处理商群部分。 $\text{Gal}(E/M) \cong G/H$ 为 d/q 阶循环群, 且 E/M 是某 p 次分圆域 ($E = M(\zeta)$)。由于 $d/q < d \leq p-1$, 对 $[E : M] = d/q$ 递归使用同样论证 (归纳依据为扩张次数而非素数), 得到 E 可嵌入对 M (从而对 LM) 具有归一化根塔的扩域。

综合各步, E 嵌入到某个对 F 具有归一化根塔的域 K 中。 $\square$

3.21 素数次不可约方程的根式可解准则: Galois 的二根生成定理

题目 3.21. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 262, Section 4.8, Exercise 15)

设 F 为特征 0 的域, $f(x) \in F[x]$ 为 p 次 (p 为素数) 不可约多项式, E 为 $f(x)$ 在 F 上的分裂域。证明: $f(x) = 0$ 在 F 上根式可解当且仅当 $E = F(r_i, r_j)$ 对 $f(x)$ 的任意两个 (不同) 根 r_i, r_j 成立。

证明. 记 $G = \text{Gal}(E/F)$, 视作根集 $\{r_1, \dots, r_p\}$ 上的置换群 $G \leq S_p$ 。因 f 不可约, 由 Theorem 4.14, G 在 p 个根上传递。

1. 充分性 (根式可解 $\implies$ 二根生成)。

设 G 可解。 G 是 S_p 的可解传递子群, 由 Exercise 14 (Section 4.8, p. 262), G 共轭于仿射群

$$L = \text{AGL}(1, p) = \{x \mapsto ax + b \mid a, b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, a \neq 0\}$$

的包含全部平移 $\{x \mapsto x + b \mid b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$ 的子群。

L 中非平凡元的定点数由方程 $x = ax + b$ 即 $(1-a)x = b$ 决定:

- $a \neq 1$: 恰有唯一解 $x = b(1-a)^{-1}$ (恰 1 个定点);
- $a = 1, b \neq 0$: 无解 (平移为 p -轮换, 无定点; Exercise 12);
- $a = 1, b = 0$: 恒等元。

因此 L 的任一非平凡元至多固定一个点。特别地, 对任意 $i \neq j$, $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$ 。由 Galois 对应,

$$[E : F(r_i, r_j)] = |\text{Stab}_G(i, j)| = 1,$$

故 $E = F(r_i, r_j)$ 对任意两不同根成立。

2. 必要性 (二根生成 $\implies$ 根式可解)。

设 $E = F(r_i, r_j)$ 对任意 $i \neq j$ 成立, 则 $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$ 对所有 $i \neq j$ 成立。

令 $d := |\text{Stab}_G(1)|$ 。由传递性, $|G| = p \cdot d$ 。 $\text{Stab}_G(1)$ 作用于 $\{2, \dots, p\}$ 且对任意 $j \in \{2, \dots, p\}$ 有 $\text{Stab}_G(1, j) = \{\text{id}\}$, 故该作用为自由作用 (半正则), 从而 $d \mid (p-1)$ 。

考虑 Sylow p -子群。 p 的 Sylow p -子群个数 n_p 满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid d \leq p-1$, 迫使 $n_p = 1$ 。令 $P \leq G$ 为此唯一的 Sylow p -子群, 则 $P \triangleleft G$, $|P| = p$, $P \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (循环群, Abel)。

考察 G 在 P 上的共轭作用。因 $\text{Aut}(P) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong C_{p-1}$, 有群同态 $\varphi: G \rightarrow C_{p-1}$ 。 $\ker \varphi = C_G(P)$ (P 的中心化子), 且 $G/C_G(P) \cong \text{Im } \varphi \leq C_{p-1}$ 为循环群 (Abel)。

在 $C_G(P)$ 中, $P \subseteq C_G(P)$ 且 P 为中心元。对任意 $x, y \in C_G(P)$, 考虑换位子 $(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy$ 。商群 $C_G(P)/P$ 中 xP 与 yP 可换 (因为 $\varphi(x) = \varphi(y) = \text{id}$, 它们在 $G/C_G(P)$ 中平凡), 故 $(x, y) \in P$ 。于是 $[C_G(P), C_G(P)] \subseteq P$ 。

由于 P 为 Abel 群, $C_G(P)'' \subseteq [P, P] = \{1\}$, 即 $C_G(P)$ 为亚 Abel 群 (可解长度 ≤ 2)。

综上, 有正规列

$$\{1\} \subset C_G(P) \subset G,$$

其中 $C_G(P)$ 可解, $G/C_G(P) \leq C_{p-1}$ 为循环群 (可解)。故 G 可解。由 Galois 根式可解准则 (Section 4.7), $f(x) = 0$ 在 F 上根式可解。 $\square$

3.22 实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍

题目 3.22. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 266, Section 4.9, Exercise 6)

设 F 为 $\mathbb{R}$ 的子域。

(a) 设 $f(x) \in F[x]$ 为不可约三次多项式, 其判别式 $d > 0$ 且 $G_s = A_3$ 。证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的全部根均落在 $\mathbb{R}$ 中。

(b) 设 p 为素数, $K = F(r)$, 其中 $r \in \mathbb{R}$ 且 $r^p \in F$ 。证明: K 不能包含 $f(x)$ 在 F 上的分裂域。

证明. (a) 判别式正定 $\implies$ 全实根。

因 f 不可约且 $G_s \cong A_3$ (三阶循环群), 有 $|\text{Gal}(E/F)| = 3$, 其中 E 为 f 的分裂域。 A_3 中无非平凡的对合 (二阶元)。

将复共轭 $\tau: z \mapsto \bar{z}$ 限制到 E 上。因 $F \subseteq \mathbb{R}$, τ 逐点固定 F , 故 $\tau|_E \in \text{Gal}(E/F)$ 。但 $\tau^2 = \text{id}$, 因此 $\tau|_E$ 的阶为 1 或 2。

若 f 有非实根, 设为 $r_1 \notin \mathbb{R}$, 则 $\bar{r}_1 \neq r_1$ 是另一根 (实系数多项式的共轭根定理), 从而 $\tau|_E(r_1) = \bar{r}_1 \neq r_1$, $\tau|_E \neq \text{id}$, 其阶必为 2。这与 $\text{Gal}(E/F) \cong A_3$ 无二阶元矛盾。

因此 f 的三个根全为实数。

(b) 实根式单扩张不能包含全实 Galois 三次扩张。

设 E 为 f 在 F 上的分裂域, 则 $[E:F] = |\text{Gal}(E/F)| = 3$ 。

假设 $E \subseteq K = F(r)$, 其中 $r \in \mathbb{R}$, $r^p \in F$ 。由 $F \subseteq E \subseteq K$ 得 $3 = [E:F] \mid [K:F]$ 。又因 r 满足 $X^p - r^p \in F[X]$, 有 $[K:F] \mid p$ 。 p 为素数, 故 $[K:F] = p = 3$ 。

于是 $K = F(r)$ 为 F 的三次扩张, $r^3 \in F$ 。由 (a), f 的三个根均在 $\mathbb{R}$ 中, 从而 $E \subseteq \mathbb{R}$ 。特别地, $K = F(r) \subseteq \mathbb{R}$ (因 $F \subseteq \mathbb{R}$ 且 $r \in \mathbb{R}$)。

因 $[K:F] = 3 > 1$, $r \neq 0$ 。在 $\mathbb{C}$ 中,

$$X^3 - r^3 = (X - r)(X^2 + rX + r^2),$$

二次因子的判别式为 $r^2 - 4r^2 = -3r^2 < 0$, 故其根为 $\omega r, \omega^2 r$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 为本原三次单位根。这两个根为非实数。

r 的极小多项式 $m_r(X) \in F[X]$ 的次数为 $[F(r):F] = 3$, 且 $m_r(X) \mid X^3 - r^3$ 。因 $\deg m_r = 3$ 而 $X^3 - r^3$ 也是三次, $m_r(X) = X^3 - r^3$ 在 F 上不可约。 r 的三个 F -共轭恰为 $r, \omega r, \omega^2 r$ 。

但 $K = F(r) = E$ 是 F 的 Galois 扩张 (E/F 为分裂域), 必包含 r 的所有 F -共轭, 从而包含非实数 $\omega r, \omega^2 r$ 。这与 $K \subseteq \mathbb{R}$ 矛盾。

因此 $K = F(r)$ 不可能包含 $f(x)$ 的分裂域。 $\square$

3.23 有限域扩张的范数满射

题目 3.23. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 300, Section 4.15, Exercise 1)

设 E 是有限域, F 是其子域。证明: E/F 是循环扩张, 且范数同态

$$N_{E/F}: E^\times \longrightarrow F^\times$$

是满射。

证明. 设 $|F| = q$, 则 $|E| = q^n$, 其中 $n = [E:F]$ 。有限域的乘法群 $E^\times$ 是 $q^n - 1$ 阶循环群; 取其生成元 g 。由有限 Galois 扩张的范数公式,

$$N_{E/F}(x) = x^{1+q+\cdots+q^{n-1}} = x^{(q^n-1)/(q-1)}.$$

令

$$m = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

则 $N_{E/F}(g) = g^m$, 其在 $E^\times$ 中的阶为

$$\frac{q^n - 1}{\gcd(q^n - 1, m)} = \frac{q^n - 1}{m} = q - 1.$$

另一方面, $N_{E/F}(g) \in F^\times$, 而 $|F^\times| = q - 1$. 故 $\langle N_{E/F}(g) \rangle = F^\times$, 所以 $N_{E/F}$ 满射。

特别地, 有限域的任意有限扩张均为 Galois 循环扩张:

$$\text{Gal}(E/F) = \langle x \mapsto x^q \rangle \cong C_n.$$

□

3.24 循环 p -幂扩张的嵌入判别与二次应用

题目 3.24. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, pp. 300–301, Section 4.15, Exercises 5, 7, 8; Exercise 6 为应用)

设 p 为素数, F 含有 p 个互异的 p 次单位根, ζ 是其中的本原根, 且 E/F 是 p^s 次循环扩张 ($s \geq 1$)。证明

$$E \text{ 可嵌入某个 } [K:F] = p^{s+1} \text{ 的循环扩张} \iff \zeta \in N_{E/F}(E^\times).$$

证明. 必要性 (Exercise 5). 设 $E \subset K$, $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$ 且 $|\text{Gal}(K/F)| = p^{s+1}$. 记 $\eta = \sigma|_E$, 则 $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$, 并令 $\rho = \sigma^{p^s}$, 使 $\text{Gal}(K/E) = \langle \rho \rangle$.

由 K/E 为 p 次循环扩张且 $\zeta \in E$, 可取 $w \in K^\times$ 使

$$\rho(w) = \zeta^{-1}w.$$

令 $u = \sigma(w)/w$. 因 $\sigma\rho = \rho\sigma$, 有 $\rho(u) = u$, 故 $u \in E^\times$. 另一方面,

$$\rho(w) = \sigma^{p^s}(w) = \left(\prod_{i=0}^{p^s-1} \eta^i(u) \right) w = N_{E/F}(u)w.$$

比较两式即得 $N_{E/F}(u) = \zeta^{-1}$, 等价地 $\zeta \in N_{E/F}(E^\times)$ 。

充分性 (Exercise 7). 反设 $u \in E^\times$ 满足 $N_{E/F}(u) = \zeta$, 并取 $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$. 于是

$$N_{E/F}(u^p) = \zeta^p = 1.$$

由 Hilbert 90, 存在 $v \in E^\times$ 使

$$\eta(v)v^{-1} = u^p. \quad (*)$$

若 $v = w_0^p$ 为 E 中的 p 次幂, 则 $(*)$ 给出 $\eta(w_0) = \zeta^i u w_0$ (某个 i)。迭代 p^s 次可得

$$w_0 = \eta^{p^s}(w_0) = \zeta^{ip^s} N_{E/F}(u) w_0 = \zeta w_0,$$

矛盾。因此 $v \notin E^p$, 故 $K = E(w)$ 、 $w^p = v$ 满足 $[K : E] = p$ 。

定义 σ 为 η 在 K 上的提升并令 $\sigma(w) = uw$ 。由 $(*)$,

$$\sigma(w)^p = u^p v = \eta(v) = \sigma(w^p),$$

故定义良好; 又

$$\sigma^{p^s}(w) = N_{E/F}(u)w = \zeta w.$$

因此 σ 的阶为 p^{s+1} 。由于 $[K : F] = p^{s+1}$, 得到 $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$, 从而 K/F 循环。

二次情形 (Exercise 8)。若 $\text{char } F \neq 2$ 、 $E = F(\sqrt{c}) \neq F$, 取 $p = 2$ 、 $\zeta = -1$, 则

$$E \text{ 可嵌入循环四次扩张} \iff -1 \in N_{E/F}(E^\times) \iff c = x^2 + y^2 \quad (x, y \in F).$$

事实上, 对 $a, b \in F$,

$$N_{E/F}(a + b\sqrt{c}) = a^2 - cb^2.$$

若该范数为 -1 且 $b \neq 0$, 则

$$c = (a/b)^2 + (1/b)^2.$$

若 $b = 0$, 则 -1 是 F 中平方; 此时恒等式

$$c = \left(\frac{c+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{c-1}{2\sqrt{-1}}\right)^2$$

仍将 c 写成两平方和。反之, 若 $c = x^2 + y^2$, 则 $y \neq 0$ (否则 c 为平方), 并且

$$N_{E/F}\left(\frac{x + \sqrt{c}}{y}\right) = \frac{x^2 - c}{y^2} = -1.$$

应用 (Exercise 6)。取 $F = \mathbb{Q}$ 、 $p = 2$ 、 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$, 其中 $m < 0$ 。若它嵌入循环四次扩张, 则上面的二次判别要求 m 是两个有理数平方之和; 但平方和在 $\mathbb{Q}$ 中非负, 与 $m < 0$ 矛盾。因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 不能嵌入 $\mathbb{Q}$ 上的循环四次扩张。 $\square$

3.25 Albert 的 p 次循环扩张构造

题目 3.25. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercise 12)

沿用 Exercise 11 的记号: 令 ζ 为本原 p 次单位根, $W = F(\zeta)$, $[W : F] = s \mid (p-1)$, 且

$$\text{Gal}(W/F) = \langle r \rangle, \quad r(\zeta) = \zeta^t,$$

其中 $t \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 s 。设 $a \in W^\times$ 不是 W 中的 p 次幂, 并满足

$$r(a)a^{-t} = b^p \quad (b \in W^\times).$$

令

$$K = W[u], \quad u^p = a.$$

证明: K/F 是循环扩张, $[K:F] = ps$, 且 K/F 含有唯一的 p 次循环子扩张 E/F 。

证明. 因为 W 含有本原 p 次单位根 ζ , 且 $a \notin W^p$, Kummer 理论给出

$$[K:W] = p, \quad \text{Gal}(K/W) = \langle \tau \rangle, \quad \tau(u) = \zeta u.$$

因此

$$[K:F] = [K:W][W:F] = ps.$$

由条件 $r(a)a^{-t} = b^p$, 有

$$(bu^t)^p = b^p a^t = r(a).$$

所以 r 可延拓为 K 的 F -自同构 σ , 定义为

$$\sigma|_W = r, \quad \sigma(u) = bu^t.$$

同时

$$\sigma\tau(u) = \sigma(\zeta u) = \zeta^t bu^t, \quad \tau\sigma(u) = \tau(bu^t) = b(\zeta u)^t = \zeta^t bu^t,$$

并且二者在 W 上也相同, 故

$$\sigma\tau = \tau\sigma.$$

于是 $\tau^i \sigma^j$ ($0 \leq i < p, 0 \leq j < s$) 给出 ps 个互异的 F -自同构: 不同的 j 在 W 上限制不同; 固定 j 后, 不同的 i 在 u 上作用不同。因此

$$|\text{Gal}(K/F)| = ps = [K:F],$$

所以 K/F 是 Galois 扩张。

群 $\text{Gal}(K/F) = \langle \tau, \sigma \rangle$ 是交换群, 且有阶为 p 的元素 τ , 并且 σ 在商群

$$\text{Gal}(K/F)/\text{Gal}(K/W) \cong \text{Gal}(W/F)$$

中的像生成阶为 s 的循环群。由于 $(p, s) = 1$, 这个交换群必为循环群; 等价地, 若 σ 本身没有阶 ps , 则 $\tau\sigma$ 有阶 ps 。故 K/F 是循环扩张。

最后, 循环群中每个阶数的子群唯一。故 $\text{Gal}(K/F)$ 有唯一的阶 s 子群 H , 其固定域

$$E = K^H$$

满足

$$[E:F] = [\text{Gal}(K/F) : H] = p.$$

并且

$$\mathrm{Gal}(E/F) \cong \mathrm{Gal}(K/F)/H$$

是阶 p 循环群。唯一性也来自阶 s 子群的唯一性。 $\square$

3.26 通用三项式的仿射群与射影线性群

题目 3.26. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercises 9, 10)

设 F_0 是特征 $p > 0$ 的域, $F = F_0(s, t)$, 其中 s, t 是两个独立超越元。

题目 9. 证明

$$X^p - sX - t$$

在 F 上的 Galois 群同构于仿射群

$$\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p) = \{x \mapsto ax + b \mid a \in \mathbb{F}_p^\times, b \in \mathbb{F}_p\}.$$

证明. 取 y 满足

$$y^{p-1} = s.$$

因为 $Y^{p-1} - s$ 在 $F_0(t)[s]$ 中对素理想 (s) Eisenstein, 故 $[F(y) : F] = p - 1$ 。

若 α 是 $X^p - sX - t$ 的一个根, 则所有根为

$$\alpha + cy \quad (c \in \mathbb{F}_p),$$

因为 $(\alpha + cy)^p - s(\alpha + cy) - t = \alpha^p - s\alpha - t + c(y^p - sy) = 0$ 。令

$$z = \frac{\alpha}{y}.$$

由 $s = y^{p-1}$ 得

$$z^p - z = \frac{t}{y^p}.$$

在 $F(y) = F_0(y, t)$ 中, Artin-Schreier 多项式

$$Z^p - Z - \frac{t}{y^p}$$

不可约: 若 $t/y^p = h^p - h$, 取 $t = \infty$ 处的离散赋值, 则左边有一阶极点; 而 $h^p - h$ 的任一极点阶数都被 p 整除, 矛盾。因此 $[F(y, z) : F(y)] = p$ 。

分裂域为

$$K = F(y, z) = F(y, \alpha),$$

故

$$[K : F] = p(p - 1).$$

对任意 $a \in \mathbb{F}_p^\times$ 、 $b \in \mathbb{F}_p$, 定义

$$y \mapsto ay, \quad z \mapsto a^{-1}z + b.$$

它保持

$$s = y^{p-1}, \quad t = y^p(z^p - z),$$

因此给出 F -自同构。这样的自同构共有 $p(p-1)$ 个, 等于 $[K:F]$, 所以已经给出全部 Galois 群。在 z -坐标下作用为 $z \mapsto cz + b$ ($c \in \mathbb{F}_p^\times$), 即 $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 。□

题目 10. 在同样记号下, 证明

$$X^{p+1} - sX - t$$

在 F 上的 Galois 群同构于射影线性分式变换群

$$\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p) = \left\{ x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{F}_p, ad-bc \neq 0 \right\}.$$

证明. 多项式 $f(X) = X^{p+1} - sX - t$ 可分, 因为

$$f'(X) = (p+1)X^p - s = X^p - s,$$

若公共根 r 同时满足 $r^p = s$ 与 $r^{p+1} - sr - t = 0$, 则推出 $t = 0$, 与 t 为超越元矛盾。

设 L 为分裂域, 根集为 Ω 。对每个根 $x \in \Omega$, 有

$$x^p = s + \frac{t}{x}.$$

右端是关于 x 的线性分式变换

$$\varphi(x) = s + \frac{t}{x}.$$

取三个不同根 α, β, γ , 定义交比坐标

$$\lambda(x) = \frac{(x-\alpha)(\gamma-\beta)}{(x-\beta)(\gamma-\alpha)}.$$

于是 $\lambda(\alpha) = 0$ 、 $\lambda(\beta) = \infty$ 、 $\lambda(\gamma) = 1$ 。利用交比在线性分式变换下不变, 并用 $x^p = \varphi(x)$, 可得

$$\lambda(x)^p = \lambda(x).$$

故每个根在该坐标下落在

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p \cup \{\infty\}.$$

因为 f 有 $p+1$ 个互异根, 所以 Ω 与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 一一对应。

任意 $\sigma \in \text{Gal}(L/F)$ 置换 Ω , 且保持这些交比关系; 因此在上述坐标中, 它给出 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 上的一个射影线性分式变换。于是

$$\text{Gal}(L/F) \hookrightarrow \text{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

剩下要说明这个嵌入是满的。这里用 Uchida 关于通用三项式 $X^n - aX - b$ 的次数结论：当 $n = p + 1$ 时，其分裂域的 Galois 群在根集上的作用正是 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。在本题记号下即

$$[L : F] = |\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_p)| = p(p^2 - 1).$$

由于上面的嵌入两边阶数相同，故

$$\mathrm{Gal}(L/F) \cong \mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

□

索引

概念辨析

- [根理想与谱] Jacobson 根看极大理想，幂零根看素理想与极小素理想。
- [Artin 环与 Noether 环] Artin 环的核心是零维、有限极大理想，以及还有 $J(A) = \sqrt{0}$ 。
- [局部环与链条件] 局部且极大理想幂零不够推出 Artin；无限维平凡扩张给出反例。
- [局部环与链条件] 局部环理想一般不全是 $\mathfrak{m}^n$ ；若恰好全是，则自动 Noether。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的关键技术点是有限生成、Nakayama 与 Noether 推广。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的三条条件对 Noether 局部环同样等价，关键替代是 Krull 交定理 $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$ 。
- [Associated primes 与局部化] 局部化只保留与 S 不相交的 associated primes，书中 $P \cap S^{-1}A$ 应改为 $P \cap A$ 。
- [Associated primes 与局部化] 对商模 $A/\mathfrak{q}$ ， $\text{Ass}(A/\mathfrak{q})$ 由根理想 $\mathfrak{r}(\mathfrak{q})$ 直接给出；素理想时就是 $\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\}$ 。
- [Prime filtration 与 Ass] Prop 6.1.8 的 prime filtration 不唯一，出现的 prime multiset 也可不同。
- [Prime filtration 与 Ass] Lem 6.1.9 里的 associated primes 只能得到包含号，不能一般改成等号。
- [Ass 的交与和] 在 Thm 6.2.10 附近，交可以无限进行，因为交仍是子模；并通常没有 Ass 可谈，实际应改看子模的和。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 若 $\mathfrak{q}$ 是 p -primary，则 $(\mathfrak{q} : x)$ 的计算由 $A/\mathfrak{q}$ 中“零因子皆幂零”这一刻画统一控制。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] Noether 环里 $\mathfrak{m}$ -primary、 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$ 、以及 $\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ 三条彼此等价，有限生成性正用在 $(2) \Rightarrow (3)$ 。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 素理想幂与固定根理想都不自动给出 primary 结构， $k[x, y, z]/(xy - z^2)$ 提供了标准反例。

- [Supp(M) 的两条基本性质] $V(I)$ 是包含 I 的素理想所成闭集; $\text{Supp}(M)$ 的非空性等价于 $M \neq 0$, 有限生成时由 $\text{Ann}(M)$ 判定。
- [整扩张中的上行与下行定理] 整扩张给出 lying-over、incomparability 与 going-up; 再加上 A 整闭整环, 则还能得到 going-down。
- [Galois 扩张与 radical 扩张] $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ 的三次固定子域给出标准反例: Galois 不推出 radical。
- [Galois 扩张与 radical 扩张] $x^5 - 2$ 的分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)$ 实际上是显式 radical 扩张, 不能拿来作反例。
- [范畴论视角] Artin/Noether 的形式对偶更适合用 Matlis 对偶理解。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 分清极限/余极限先看过渡态射方向: $\mathbb{Z}_p$ 来自 $\varprojlim \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, 而 Prüfer p -群来自 $\varinjlim \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ 。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 始对象是“唯一流出”, 终对象是“唯一流入”; colimit 对应始对象的泛性质, limit 对应终对象的泛性质。
- [Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*] Artin-Rees 预备引理里, 核心是证明 $M_n^* = A^* \cdot Q_n$ 为有限生成 A^* -模, 而 Q_n 与 M_n^* 的生成元处在不同直和环境里。
- [Krull 交定理] Noether 情形下 $\bigcap_{n \geq 0} I^n M$ 描述的是完备化映射的核; 若 $I \subset \text{Jac}(A)$, 它就必为 0。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] completion 的谱映射不自动满射; flat 不等于 faithfully flat, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 给出标准反例。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] 8.5 节前最后一段要区分 I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与诱导过滤 $I^n M \cap N$; Artin-Rees 说明它们在子模上给出同一拓扑。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] $G_I(M)$ 是标准 I -adic filtration 的 associated graded, $G(M)$ 是一般 I -filtration 的 associated graded; 相同的是诱导拓扑, 不是分次模本身。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] Prop 8.5.10 说明: 在完备且 $\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$ 的情形下, $G(M)$ 的有限生成性与 Noether 性可分别恢复 M 的对应性质。
- [短正合列的分裂与投射模/内射模] 短正合列分裂等价于有截面、收缩或直和分解; projective / injective / flat 分别由 $\text{Hom}(P, -)$ 、 $\text{Hom}(-, I)$ 、 $- \otimes_A F$ 的正合性刻画。

- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-simple 强于 hereditary, 因为“每个左理想是 Λ 的直和因子”强于“每个左理想是 projective Λ -模”。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] projective 模只保证是某个自由模的直和因子, 不一定是 Λ 本身的直和因子; $\mathbb{Z}$ 给出 hereditary 非 semi-simple 的标准反例。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-hereditary 只控制有限生成子模, 无法检验内射性所需的任意嵌入; 左 Noether 时才与 hereditary 重合。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] JH 记录 simple composition factors, KS 记录 indecomposable 直和项; Jacobson II 用 Λ -groups 统一群和模的 JH 证明。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] $\mathbb{Z}$ 与 C_p^∞ 说明 JH 不能只靠一侧链条件; $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的非主理想说明 KS 唯一性也会越界失败。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] 一般模未必能分解为 indecomposable 直和, 有限长度同时保证有限存在性与唯一性。

专题整理

- [投射分解、内射分解与 Tor / Ext 的主线] 投射/内射分解是把一般模替换成“好模”的装置; Tor 衡量张量积失去的左正合性, Ext 衡量 Hom 失去的右正合性并分类短正合列扩张。
- [Morita 等价: 用模范畴比较环] Morita 等价不是环同构, 而是模范畴等价; 矩阵环、progenerator 与自同态环给出其最常用的判定和构造。
- [Algebra I 中 local ring 的性质与判定] local ring 等价于唯一极大左/右理想, 极大理想就是 Jacobson 根; Nakayama 与 strongly indecomposable 的判定都由这个唯一方向控制。
- [Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系] 关键不是“Galois $\Leftrightarrow$ radical”, 而是 G_f 可解等价于“分裂域嵌入某个 radical 扩张”, 不等价于“分裂域本身就是 radical”。
- [Kummer 扩张与 Artin-Schreier 扩张] Kummer 理论用 $T^n - a$ 描述含足够单位根时的 cyclic 扩张, Artin-Schreier 理论用 $T^p - T - a$ 描述特征 p 下的次数 p cyclic 扩张。

- [CSA 相关概念总联系] 这里集中梳理 CSA、中心除代数、分裂域、中心化子与 Brauer 群之间的关系。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] I -filtration 可视为 pro-对象, completion 是逆极限; $\mathbb{Z}_p$ 则是 (p) -adic 完备化的标准模型。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] 第一卷的“滤子”讲 Cauchy 与完备化, 第二卷的 pro-对象讲逆系统; 两者都可由同一个 filtration 诱导出来。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] 分次环记住的是按次数的直和分解; 真正导向 pro-对象与 completion 的, 是滤过给出的截断系统 $A/F^n A$ 。
- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性] 第 8 章可压成一张总图: filtration 同时导出 graded 与 completion, Artin-Rees 控制子模, 8.3/8.5 再把 flatness 与 Noether 性接回原对象。
- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性] M 连同 (M_n) 一般只是 filtered module; 真正天然 graded 的是 associated graded $G(M)$ 。
- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性] I -filtration 先给 $G(M)$ 与 completion; stable 负责拓扑, Artin-Rees 负责子模兼容, 而有限生成/Noether 条件决定何时这些技术能启动。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $d(A)$ 同时等于 Hilbert 级数极点重数、associated graded 的 Hilbert 多项式次数加一, 以及 χ_m 的次数。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $\delta(A)$ 衡量参数个数, 区别于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 给出的切空间维数; χ_q 则把长度增长转成维数与重数。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] system of parameters 是 $\delta(A) = \dim A$ 的具体实现, 而 9.2.15/9.2.16 说明参数系在 associated graded 的首项层面无低次关系, 并在系数域上代数无关。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] 9.3 节正是把“参数系代数无关”与 Noether normalization 拼起来, 得到 $\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k)$ 。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$ 的直观含义是: $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一阶首项自由地产生全部高阶首项, associated graded 没有额外关系。
- [Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理] Algebra I 把拓扑群用于 profinite groups 与 Krull topology; Algebra III 则把拓扑阿贝尔群用于 completion、 I -adic topology 与 formal geometry。

- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] Artin-Rees 的几何是控制闭子概形的无穷邻域、子层诱导拓扑与 completion。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] 8.3 节把 flatness 化成闭纤维与 associated graded 的兼容性检验。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Thm 6.2.10 若 $\text{Ass}(M)$ 无穷, 只能得到无穷交形式的分解。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Artin 环是准素分解的特殊整齐情形: 所有素理想都极大, 因此理想的最小准素分解没有嵌入素理想歧义, 并可按局部分量唯一分解。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 有限准素分解真正稳定适用的是 Noether 环上的有限生成模及其子模。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 一般模与非 Noether 环的困难核心在于 associated primes 与分解的有限性失控。

题目整理

- [$k[x, y]/(x^2, xy)$ 的 Ass 与 Supp] 对 $k[x, y]/(x^2, xy)$, associated primes 可由具体元素的湮灭子读出, support 则由 $V(\text{Ann}(M))$ 给出。
- [有限生成模的 support 在基变换下的原像公式] 有限生成模在基变换下的 support, 等于原 support 经 f^* 的逆像。
- [自由模之间单射与满射的秩比较] 对交换环, $A^m \twoheadrightarrow A^n$ 必有 $m \geq n$, 而 $A^m \hookrightarrow A^n$ 必有 $m \leq n$ 。
- [局部环上矩阵环的阶数与底环由同构决定] local rings 上矩阵环同构时, Krull-Schmidt 唯一性给出阶数和底环; 右理想自同态环无反环, 左理想版本有反环。
- [全自同态环作用下的不可约性与 Schur 引理逆命题] 向量空间在全自同态环作用下不可约, 但自同态环为除环并不反推模不可约。
- [满射自由模自同态的可逆性] 交换环上有限秩自由模的满射自同态必为双射, 但单射自同态不必满射。
- [高斯整数上的有限生成模结构] 在 $\mathbb{Z}[i]$ 上用 Smith 标准形得 $D^{(3)}/K \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i)$, 阶为 352512。

- [超越单扩张的真中间域] 对纯超越单扩张 $F(u)/F$, 任一真中间域都会使 u 变成代数元; 而有限代数单扩张的中间域则只有有限多个。
- [中间域全序条件下有限扩张的原始元] 若有限扩张的含 F 中间域按照包含构成全序, 则取最大真中间域外的元素即可生成整个扩张; 其中 $[E:F] < \infty$ 不能省去。
- [有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界] 若 $[E:F] = n < \infty$, 则 E/F 到任意扩张域 K/F 的 F -嵌入个数至多为 n 。
- [Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形] Dieudonné 环是 left Noetherian 非 right Noetherian; $k[t]$ 是 Noether 非 Artin; Artin 非 Noether 不存在; 无限变量多项式环两者皆非。
- [p -polynomial 的等价刻画] 特征 p 下, 首一多项式的根集构成有限加法子群且重数全同 $\iff$ 它是 p -polynomial; 充分性通过 Moore 行列式把 $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构化为 x^{p^k} 的线性组合。
- [纯不可分二项式的不可约性] 若 $a \notin F^p$, 则 $X^{p^e} - a$ 不可约; 否则最小多项式次数降低会迫使 $a \in F^p$ 。
- [有理函数域的仿射 Galois 群] $\text{AGL}(1, p)$ 作用于 $\mathbb{F}_p(t)$ 的固定域由 $(t^p - t)^{p-1}$ 生成, 扩域次数为 $p(p-1)$ 。
- [Q_8 -扩张的显式实现] $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$, $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$, 的两个符号翻转提升满足 $i^2 = j^2 = -1$, $ij = -ji$, 故 Galois 群为 Q_8 。
- [交错群与判别式] S_n 中 A_n 的固定域由判别式平方根生成。
- [上中心列与幂零性] 有限群幂零 (下中心列终止于 1) 当且仅当上中心列在有限步到达 G ; 由此与 Theorem 4.8 一并推出 p -群必幂零。
- [有限幂零群的结构] 有限群幂零当且仅当它是 p -群的直积; 各 Sylow 子群正规且互素阶元可换, 乘积映射即给出直积分解。
- [素数次二项式的不可约性] 特征不整除 p 时, $X^p - a$ 要么不可约要么有根; 若有度数 $d \in (1, p)$ 的不可约因子, Bézout 恒等式从其常数项构造出 a 为 p 次幂。
- [分圆域的归一化根塔] p 次分圆域可嵌入归一化根塔; 通过对素数 p 强归纳, 提取素数幂子扩张并逐次用 Kummer 理论升塔。

- [素数次方程的根式可解准则] 特征 0 不可约 p 次方程根式可解当且仅当分裂域由任意两根生成；正向由 Exercise 14 嵌入 $\text{AGL}(1, p)$ ，逆向以 Sylow 与中心化子论证可解性。
- [判别式正定与实根塔障碍] 不可约实三次式 $d > 0$ 且 $G = A_3$ 时三根全为实数；实 p 次根单扩张不能包含这类分裂域，因 Galois 性迫使包含非实单位根共轭。
- [有限域扩张的范数满射] 对 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ ，范数为 $x \mapsto x^{(q^n-1)/(q-1)}$ ；生成元的像有 $q-1$ 阶，故范数满射。
- [循环 p -幂扩张的嵌入判别] p^s 次循环扩张可嵌入 p^{s+1} 次循环扩张当且仅当 ζ_p 是范数；二次时等价于 c 是两平方和。
- [Albert 的 p 次循环扩张构造] 若 $r(a)a^{-t}$ 是 p 次幂且 $a \notin W^p$ ，则 $W(u)$, $u^p = a$ ，在 F 上是 ps 次循环扩张，并含唯一 p 次循环子扩张。
- [通用三项式的仿射群与射影线性群] $X^p - sX - t$ 的分裂域给出 $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ ，而 $X^{p+1} - sX - t$ 的分裂域给出 $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。