

Sanidad y reproducción animal en sistemas agroecológicos

Medicamentos_veterinarios

Medicamentos para porcinos.



Antibióticos.

Se recomienda uno de amplio espectro, por ejemplo, las tetraciclinas, que son de larga duración. Su aplicación es vía intramuscular o intravenosa, con tres o cuatro aplicaciones diarias durante tres días.

Los cerdos son animales caníbales, se puede comer entre ellos, y esta medida evitar las mordeduras en etapas de adultez.

Analgésicos antiinflamatorios.

El de uso más común en el hato ganadero, es flunixin- meglumine, que actúa como antiinflamatorio, además, tiene acción analgésica y reduce la fiebre. Se aplica vía intravenosa durante 4 días.

Corte de colmillos.

Cuando nacen los colmillos son muy afilados y pueden causar afectaciones en los pezones de la madre a la hora de alimentarse.

Antidiarreico.

Para mejores resultados se suministra con soluciones salinas y electrolitos vía oral.

Desparasitante.

Su uso depende de la época del año o de si hay descompensaciones nutricionales. Se recomienda hacer antes un análisis coprológico. Se administra vía oral. Para mejores resultados se suministra con soluciones salinas y electrolitos vía oral.



Baños.

Se emplean, dependiendo del clima y la raza, para control de moscas, garrapatas, chinches y ácaros. Se administra en fumigación.

Desinfectantes.

Se emplea en spray, sobre superficies, yodo en altas concentraciones, alcoholes y creolinas. Las concentraciones dependen del área a desinfectar.

Vacunas.

Son aplicadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dependiendo del plan sanitario.

Medicamentos para bovinos.



Yodo o violeta.

Su composición es a base de alcohol y yodo. Se administra en tópico y su aplicación es diaria.

Antihemorrágicos.

Se aplica vitamina K, involucrada en el proceso de coagulación. También se aplica en lesiones sangrantes.

Antihistamínicos.

Se administran vía oral, se dan para tratamientos anafilácticos.

Antipiréticos.

Se usan para contrarrestar procesos febriles, su administración es oral.

Penicilinas y amino penicilinas.

Son de amplio espectro, su aplicación es intramuscular.

Antiinflamatorios.

El de uso más común en el hato ganadero, es flunixin- meglumine. Se aplica vía intravenosa durante 4 días

Antiparasitarios.

Se emplea, vía oral, para el tratamiento de parásitos.

Antibiótico.

Se recomienda usar uno de amplio espectro, por ejemplo, las tetraciclinas, que son de larga duración. Su aplicación es intramuscular

