

离散数学第一章作业:

1.5 (5) — (8)

作业: 1.5 (5)-(8), 1.6 (2)-(3), 1.7 (1)

1.5 将下列命题符号化

(5) 如果天下大雨, 他就乘公共汽车上班.

(6) 只有天下大雨, 他才乘公共汽车上班.

(7) 除非天下大雨, 否则他不乘公共汽车上班.

(8) 不经一事, 不长一智.

解: 令 p : 天下大雨, q : 他乘公共汽车上班, r : 经一事, s : 长一智.

(5) $p \rightarrow q$

(6) $q \rightarrow p$

(7) $\neg p \rightarrow \neg q \Leftrightarrow q \rightarrow p$

(8) $\neg r \rightarrow \neg s \Leftrightarrow s \rightarrow r$

1.6 (2) (3)

1.6 设 p, q 的真值为 0; r, s 的真值为 1. 求下列各命题公式的真值.

(2) $(p \leftrightarrow r) \wedge (\neg q \vee s)$.

(3) $(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow ((p \vee q) \wedge (r \wedge s))$.

解:

(2) $(p \leftrightarrow r) \wedge (\neg q \vee s) \Leftrightarrow 0 \wedge 1 \Leftrightarrow 0$.

(3) $(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow ((p \vee q) \wedge (r \wedge s)) \Leftrightarrow (0 \wedge 1) \rightarrow (0 \wedge 1) \Leftrightarrow 1$.

1.7 (1)

1.7 判断下列命题公式的类型

(1) $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$.

p	q	r	$p \vee q \vee r$	$p \rightarrow (p \vee q \vee r)$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

故此命题公式为重言式

1.8 (2) (3)

1.8 用等值演算法证明下列等值式.

(2) $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow p \rightarrow (q \wedge r)$$

$$\therefore ((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$$

(3) $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$

$$\neg(p \leftrightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee (q \wedge \neg p)) \wedge (\neg q \vee (q \wedge \neg p))$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$$

$$\therefore \neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$$

A++ 3.08

1.12

(1)

1.12.

(1) 用真值表法或等值演算法求解如下.

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \wedge q \wedge r$	$(p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \wedge q \wedge r)$
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

成真赋值: 000, 001, 010, 111

成假赋值: 011, 100, 101, 110

主析取范式: $(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$
 $\Leftrightarrow \Sigma 0, 1, 2, 7$

主合取范式: $(p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$
 $\Leftrightarrow \Pi 3, 4, 5, 6$

(2)

(2)	p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \rightarrow q$	$\neg q \vee p$	$(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$
	0	0	1	1	0	1	1
	0	1	1	0	1	0	0
	1	0	0	1	1	1	1
	1	1	0	0	1	1	1

成真赋值: 00, 10, 11
 成假赋值: 01

主析取范式: $(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q)$
 $\Leftrightarrow \Sigma 0, 2, 3$

主合取范式: $p \vee \neg q$
 $\Leftrightarrow \Pi 1$

1.17

(1)

1.17 (1) $F \Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5$

项	$\neg x \wedge y$	$x \wedge \neg y$	$\neg x \wedge z$	$\neg y \wedge z$
覆盖	m_2, m_3	m_4, m_5	m_1, m_3	m_1, m_5
运算符数	2	2	2	2

$F \Leftrightarrow (\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge z)$
 或 $F \Leftrightarrow (\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y) \vee (\neg y \wedge z)$

1.19

1.19 (2) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow s), q, p \vee \neg r$.

结论: $r \rightarrow s$.

证明: ①	$p \vee \neg r$.	前提引入
②	r .	附加前提引入
③	p .	①②析取三段论
④	$p \rightarrow (q \rightarrow s)$.	前提引入
⑤	$q \rightarrow s$.	③④假言推理
⑥	q .	前提引入
⑦	s .	⑤⑥假言推理

离散数学第二章作业:

1、P53 Ex2.3 (3) (5) (6)

答案:

3月30日

2.3 (3) 没有不犯错误的人

个体域 D 默认为全总个体域

$\neg \exists x (\neg M(x) \wedge F(x))$, 其中 $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 不犯错误.

(5) 任何金属都可以溶解在某种液体中

$\forall x (M(x) \rightarrow \exists y (N(y) \wedge H(x, y)))$.

其中, $M(x)$: x 是金属, $N(y)$: y 是液体, $H(x, y)$: x 可溶解在 y 中.

(6) 凡对顶角都相等.

$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow L(x, y))$

其中, $F(x)$: x 是角, $G(x, y)$: x, y 对顶, $L(x, y)$: x, y 相等.

2、P54 Ex2.14

2.14 求下列各式的前束范式

$$(1) \neg \exists x F(x) \rightarrow \forall y G(x, y).$$

$$\Leftrightarrow \neg \exists z F(z) \rightarrow \forall y G(x, y) \quad (\text{换名规则})$$

$$\Leftrightarrow \forall z \neg F(z) \rightarrow \forall y G(x, y) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \exists z (\neg F(z) \rightarrow \forall y G(x, y)) \quad (\text{量词辖域扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow \exists z \forall y (\neg F(z) \rightarrow G(x, y)) \quad (\text{量词辖域扩张等值式})$$

$$(2) \neg (\forall x F(x, y) \vee \exists y G(x, y)).$$

$$\Leftrightarrow \neg (\forall s F(s, y) \vee \exists t G(x, t)). \quad (\text{换名规则})$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall s (F(s, y) \vee \exists t G(x, t)). \quad (\text{量词辖域扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall s \exists t (F(s, y) \vee G(x, t)). \quad (\text{量词辖域扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow \exists s \exists t \neg (F(s, y) \vee G(x, t)). \quad (\text{量词否定等值式})$$

批改你的
作业，望一切
视觉盛宴

Best
4.16

3、证明下列推理：

有理数和无理数都是实数，虚数不是实数。因此，虚数既不是有理数，也不是无理数。

$F(x)$: x 是有理数；

$G(x)$: x 是无理数；

$P(x)$: x 是实数；

$Q(x)$: x 是虚数。

答案：

(2) 设 $F(x)$: x 是有理数, $G(x)$: x 是无理数, $H(x)$: x 是实数, $I(x)$: x 是虚数。

前提: $\forall x((F(x) \vee G(x)) \rightarrow H(x))$, $\forall x(I(x) \rightarrow \neg H(x))$

结论: $\forall x(I(x) \rightarrow (\neg F(x) \wedge \neg G(x)))$

证明:

$$① \forall x(I(x) \rightarrow \neg H(x))$$

前提引入

$$② I(y) \rightarrow \neg H(y)$$

① \forall -

$$③ \forall x((F(x) \vee G(x)) \rightarrow H(x))$$

前提引入

$$④ (F(y) \vee G(y)) \rightarrow H(y)$$

③ \forall -

- ⑤ $\neg H(y) \rightarrow (\neg F(y) \wedge \neg G(y))$
 ⑥ $I(y) \rightarrow (\neg F(y) \wedge \neg G(y))$
 ⑦ $\forall x(I(x) \rightarrow (\neg F(x) \wedge \neg G(x)))$

- ④ 置换
 ②⑤ 假言三段论
 ⑥ $\forall+$

离散数学第三章作业：

1、使用容斥原理求不超过 120 的素数个数。

答案：

23. 因为 $11^2 = 121$, 不超过 120 的合数至少含有 2, 3, 5 或 7 这几个素因子之一. 先考虑不能被 2, 3, 5, 7 整除的整数. 设

$$S = \{x | x \in \mathbb{Z}, 1 \leq x \leq 120\}$$

$$A_1 = \{x | x \in S, x \text{ 是 2 的倍数}\}$$

$$A_2 = \{x | x \in S, x \text{ 是 3 的倍数}\}$$

$$A_3 = \{x | x \in S, x \text{ 是 5 的倍数}\}$$

$$A_4 = \{x | x \in S, x \text{ 是 7 的倍数}\}$$

那么

$$|S| = 120, |A_1| = 60, |A_2| = 40, |A_3| = 24, |A_4| = 17$$

$$|A_1 \cap A_2| = 20, |A_1 \cap A_3| = 12, |A_1 \cap A_4| = 8, |A_2 \cap A_3| = 8, |A_2 \cap A_4| = 5, |A_3 \cap A_4| = 3$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 4, |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = 2, |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = 1, |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 1$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

根据包含排斥原理, 不能被 2, 3, 5, 7 整除的整数是

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}| &= 120 - (60 + 40 + 24 + 17) \\ &\quad + (20 + 12 + 8 + 8 + 5 + 3) - (4 + 2 + 1 + 1) + 0 \\ &= 120 - 141 + 56 - 8 = 27 \end{aligned}$$

因为 2, 3, 5, 7 不满足上述条件, 但是它们都是素数, 另外, 1 满足上述条件, 但是 1 不是素数, 因此, 不超过 120 的素数有 $27 + 4 - 1 = 30$ 个.

2、对 60 个人的调查表明, 有 25 人阅读《每周新闻》杂志, 26 人阅读《时代》杂志, 26 人阅读《财富》杂志, 9 人阅读《每周新闻》和《财富》杂志, 11 人阅读《每周新闻》和《时代》杂志, 8 人阅读《时代》和《财富》杂志, 还有 8 人什么杂志也不读。

(1) 求三种杂志全都阅读的人数;

(2) 分别求只阅读《每周新闻》、《时代》和《财富》杂志的人数。

答案: (1) 3 人 (2) 只阅读《每周新闻》、《时代》和《财富》杂志分别为 8 人、10 人、12 人。

解: (1) S : 调查中至少读过一本杂志的人.

$$|S| = 60 - 8 = 52.$$

A : 读过《每周新闻》的人 (调查中) B : 调查中读过《时代》的人.

C : 调查中读过《财富》的人.

$$|A| = 25, |B| = 26, |C| = 26, |A \cap B| = 11, |A \cap C| = 9, |B \cap C| = 8.$$

$$|S| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

$$52 = (25 + 26 + 26) - (11 + 9 + 8) + |A \cap B \cap C|$$

$$|A \cap B \cap C| = 3$$

$$(2) |A \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$= 25 - 11 - 9 + 3 = 8.$$

$$|\bar{A} \cap B \cap \bar{C}| = |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$= 26 - 11 - 8 + 3 = 10.$$

$$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap C| = |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$= 26 - 9 - 8 + 3 = 12.$$


离散数学第四章作业：

1、设 $A = \{0, 1, 2, 3\}$ ， R 是 A 上的二元关系


$$R = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

(1) 请写出 R 、 $R \circ R$ 、 R^{-1} 的关系矩阵；

(2) 请画出 R 、 $R \circ R$ 、 R^{-1} 的关系图。



2、设 $A = \{1, 2, 3\}$ ，下图给出了三种 A 上的二元关系，写出每种关系对应的关系矩阵，并说明每种关系所具有的性质。



答案：

(a)	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	自反性
(b)	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	无性质
(c)	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	自反性 对称性 传递性

3、设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 为 $A \times A$ 上的二元关系, $\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in A \times A$

$$\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a + b = c + d$$

(1) 证明: R 为等价关系;

(2) 求 R 导出的划分。

答案:

(1) 证明: R 为等价关系. (2) 求 R 导出的划分.

$A \times A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

$\forall \langle a, b \rangle \in A \times A, a + b = a + b$

$\langle a, b \rangle R \langle a, b \rangle \Leftrightarrow a + b = a + b$

R 具有自反性.

$\forall \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \in A \times A, a + b = b + a$

$\langle a, b \rangle R \langle b, a \rangle \Leftrightarrow a + b = b + a$

R 具有对称性.

$\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \in A \times A, a + b = c + d = e + f$

$\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow \langle a, b \rangle R \langle e, f \rangle \Leftrightarrow \langle c, d \rangle R \langle e, f \rangle$

R 具有传递性.

故 R 为等价关系.

(2) $[\langle 1, 1 \rangle] = \{ \langle 1, 1 \rangle \}$

$[\langle 1, 2 \rangle] = [\langle 2, 1 \rangle] = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$

$[\langle 1, 3 \rangle] = [\langle 2, 2 \rangle] = [\langle 3, 1 \rangle] = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$

$[\langle 1, 4 \rangle] = [\langle 2, 3 \rangle] = [\langle 3, 2 \rangle] = [\langle 4, 1 \rangle] = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$

$[\langle 2, 4 \rangle] = [\langle 3, 3 \rangle] = [\langle 4, 2 \rangle] = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$

$[\langle 3, 4 \rangle] = [\langle 4, 3 \rangle] = \{ \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$

$[\langle 4, 4 \rangle] = \{ \langle 4, 4 \rangle \}$

4、对于集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ 与整除关系, 构成一个偏序关系;

(1) 请画出哈斯图;

(2) 写出集合 A 的极大元、极小元、最大元、最小元;

(3) 写出集合 $B = \{1, 2, 3, 6\}$ 的最大元、最小元、上界、下界、上确界、下确界

答案:

A的

极大元: 7, 8, 9, 10, 11, 12

极小元: 1

最大元: 无

最小元: 1

B的

最大元: 6

最小元: 1

上界: 6, 12

下界: 1


上确界: 6

下确界: 1

A^+ 5.20

第五章作业

1、无向图 G 如下图所示



请写出 G 的的点割集和边割集，并指出其中的割点和桥。

答案:

点割集 $\{a, c\}, \{d\}$

边割集 $\{e_1, e_2\}, \{e_1, e_3\}, \{e_1, e_4\}, \{e_2, e_3\}, \{e_2, e_4\}, \{e_3, e_4\}, \{e_5\}$

割点 d


桥 e_5

2、无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$, 其关联矩阵为


$$M(G) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

试画出 G 的图形。

答案：



3、有向图 D 如下图所示



- (1) D 中 v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路各几条?
- (2) D 中 v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路各几条?
- (3) D 中长度为 3 的通路有多少条? 其中长为 3 的回路有多少条?
- (4) 写出 D 的可达矩阵。

答案：

解: (1) D 的邻接矩阵 $A(D) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(2)

$$A^2(D) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3(D) = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4(D) = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}^{(3)} = 24$ 有 24 条通路。 $\sum_{i=1}^4 a_{ii}^{(3)} = 7$ 有 7 条回路。

(4) $P(D) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Handwritten notes on the right side of the page:

- v_1 到 v_4 长度为 1 的通路为 0 条
- v_1 到 v_1 长度为 1 的回路为 1 条
- v_1 到 v_4 长度为 2 的通路为 0 条
- v_1 到 v_1 长度为 2 的回路为 1 条
- v_1 到 v_4 长度为 3 的通路为 2 条
- v_1 到 v_1 长度为 3 的回路为 3 条
- v_1 到 v_4 长度为 4 的通路为 2 条
- v_1 到 v_1 长度为 4 的回路为 5 条

第九章作业:

1、 P227 Ex9.16

答案:

(1) 运算表如1:

*	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$
$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$

(2) 零元: $\langle 0, 0 \rangle$

幺元: $\langle 1, 1 \rangle$

可逆元: $1^{-1} = 1, 2^{-1} = 3, 3^{-1} = 2, 4^{-1} = 4$

2、 设代数系统 $V_1 = \langle \{0, 1\}, \circ \rangle$, $V_2 = \langle \{0, 1\}, * \rangle$, 其中 \circ 表示模 2 加法, $*$

表示模 2 乘法。试构造积代数 $V_1 \times V_2$ 的运算表, 并指出其中积代数的幺元。

答案:

2. 运算表如1:

	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$
$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$

积代数的单位元(幺元)是: $\langle 0, 1 \rangle$

3、 P227 Ex9.20

答案:

证明:

① 验证 \circ 运算对 \mathbb{Z} 封闭.

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, \quad x \circ y = x + y - 2 \in \mathbb{Z}$$

$\therefore \circ$ 为 \mathbb{Z} 上的二元运算 (也可省略)

② 验证 \circ 运算满足结合律.

$\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$, 则有

$$x \circ y \circ z = (x + y - 2) \circ z$$

$$= x + y - 2 + z - 2$$

$$= x + y - 4$$

2021/5/25 11:20

$$x \circ (y \circ z) = x \circ (y + z - 2)$$

$$= x + y + z - 2 - 2$$

$$= x + y + z - 4$$

$$\therefore x \circ y \circ z = x \circ (y \circ z)$$

即 \circ 满足结合律.

③ 单位元的存在.

设 $e \in \mathbb{Z}$, 为单位元, 则 $\forall x \in \mathbb{Z}$

$$x \circ e = x + e - 2 = x$$

$$\text{且 } e \circ x = e + x - 2 = x$$

可以推出 $e = 2 \in \mathbb{Z}$

所以, \mathbb{Z} 上的二元运算 \circ 存在单位元为 2

④ \mathbb{Z} 中每个元素都有逆元

$\forall x \in \mathbb{Z}$, 设 x^{-1} 为其逆元, 则有

$$x \circ x^{-1} = x + x^{-1} - 2 = e = 2$$

$$\text{且 } x^{-1} \circ x = x^{-1} + x - 2 = e = 2$$

可以推出 $x^{-1} = 4 - x \in \mathbb{Z}$

所以, \mathbb{Z} 中每个元素 x 都有逆元, 且其逆元为 $4 - x$

综上所述, \mathbb{Z} 与运算 \circ 能构成群.

2021/5/25 11:21