


2019-2020 学年第 1 学期  
数学分析作业

目录

5 第 5 周 . . . . .	1
6 第 6 周 . . . . .	7
7 第 7 周 . . . . .	7
8 第 8 周 . . . . .	14
9 第 9 周 . . . . .	19
10 第 10 周 . . . . .	24

第 5 周

 **作业题 5.1** 设  $A, B$  为非空有界数集, 并且  $A \subset B$ , 证明

$$\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B.$$

**证明** 显然,  $\inf A \leq \sup A$ . 下证  $\inf B \leq \inf A$  并且  $\sup A \leq \sup B$ .

假设  $\inf B > \inf A$ , 则  $\inf B$  不是集合  $A$  的下界, 从而存在  $x_0 \in A$  使得  $\inf B > x_0$ . 另一方面, 由于  $A \subset B$ , 从而也有  $x_0 \in B$ , 于是

$$\inf B > x_0 \geq \inf B,$$


矛盾.

假设  $\sup A > \sup B$ , 则  $\sup B$  不是集合  $A$  的上界, 从而存在  $x_1 \in A$  使得  $\sup B < x_1$ . 另一方面, 由于  $A \subset B$ , 从而也有  $x_1 \in B$ , 于是

$$\sup B < x_1 \leq \sup B,$$

矛盾.

综上,  $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$ . □

 **作业题 5.2** 设  $S$  为非空有下界 (不一定有上界) 的数集, 并且  $\inf S > 0$ , 证明集合

$$S^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in S\}$$

有界并且

$$\sup S^{-1} > 0, \quad \inf S^{-1} \geq 0, \quad \sup S^{-1} = \frac{1}{\inf S}.$$

**证明** Step1. 任取  $y \in S^{-1}$ , 令  $x = y^{-1}$ , 则  $x \in S$ ,

$$x \geq \inf S > 0,$$

从而

$$0 < y \leq \frac{1}{\inf S}, \quad \forall y \in S^{-1}. \quad (5.1)$$

所以 0 是  $S^{-1}$  的一个下界,  $\frac{1}{\inf S}$  是  $S^{-1}$  的一个上界, 并且

$$\sup S^{-1} > 0, \quad \inf S^{-1} \geq 0.$$

Step2. 由 Step1 可知  $\sup S^{-1} \leq \frac{1}{\inf S}$ . 下面排除  $\sup S^{-1} < \frac{1}{\inf S}$  的情况.

反证法, 假设  $\sup S^{-1} < \frac{1}{\inf S}$  成立, 由于  $\sup S^{-1} > 0$ , 则

$$0 < \inf S < \frac{1}{\sup S^{-1}}.$$

所以  $\frac{1}{\sup S^{-1}}$  不是  $S$  的下界, 存在  $x \in S$  使得

$$0 < \inf S \leq x < \frac{1}{\sup S^{-1}}.$$

令  $y = x^{-1}$ , 则  $y \in S^{-1}$ ,

$$0 < \frac{1}{y} = x < \frac{1}{\sup S^{-1}},$$

从而

$$\sup S^{-1} < y.$$


但是另一方面, 由于  $y \in S^{-1}$ , 则一定有

$$y \leq \sup S^{-1},$$

矛盾. 所以

$$\sup S^{-1} = \frac{1}{\inf S}.$$

□

 **作业题 5.3** 证明以下等式和不等式:

(1) 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则

$$||a| - |b|| \leq |a - b|, \quad \frac{|a + b|}{1 + |a + b|} \leq \frac{|a|}{1 + |a|} + \frac{|b|}{1 + |b|}.$$

(2) 设  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}_+$  且  $n \geq 2$ , 则

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}),$$

(3) Bernoulli(伯努利) 不等式: 设  $h \geq -1$ ,  $n \in \mathbb{N}_+$ , 则

$$(1 + h)^n \geq 1 + nh.$$

特别地, 如果还有  $h \geq 0$  并且  $n \geq 2$ , 则还成立

$$(1 + h)^n > \frac{n(n-1)}{2}h^2 \geq \frac{n^2h^2}{4}.$$

(4) 算术-几何平均值不等式: 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是  $n$  个非负实数, 则


$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}.$$

如果  $a_1, a_2, \dots, a_n$  都是正实数, 还成立几何-调和平均值不等式:

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}.$$

(5)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

 **注意**  $\sum_{k=1}^n s_k$  表示对  $s_1, s_2, \dots, s_n$  按下标  $k$  从 1 到  $n$  求和, 即  $\sum_{k=1}^n s_k = s_1 + s_2 + \dots + s_n$ .

(6) 若  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ , 则  $\sin x < x < \tan x$ . 若  $x \in \mathbb{R}$ , 则  $|\sin x| \leq |x|$ .

**证明** (1) 对任意  $a, b \in \mathbb{R}$ , 由绝对值不等式可得

$$\begin{aligned} |a - b| &\geq |a| - |b|, \\ |a - b| &= |b - a| \geq |b| - |a|, \end{aligned}$$

综合上述两式可得

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|,$$

所以

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

由于

$$f(t) = \frac{t}{1+t}, \quad t > 0$$

是严格增函数, 并且

$$|a + b| \leq |a| + |b|,$$

则  $f(|a + b|) \leq f(|a| + |b|)$ , 从而

$$\begin{aligned} \frac{|a + b|}{1 + |a + b|} &\leq \frac{|a| + |b|}{1 + |a| + |b|} \\ &= \frac{|a|}{1 + |a| + |b|} + \frac{|b|}{1 + |a| + |b|} \\ &\leq \frac{|a|}{1 + |a|} + \frac{|b|}{1 + |b|}. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} &(a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \\ &= (a^n + a^{n-1}b + \dots + a^2b^{n-2} + ab^{n-1}) \\ &\quad - (a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \dots + ab^{n-1} + b^n) \\ &= a^n - b^n. \end{aligned}$$

(3) 当  $n = 1$  时,  $(1 + h)^1 = 1 + 1 \cdot h$ , 结论成立.

假设当  $n = k$  时, 成立

$$(1 + h)^k \geq 1 + kh.$$

由于  $h \geq -1$ , 则当  $n = k + 1$  时,

$$\begin{aligned} (1 + h)^{k+1} &= (1 + h)^k \cdot (1 + h) \geq (1 + kh) \cdot (1 + h) \\ &= 1 + (k + 1)h + kh^2 \geq 1 + (k + 1)h. \end{aligned}$$

综上, 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$  以及任意  $h \geq -1$  都有

$$(1 + h)^n \geq 1 + nh.$$

当  $n \geq 2$  时, 有

$$\frac{n(n-1)}{2} \geq \frac{n^2}{4},$$

从而对任意  $h \geq 0$  都有

$$\begin{aligned} (1 + h)^n &= 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots + h^n \\ &> \frac{n(n-1)}{2}h^2 \geq \frac{n^2h^2}{4}. \end{aligned}$$

(4) 如果  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  中有一个是 0, 则算术-几何平均值不等式成立. 下设  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  都是正的实数.

当  $n = 1$  时, 两个不等式显然都成立.

假设当  $n = k$  时, 有

$$\frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} \geq \sqrt[k]{a_1 \cdots a_k}.$$

当  $n = k + 1$  时,

$$\begin{aligned} &\frac{a_1 + \cdots + a_k + a_{k+1}}{k+1} \\ &= \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} + \left( \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right) (a_1 + \cdots + a_k) + \frac{a_{k+1}}{k+1} \\ &= \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - (a_1 + \cdots + a_k)}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

令

$$A = \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}, \quad B = \frac{ka_{k+1} - (a_1 + \cdots + a_k)}{k(k+1)},$$

则  $A > 0$ ,  $A + B > 0$ . 再令  $h = \frac{B}{A}$ , 则  $1 + h > 0$ ,  $h > -1$ , 利用 Bernoulli 不等式可得

$$\begin{aligned} &\left( \frac{a_1 + \cdots + a_k + a_{k+1}}{k+1} \right)^{k+1} \\ &= (A + B)^{k+1} = A^{k+1} \left( 1 + \frac{B}{A} \right)^{k+1} = A^{k+1} (1 + h)^{k+1} \\ &\geq A^{k+1} [1 + (k+1)h] = A^{k+1} \left[ 1 + \frac{(k+1)B}{A} \right] = A^k [A + (k+1)B] \\ &= A^k \cdot a_{k+1}. \end{aligned}$$

根据  $n = k$  时的假设条件, 有

$$A^k = \left( \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} \right)^k \geq a_1 \cdots a_k,$$

从而

$$\frac{a_1 + \cdots + a_k + a_{k+1}}{k+1} \geq a_1 \cdots a_k \cdot a_{k+1}.$$

综上, 算术-几何平均值不等式

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n}$$

成立.

利用算术-几何平均值不等式可得

$$\frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n} \geq \sqrt[n]{\frac{1}{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n}} > 0,$$

对上式取倒数, 就得到几何-调和平均值不等式:

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}.$$

(5) 当  $n = 1$  时, 两不等式显然都成立.

假设当  $n = l$  时,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^l k^2 &= \frac{l(l+1)(2l+1)}{6}, \\ \sum_{k=1}^l k^3 &= \left(\frac{l(l+1)}{2}\right)^2. \end{aligned}$$


当  $n = l + 1$  时就有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{l+1} k^2 &= \sum_{k=1}^l k^2 + (l+1)^2 \\ &= \frac{l(l+1)(2l+1)}{6} + \frac{6(l+1)^2}{6} \\ &= \frac{(l+1)[(l+1)+1][2(l+1)+1]}{6}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{l+1} k^3 &= \sum_{k=1}^l k^3 + (l+1)^3 \\ &= \left(\frac{l(l+1)}{2}\right)^2 + (l+1)^3 \\ &= \left[\frac{(l+1)(l+2)}{2}\right]^2. \end{aligned}$$

综上, 两等式恒成立.

(6)



在以上单位圆周中, 角的弧度  $x$  满足  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ , 三角形  $OAB$  的面积

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot \sin x = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x,$$

扇形  $\widehat{OAB}$  的面积

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot x = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = \frac{1}{2} x,$$

直角三角形  $OAC$  的两条直角边的长度分别为

$$OA = 1, \quad AC = \tan x,$$

所以直角三角形  $OAC$  的面积为

$$S_3 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x = \frac{1}{2} \tan x.$$

显然,  $S_1 < S_2 < S_3$ , 从而

$$0 < \sin x < x < \tan x.$$

当  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  时, 由上述结论可知

$$|\sin x| \leq |x|.$$

当  $x > 1$  时, 总有

$$|\sin x| \leq 1 < x = |x|.$$

于是,

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

当  $x < 0$  时,  $-x \in (0, +\infty)$ , 由以上结论可得

$$|\sin x| = |\sin(-x)| \leq |-x| = |x|.$$

综上,

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□


**总结:**

1. 作业不要抄袭. 字迹要清楚.
2. 以上参考答案保证正确, 但是不一定是最优的.
3. 确界相关的题目, 一定要紧扣确界的定义, 不要想当然的用一些错误结论. 上确界、下确界不一定是集合的最大值、最小值, 上确界、下确界也不一定属于集合. 大家自行总结课堂上、教材和作业中和确界有关的结论和题目, 分为**一般集合的确界问题**和**函数相关的确界问题**. 这些结论我们今后会用到.
4. 不了解数学归纳法的同学, 请自学.
5. 本次作业完成的比较好的同学: **王芹**.
6. 各位同学要在学习上多花时间, 多动笔练习, 勤于思考, 多与其它同学讨论. 课前一定要预习教材内容, 课后及时复习.
7. 各位同学要积极找我答疑. 请提前通过 qq 联系我预约时间, 原则上我只当面答疑, 不接受在线答疑. 我的办公室是系楼 303 办公室后门 A 格, 走西面的门 (前门), 直接推门进入, 不要敲门.

## 第 6 周

欢度国庆!

## 第 7 周

 **作业题 7.1** 证明: 对任意  $p > 0$  以及任意  $a > 1$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

**证明 方法 1.** 令  $k = [p] + 1$ ,  $h = a - 1 > 0$ , 则当  $n > k$  时,

$$\begin{aligned} a^n &= (1+h)^n \\ &= 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots + C_n^k h^k + \cdots + h^n \\ &\geq C_n^k h^k = \left( \frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdots \frac{n-k+1}{1} \right) h^k. \end{aligned}$$

由于  $n > k$ , 则易证

$$\frac{n}{k}, \frac{n-1}{k-1}, \cdots, \frac{n-k+1}{1} \geq \frac{n}{k},$$

从而

$$\begin{aligned} a^n &= (1+h)^n \\ &\geq \left( \frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdots \frac{n-k+1}{1} \right) h^k \\ &\geq \frac{n^k}{k^k} h^k. \end{aligned}$$

于是当  $n > k = [p] + 1$  时,

$$0 \leq \frac{n^p}{a^n} \leq \frac{k^k}{h^k} \cdot \frac{1}{n^{k-p}}.$$

由于  $k - p > 0$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{k-p}} = 0,$$

由数列极限的迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

**方法 2.** 令  $b = a^{\frac{1}{p}}$ , 则  $b > 1$ ,  $b^p = a$  并且

$$\frac{n^p}{a^n} = \left( \frac{n}{b^n} \right)^p.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{b^n} = 0$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有

$$\left| \frac{n}{b^n} \right| < \varepsilon^{\frac{1}{p}},$$


从而

$$\left| \frac{n^p}{a^n} - 0 \right| = \left| \frac{n}{b^n} \right|^p < \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

□

 **作业题 7.2** 证明: 当  $a > 0$  且  $a \neq 1$  时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

**证明** 当  $a > 1$ , 对任意  $\varepsilon \in (0, 1)$ , 有

$$a^{-\varepsilon} < 1 < a^{\varepsilon}.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ , 则根据数列极限的保号性, 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有

$$a^{-\varepsilon} < (n)^{\frac{1}{n}} < a^{\varepsilon},$$

对上式取底数为  $a$  的对数可得

$$-\varepsilon < \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon,$$

即

$$\left| \frac{\log_a n}{n} \right| < \varepsilon.$$

根据数列极限的  $\varepsilon - N$  定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

当  $0 < a < 1$  时, 对任意  $\varepsilon \in (0, 1)$ , 有

$$a^{\varepsilon} < 1 < a^{-\varepsilon}.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ , 则根据数列极限的保号性, 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有

$$a^{\varepsilon} < (n)^{\frac{1}{n}} < a^{-\varepsilon},$$

对上式取底数为  $a$  的对数可得

$$-\varepsilon < \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon,$$


即

$$\left| \frac{\log_a n}{n} \right| < \varepsilon.$$

根据数列极限的  $\varepsilon - N$  定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

□

 **作业题 7.3** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$ .

**证明** 若  $a = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 有  $|a_n| < \varepsilon^3$ , 从而

$$|\sqrt[3]{a_n} - 0| = |\sqrt[3]{a_n}| < \varepsilon.$$

根据数列极限的  $\varepsilon - N$  定义就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = 0 = \sqrt[3]{a}.$$



若  $a > 0$ , 则根据数列极限的保号性, 存在正整数  $N$  使得对任意  $n > N$  都有  $a_n > 0$ , 此时

$$0 \leq |\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}| = \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a_n})^2 + \sqrt[3]{a_n} \cdot \sqrt[3]{a} + (\sqrt[3]{a})^2} < \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a})^2}.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a})^2} = 0,$$

根据迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}| = 0,$$


从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$ .

若  $a < 0$ , 则根据数列极限的保号性, 存在正整数  $N$  使得对任意  $n > N$  都有  $a_n < 0$ , 此时仍有

$$0 \leq |\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}| = \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a_n})^2 + \sqrt[3]{a_n} \cdot \sqrt[3]{a} + (\sqrt[3]{a})^2} < \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a})^2}.$$

根据之前的讨论可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$ .

□

 **作业题 7.4** 设  $\{a_n\}$  为正数数列并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$  (提示: 用保号性和迫敛性).

**证明** 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ , 根据数列极限的保号性, 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$  都有

$$0 < \frac{1}{2}a < a_n < \frac{3}{2}a,$$

从而

$$0 < \sqrt[n]{\frac{1}{2}a} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{\frac{3}{2}a}, \quad \forall n > N.$$


由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}a} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3}{2}a},$$

根据迫敛性, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

□

 **作业题 7.5** 在某些情况下, 非正常极限也具有类似于正常极限的一些性质. 利用 (正、负) 无穷大数列的严格定义证明以下结论

1. (类似于绝对值性质) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$ .
2. (类似于保号性) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ , 则对任何实数  $c \in \mathbb{R}$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任何  $n > N$ , 都有

$$a_n < c < b_n.$$

3. (类似于加法、乘法法则) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty.$$

4. (类似于减法、乘法法则) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = -\infty.$$

5. (类似迫敛性) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 数列  $\{b_n\}$  满足

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+,$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ .

6. (类似于子列性质) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则  $\{a_n\}$  的任何子列  $\{a_{n_k}\}$  都满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty.$$

### 证明

1. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ , 则对任意  $M > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有

$$a_n < -M < 0,$$

从而

$$|a_n| > M,$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$ .

2. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ , 则对任意  $c \in \mathbb{R}$ , 存在正整数  $N_1, N_2$ , 使得对任意  $n > N_1$  都有  $a_n < c$ ; 对任意  $n > N_2$  都有  $b_n > c$ . 令  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则对任意  $n > N$  就有

$$a_n < c < b_n.$$

3. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ .

(1) 对任意  $M > 0$ , 存在正整数  $N_1, N_2$ , 使得对任意  $n > N_1$ , 都有  $a_n > \frac{1}{2}M$ ; 对任意  $n > N_2$ , 都有  $b_n > \frac{1}{2}M$ . 令  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则对任意  $n > N$  就有

$$a_n + b_n > \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M = M,$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty$ .

(2) 对任意  $M > 0$ , 存在正整数  $N_1, N_2$ , 使得对任意  $n > N_1$ , 都有  $a_n > \sqrt{M}$ ; 对任意  $n > N_2$ , 都有  $b_n > \sqrt{M}$ . 令  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则对任意  $n > N$  就有

$$a_n b_n > \sqrt{M} \cdot \sqrt{M} = M,$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = +\infty$ .

4. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$ .

(1) 对任意  $M > 0$ , 存在正整数  $N_1, N_2$ , 使得对任意  $n > N_1$ , 都有  $a_n > \frac{1}{2}M$ ; 对任意  $n > N_2$ , 都有  $b_n < -\frac{1}{2}M$ . 令  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则对任意  $n > N$  就有

$$a_n - b_n > \frac{1}{2}M - \left(-\frac{1}{2}M\right) = M,$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = +\infty$ .

- (2) 对任意  $M < 0$ , 存在正整数  $N_1, N_2$ , 使得对任意  $n > N_1$ , 都有  $a_n > \sqrt{-M}$ ; 对任意  $n > N_2$ , 都有  $b_n < -\sqrt{-M}$ . 令  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则对任意  $n > N$  就有

$$a_n b_n < \sqrt{-M} \cdot (-\sqrt{-M}) = M,$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = -\infty$ .

5. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则对任意  $M > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有  $a_n > M$ , 再根据条件可得

$$b_n \geq a_n > M, \quad \forall n > N.$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ .

6. 设  $\{a_{n_k}\}$  是  $\{a_n\}$  的任意一个子列,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则对任意  $M > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$  都有  $a_n > M$ . 对任意  $k > n_N$ , 都有  $n_k \geq k > n_N \geq N$ , 从而  $a_{n_k} > M$ , 于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty.$$

□

### 作业题 7.6 计算以下数列的极限.

- $\{\sqrt[n]{n^2 + 1}\}$ .
- $a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$ .
- $\{(n!)^{\frac{1}{n^2}}\}$  (提示: 利用增长速度的顺序和迫敛性).
- $\left\{\frac{\sqrt[3]{n^2 \sin n!}}{n+1}\right\}$ .
- $\left\{\frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \cdots + \frac{(2n-1)^2}{n^3}\right\}$  (提示: 利用第 5 周作业题中的平方和公式).
- $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3+2^3+\cdots+k^3}}$  (提示: 利用第 5 周作业题中的立方和公式).

解

1. 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 都有

$$1 < \sqrt[n]{n^2 + 1} \leq \sqrt[n]{n^2 + n^2} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n}.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n} \right) = 1,$$

再根据数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + 1} = 1.$$

2. 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 都有

$$1 \leq a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \leq \underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_{n \text{ 项}}^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n}.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ , 则根据数列极限的迫敛性可得  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

3. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0,$$

根据数列极限的保号性, 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$  都有

$$0 < \frac{n!}{n^n} < 1,$$

从而

$$1 \leq n! < n^n, \quad \forall n > N,$$

$$1 \leq (n!)^{\frac{1}{n^2}} < (n^n)^{\frac{1}{n^2}} = \sqrt[n]{n}, \quad \forall n > N.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ , 则根据数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

4. 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 都有

$$0 \leq \left| \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1} \right| \leq \frac{\sqrt[3]{n^2}}{n+1} = \frac{n^{\frac{2}{3}}}{n+1} = \frac{\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}}{1 + \frac{1}{n}}.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{0}{1+0} = 0,$$

根据数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1} \right| = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1} = 0.$$

5. 设

$$S_n = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

则

$$\begin{aligned} & 1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2 \\ &= [1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + (2n)^2] \\ &\quad - [2^2 + 4^2 + \cdots + (2n)^2] \\ &= S_{2n} - 2^2 (1^2 + 2^2 + \cdots + n^2) \\ &= S_{2n} - 4S_n \\ &= \frac{4n^3 - n}{3}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \cdots + \frac{(2n-1)^2}{n^3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - n}{3n^3} \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

6. 由于

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + k^3}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= 2 \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right),
 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) = 2.$$

□

总结:

1. 我们已经验证过许多极限等式:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$  ( $\alpha > 0$ ),  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$  ( $a > 0$ ) 等, 这些可以直接用, 不需要再重复证明. 除非考试的时候要求你重新验证一遍.
2. 之前没有验证的极限等式, 一定要详细证明出来后才能使用. 如果你不确定是否验证过, 不妨重新验证一遍.
3. 用  $\varepsilon - N$  定义验证极限时, 正整数  $N$  只能依赖于  $\varepsilon$ , 不能依赖  $n$ .
4. 我们课上讲的数列收敛的性质有一个大前提:  $\{a_n\}, \{b_n\}$  都收敛于实数. 在这个前提下才能使用收敛数列的性质, 例如四则运算法则. 某些特殊情况下, 无穷大数列也具有类似于收敛数列的性质, 例如本周作业第 5 大题. 但是这只是形式上类似, 并不能实质等同, 不要随便使用四则运算法则. 严格来讲,  $0 \cdot \infty, \infty \cdot \infty$  等都是没有意义的.
5. 除了第 5 大题给出的结论外, 还有其它涉及无穷大数列的类似结论, 各位同学自行总结和证明. 当然, 也要总结不成立的情况, 例如:  
若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ , 则不一定有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty.$$

反例:  $a_n = n = b_n$ .

6. 学过的内容和题目要花大量时间反复看反复练习. 熟练之后, 原先很难的题目都会变成套路题, 就像你们现在已经熟悉的

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$$

求和这种.

7. 本次作业完成的比较好的同学, 一个也没有.

## 第 8 周

## 作业题 8.1 证明

(1) 设  $\{a_n\}$  是一列递增数列并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则

$$a = \sup_n \{a_n\}.$$

特别地, 若  $\{a_n\}$  还是一个严格增数列, 则

$$a_n < a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

(2) 设  $\{a_n\}$  是一列递减数列并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则

$$a = \inf_n \{a_n\}.$$

特别地, 若  $\{a_n\}$  还是一个严格减数列, 则

$$a_n > a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

**证明** (1) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则  $\{a_n\}$  是有界数列. 又因为  $\{a_n\}$  单调递增, 根据单调有界定理, 就有 (第一个等号就是单调有界定理的结论)

$$\sup_n \{a_n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

若  $\{a_n\}$  还是严格增数列, 下证

$$a_n < a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

反证法, 假设存在  $n_0 \in \mathbb{N}_+$  使得  $a_{n_0} \geq a$ , 则根据严格增性, 就有

$$a_{n_0+1} > a_{n_0} \geq a,$$

这与  $a = \sup_n \{a_n\}$  矛盾.

(2) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则  $\{a_n\}$  是有界数列. 又因为  $\{a_n\}$  单调递减, 根据单调有界定理, 就有

$$\inf_n \{a_n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

若  $\{a_n\}$  还是严格减数列, 下证

$$a_n > a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

反证法, 假设存在  $n_0 \in \mathbb{N}_+$  使得  $a_{n_0} \leq a$ , 则根据严格减性, 就有

$$a_{n_0+1} < a_{n_0} \leq a,$$

这与  $a = \inf_n \{a_n\}$  矛盾. □

## 作业题 8.2 Cauchy 数列的几种等价形式:

(i) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $m, n > N$ , 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

(ii) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$  以及任意  $m \geq n$ , 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

(iii) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$  以及任意  $p \in \mathbb{N}$ , 都有

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

证明上述三种形式的等价性:

(1) 若数列  $\{a_n\}$  满足条件 (i), 则也满足 (ii);

(2) 若数列  $\{a_n\}$  满足条件 (ii), 则也满足 (iii);

(3) 若数列  $\{a_n\}$  满足条件 (iii), 则也满足条件 (i).

**证明** (1) 设数列  $\{a_n\}$  满足条件 (i), 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $m, n > N$ , 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

于是对任意  $n > N$  以及任意  $m' \geq n$ , 有  $m', n > N$ , 从而

$$|a_{m'} - a_n| < \varepsilon.$$

所以  $\{a_n\}$  也满足条件 (ii).

(2) 设数列  $\{a_n\}$  满足条件 (ii), 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$  以及任意  $m \geq n$ , 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

于是, 对任意  $p \in \mathbb{N}$  以及任意  $n > N$ , 有  $n + p \geq n > N$ , 从而

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

所以  $\{a_n\}$  也满足条件 (iii).

(3) 设数列  $\{a_n\}$  满足条件 (iii), 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$  以及任意  $p \in \mathbb{N}$ , 都有

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

对任意  $m, n > N$ , 要么有  $m \geq n > N$ , 要么有  $n > m > N$ . 若  $m \geq n > N$ , 令  $p = m - n$ , 则  $p \in \mathbb{N}$ , 从而


$$|a_m - a_n| = |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

若  $n > m > N$ , 令  $p = n - m$ , 则  $p \in \mathbb{N}$ , 从而

$$|a_n - a_m| = |a_{m+p} - a_m| < \varepsilon.$$

所以  $\{a_n\}$  也满足条件 (i).

□

 **作业题 8.3** 设  $\{a_n\}$  是一个数列. 若存在正整数  $N_0$ , 使得对任意  $m, n > N_0$ , 都有

$$|a_m - a_n| \leq b_n,$$

其中  $\{b_n\}$  是一个无穷小数列, 证明  $\{a_n\}$  是 Cauchy 数列.

**证明** 由条件可知  $b_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}_+$ . 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N_1$ , 使得对任意  $n > N_1$ , 都有

$$0 \leq b_n < \varepsilon.$$

令  $N = \max\{N_0, N_1\}$ , 则对任意  $m, n > N$ , 就有

$$|a_m - a_n| \leq b_n < \varepsilon,$$

所以  $\{a_n\}$  是 Cauchy 数列. □

 **作业题 8.4** 设  $c > 0$  是一个正数, 数列  $\{a_n\}$  满足:

$$a_1 \in \left(0, \frac{1}{c}\right), \quad a_{n+1} = a_n(2 - ca_n).$$

证明  $\{a_n\}$  收敛, 并求出  $\{a_n\}$  的极限.

(提示: 先让  $a_1$  取某个特定值, 例如  $a_1 = \frac{1}{2c}$ , 据此寻找规律.)

**证明** Step1. 先证

$$0 < a_n < \frac{1}{c}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

当  $n = 1$  时, 显然  $0 < a_1 < \frac{1}{c}$ .

假设当  $n = k$  时,  $0 < a_k < \frac{1}{c}$ , 则

$$0 < \left|a_k - \frac{1}{c}\right| < \frac{1}{c},$$

于是当  $n = k + 1$  时, 有

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k(2 - ca_k) \\ &= 2a_k - ca_k^2 \\ &= -c\left(a_k - \frac{1}{c}\right)^2 + \frac{1}{c} \\ &\in \left(0, \frac{1}{c}\right). \end{aligned}$$

结论得证.

Step2. 根据 Step1 的结论, 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 就有

$$a_{n+1} = a_n(2 - ca_n) > a_n\left(2 - c \cdot \frac{1}{c}\right) = a_n,$$

所以  $\{a_n\}$  严格增. 根据单调有界定理,  $\{a_n\}$  收敛, 存在  $a \in \mathbb{R}$  使得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n > 0.$$

Step3. 在等式

$$a_{n+1} = a_n(2 - ca_n)$$

两端取极限可得

$$a = a(2 - ca),$$

解得  $a = \frac{1}{c}$ . 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{c}.$$

□

**注** 该题提供了计算给定正数  $c$  的倒数的一种迭代算法.

 **作业题 8.5**




(1) 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n > 0$  并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e.$$

(提示:  $[a_n] \leq a_n < [a_n] + 1$ ,  $\{[a_n]\}$  是  $\mathbb{N}_+$  的子列, 用两个与  $[a_n]$  有关的数列把  $\left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n}$  “包”起来.)

(2) 设数列  $\{b_n\}$  满足  $b_n < -1$  并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} = e.$$

 **注意** 虽然  $\{[a_n]\}$  是正整数构成的数列, 但是它的单调性未知,  $\{[a_n]\}$  不一定是  $\mathbb{N}_+$  的子列. 若  $\{[a_n]\}$  是严格增的数列, 则  $\{[a_n]\}$  才是  $\mathbb{N}_+$  的子列.

**证明** (1) Step1. 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则存在正整数  $N_0$ , 使得

$$a_n > 1, \quad \forall n > N_0,$$

从而

$$1 \leq [a_n] \leq a_n < [a_n] + 1, \quad \forall n > N_0, \quad (8.1)$$

进而

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{[a_n] + 1} &< 1 + \frac{1}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{[a_n]}, \quad \forall n > N_0, \\ \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n]} &\leq \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{a_n} \\ &< \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{a_n} < \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n] + 1}, \quad \forall n > N_0. \end{aligned} \quad (8.2)$$

Step2. 下证以下一般性命题.

#### 命题 8.1

设  $f$  是定义在  $\mathbb{R}$  上的函数, 则  $\{f(n)\}$  是一个数列. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A,$$

则对任意一列无穷大正整数数列  $\{a_n\}$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A.$$

事实上, 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N_0$ , 使得对任意  $m > N_0$ , 都有

$$|f(m) - A| < \varepsilon. \quad (8.3)$$

又因为  $\{a_n\}$  是无穷大正整数数列, 则存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有  $a_n > N_0$ , 此时, 令  $m = a_n$  并代入(8.3)式便得到

$$|f(a_n) - A| < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A.$$

命题得证.

Step3. 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 根据(8.1)式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [a_n] = +\infty.$$

又因为

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= e, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= e,\end{aligned}$$

由 Step2 的结论可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n]} = e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n] + 1}.$$

根据(8.2)式以及数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e.$$

(2) 设  $a_n = -b_n$ , 由条件可知  $a_n > 1$  并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 1) = +\infty.$$

另一方面,

$$\begin{aligned}& \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} \\&= \left(1 - \frac{1}{a_n}\right)^{-a_n} \\&= \left(\frac{a_n}{a_n - 1}\right)^{a_n} \\&= \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right)^{a_n - 1} \cdot \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right).\end{aligned}$$

由本题 (1) 部分的结果可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right)^{a_n - 1} = e.$$

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right) = 1 + 0 = 1,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} = e \cdot 1 = e.$$


□

**注** Step2 中的命题提供了计算数列极限时一种常用技巧——变量代换技巧. 事实上, 还有其他类型的变量代换技巧: 命题中的  $A$  也可以是  $+\infty$ ,  $-\infty$  和  $\infty$  (证明方法同学们自己总结).

**总结:**

1. 各位同学在写题目的证明过程或者解答过程时, 字迹和逻辑务必清晰, 让别人知道你到底在写什么.
2. 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$  使得  $\forall n > N$ , 有  $a_n < a + \varepsilon$ , 这并不能得出  $a_n \leq a$ , 因为  $a_n$  并不是固定的数. 反例  $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $a = 0$ .
3. 第 2 题, 大家一定要清楚到底要证明什么, 仔细看一下我给出的参考答案的逻辑和思路.
4. 本次作业同学们的完成状况都非常差. 有些同学连极限的  $\varepsilon - N$  定义都没有掌握, 存在符号  $\exists$  写成  $E$ , “ $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$ ” 写成 “ $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}_+$ ”. 第 1 题里面, 根据收敛数列的有界性,  $\{a_n\}$  是有界数列. 这样一句话就得出  $\{a_n\}$  有上界, 许多同学却没用这个结论, 自己去证明又是错误百出.
5. 有一些同学, 5 道题目只做了第 1 题 (还做错了), 其他题都空着. 有时间参加这个活动那个活动, 就没时间做做作业, 复习一下学过的内容吗?

## 第 9 周

 **作业题 9.1** 用  $\varepsilon - N$  极限定义和无穷大数列的定义验证以下极限等式.

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+2n}}{n} = 1.$
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1.$
- (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}.$
- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} - \sqrt{n} = +\infty.$

**证明** (1) **方法 1.** 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sqrt{n^2+2n}}{n} - 1 \right| &= \left| \frac{\sqrt{n^2+2n} - n}{n} \right| = \left| \frac{1}{n} \cdot \frac{(n^2+2n) - n^2}{\sqrt{n^2+2n} + n} \right| \\ &< \frac{2}{(n+1) + n} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

对任意  $\varepsilon > 0$ , 令  $N = \frac{1}{\varepsilon}$ , 则对任意  $n > N$ , 有

$$\left| \frac{\sqrt{n^2+2n}}{n} - 1 \right| < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+2n}}{n} = 1.$$

**方法 2.** 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 有

$$1 < \frac{\sqrt{n^2+2n}}{n} = \sqrt{1 + \frac{2}{n}} < 1 + \frac{2}{n},$$

从而

$$\left| \frac{\sqrt{n^2+2n}}{n} - 1 \right| < \frac{2}{n}.$$

对任意  $\varepsilon > 0$ , 令  $N = \frac{2}{\varepsilon}$ , 则对任意  $n > N$ , 有

$$\left| \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{n} - 1 \right| < \frac{2}{n} < \frac{2}{N} = \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{n} = 1.$$

(2) 方法 1: 设  $h_n = \sqrt[n]{n+1} - 1$ , 则  $h_n > 0$  ( $n \in \mathbb{N}_+$ ), 并且

$$n+1 = (h_n + 1)^n \geq 1 + \frac{n^2 h_n^2}{4}, \quad \forall n \geq 2,$$

从而

$$0 < h_n \leq \frac{2}{\sqrt{n}}, \quad \forall n \geq 2.$$

对任意  $\varepsilon > 0$ , 令  $N = \max \{2, \frac{4}{\varepsilon^2}\}$ , 则对任意  $n > N$ , 就有

$$|\sqrt[n]{n+1} - 1| = |h_n| < \frac{2}{\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{N}} \leq \varepsilon,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1.$$

方法 2: 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$  并且  $n > 2$ , 利用算术-几何平均值不等式可得

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{n+1} &= \sqrt[n]{\sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n+1} \cdot \underbrace{1 \cdots 1}_{n-2}} \\ &\leq \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+1} + \overbrace{1 + \cdots + 1}^{n-2}}{n} \\ &= \frac{2\sqrt{n+1}}{n} + 1 - \frac{2}{n} \\ &< \frac{2\sqrt{n+n}}{n} + 1 \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{n}} + 1, \end{aligned}$$

从而

$$|\sqrt[n]{n+1} - 1| < \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{n}}, \quad \forall n > 2.$$

对任意  $\varepsilon > 0$ , 令  $N = \max \{\frac{8}{\varepsilon^2}, 2\}$ , 则对任意  $n > N$ , 就有

$$|\sqrt[n]{n+1} - 1| < \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{n}} < \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{N}} \leq \varepsilon,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1.$$

(3) 反正切函数

$$y = \arctan x, \quad x \in \mathbb{R}$$

是  $\mathbb{R}$  上的奇函数, 在  $\mathbb{R}$  上严格增并且值域为  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 总有

$$-\frac{\pi}{2} < \arctan n < \frac{\pi}{2},$$

从而

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan n.$$

对任意  $\varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 令  $N = \tan(\frac{\pi}{2} - \varepsilon) > 0$ , 则对任意  $n > N$ , 由反正切函数  $y = \arctan x$  的单调性可知

$$\arctan n > \arctan N = \frac{\pi}{2} - \varepsilon,$$

从而

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan n < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

对任意  $\varepsilon \geq \frac{\pi}{2}$ , 任取  $N \in \mathbb{N}_+$ , 则对任意  $n > N$ , 都有

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan n \leq \varepsilon.$$

综上

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}.$$

(4) 方法 1: 当  $n \geq 4$  时,  $n \geq 2\sqrt{n}$ , 从而  $n - \sqrt{n} \geq \sqrt{n}$ ,

$$\sqrt{n - \sqrt{n}} \geq n^{\frac{1}{4}}, \quad \forall n \geq 4.$$

对任意  $M > 0$ , 令  $N = \max\{4, M^4\} > 0$ , 则对任意  $n > N$ , 有

$$\sqrt{n - \sqrt{n}} \geq n^{\frac{1}{4}} > N^{\frac{1}{4}} \geq M,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n - \sqrt{n}} = +\infty.$$

方法 2: 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 都有  $\sqrt{n} - 1 \geq 0$ , 从而

$$n - \sqrt{n} \geq (n - \sqrt{n}) - (\sqrt{n} - 1) = n - 2\sqrt{n} + 1 = (\sqrt{n} - 1)^2,$$

$$\sqrt{n - \sqrt{n}} \geq \sqrt{n} - 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

对任意  $M > 0$ , 令  $N = (M + 1)^2$ , 则对任意  $n > N$ , 有

$$\sqrt{n - \sqrt{n}} \geq \sqrt{n} - 1 > \sqrt{N} - 1 = M,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n - \sqrt{n}} = +\infty.$$

□

### 作业题 9.2 计算以下数列的极限.

(1)  $a_n = (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2}).$

(2)  $a_n = (1 - \frac{1}{1+2})(1 - \frac{1}{1+2+3}) \cdots (1 - \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}).$  (提示: 先通分最后一个因子, 然后耐心多算几项就可以发现规律.)

(3)  $a_n = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$  (提示:  $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) \frac{1}{k+2} = (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) - (1 - \frac{1}{k+2})(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) = (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) - \frac{1}{k(k+2)} = (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) - \frac{1}{2}(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2})$ )

(4)  $a_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{7} \cdots \frac{n+1}{2n+1}.$

$$(5) a_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1}.$$

**解** (1) 对任意  $k \in \mathbb{N}_+$ , 有

$$1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n} \frac{n+1}{n}.$$

当  $n \geq 3$  时, 就有

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{(n-1)^2}\right) \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{3}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{3} \cdots \frac{n-2}{n-1} \frac{n}{n-1} \frac{n-1}{n} \frac{n+1}{n} \\ &= \frac{1}{2} \frac{n+1}{n}. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

(2) 对任意  $k \in \mathbb{N}_+$  并且  $k \geq 5$ , 有

$$1 - \frac{1}{1+2+3+\cdots+k} = 1 - \frac{2}{k(k+1)} = \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)},$$

从而

$$\begin{aligned} &\frac{(k-4)(k-1)}{(k-3)(k-2)} \cdot \frac{(k-3)k}{(k-2)(k-1)} \cdot \frac{(k-2)(k+1)}{(k-1)k} \cdot \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} \\ &= \frac{k-4}{k-2} \cdot \frac{k+2}{k}. \end{aligned}$$

利用归纳法可证, 当  $n \in \mathbb{N}_+$  并且  $n \geq 5$  时,

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 - \frac{1}{1+2}\right) \left(1 - \frac{1}{1+2+3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}\right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{n+2}{n}. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{3n} = \frac{1}{3}.$$

(3) 对任意  $k \in \mathbb{N}_+$ , 有

$$\begin{aligned} &\frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \frac{1}{k+2} \\ &= \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{k+2}\right) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{k+2}\right) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \frac{1}{k(k+2)} \\ &= \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right). \end{aligned}$$

由归纳法可证,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right), \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{4}.$$

(4) 显然,  $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}_+$ . 另一方面,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)+1} < 1.$$

所以  $\{a_n\}$  单调递减, 并且有下界 0. 根据单调有界定理,  $\{a_n\}$  收敛, 存在  $a \in \mathbb{R}$ , 使得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0.$$

由于

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)+1} a_n,$$

在上式两端令  $n \rightarrow \infty$ , 可得  $a = \frac{1}{2}a$ , 从而  $a = 0$ . 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

(5) 显然,  $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}_+$ . 另一方面, 当  $n \geq 10$  时,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)+9}{2(n+1)-1} < 1.$$

所以去掉前 10 项后,  $\{a_n\}$  单调递减且有下界 0. 根据单调有界定理,  $\{a_n\}$  收敛, 存在  $a \in \mathbb{R}$ , 使得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0.$$

由于

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)+9}{2(n+1)-1} a_n, \quad \forall n \geq 10,$$

在上式两端令  $n \rightarrow \infty$ , 可得  $a = \frac{1}{2}a$ , 从而  $a = 0$ . 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . □

**注** 上面的 (4)(5) 两小题, 也可以看作教材 P38 页第 7 题的特例. 若  $a_n > 0$ , 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{a_{n+1}} = l > 1,$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

### 作业题 9.3 用闭区间套定理证明确界原理.

**证明** 设  $S$  是有上界的实数集,  $M$  是  $S$  的一个上界. 若任取  $x \in S$ ,  $x$  都是  $S$  的上界, 此时  $S$  中只有一个元素  $x$ , 从而  $S$  的上确界存在, 并且  $\sup S = x$ . 下设存在  $m \in S$ , 使得  $m$  不是  $S$  的上界.

记  $a_1 = m, b_1 = M$ . 则  $a_1$  不是  $S$  的上界,  $b_1$  是  $S$  的上界, 并且  $b_1 - a_1 = M - m$ .

令  $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$ . 若  $c_1$  是  $S$  的上界, 则记  $a_2 = a_1, b_2 = c_1$ ; 若  $c_1$  不是  $S$  的上界, 则记  $a_2 = c_1, b_2 = b_1$ . 总之,  $a_2$  不是  $S$  的上界,  $b_2$  是  $S$  的上界, 并且  $b_2 - a_2 = \frac{M-m}{2}$ .

令  $c_2 = \frac{a_2+b_2}{2}$ . 若  $c_2$  是  $S$  的上界, 则记  $a_3 = a_2, b_3 = c_2$ ; 若  $c_2$  不是  $S$  的上界, 则记  $a_3 = c_2, b_3 = b_2$ . 总之,  $a_3$  不是  $S$  的上界,  $b_3$  是  $S$  的上界, 并且  $b_3 - a_3 = \frac{M-m}{2^2}$ .

.....

上述过程一致重复下去, 就得到一列闭区间列  $\{[a_n, b_n]\}$ , 满足

- (i)  $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots$ ;  
 (ii)  $b_n - a_n = \frac{M-m}{2^{n-1}}, \forall n \in \mathbb{N}_+$ ;  
 (iii) 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ ,  $a_n$  不是  $S$  的上界,  $b_n$  是  $S$  的上界.

由 (i)(ii) 可知,  $\{[a_n, b_n]\}$  是一列闭区间套, 根据闭区间套定理, 存在唯一的  $\xi \in \mathbb{R}$  使得

$$\xi \in [a_n, b_n], \quad \forall n \in \mathbb{N}_+,$$

并且

$$\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 有

$$[a_n, b_n] \subset U(\xi, \varepsilon) = (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon). \quad (9.1)$$

下证  $\xi = \sup S$ .

由于  $b_n (n \in \mathbb{N}_+)$  都是  $S$  的上界, 则对任意  $x \in S$ , 有

$$x \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

由数列极限的保不等式性可得

$$x \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi,$$

所以  $\xi$  是  $S$  的一个上界. 设  $\alpha < \xi$  并令  $\varepsilon = \xi - \alpha$ , 则  $\varepsilon > 0$  并且  $\alpha = \xi - \varepsilon$ . 于是, 根据(9.1), 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有

$$a_n > \xi - \varepsilon = \alpha.$$

由于  $a_n$  不是  $S$  的上界, 则  $\alpha$  也不是  $S$  的上界.


综上,  $S$  的上确界存在并且  $\sup S = \xi$ .

同理可证, 任何有下界的实数集必有下确界. □

**总结:**

- 第 1 大题题干要求用数列极限的  $\varepsilon - N$  定义和无穷大数列的定义来验证极限等式, 这里就不能用收敛数列的迫敛性等性质, 要严格按照定义寻找合适的正整数  $N$ .
- 三角函数和反三角函数的定义域、值域、单调性、周期性和图像从网上均可查到.
- 本次作业完成的比较好的同学: **孙景祯**

## 第 10 周

 **作业题 10.1** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+2} - a_n) = a$ , 证明

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{a}{2}$ ; (提示: 利用 Cauchy 命题分别算一下  $\{\frac{a_n}{n}\}$  的偶数子列和奇数子列的极限)
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{n} = 0$ .

**证明** (1) 令  $b_n = a_{2n-1}$ ,  $c_n = a_{2n}$ . 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+2} - a_n) = 0,$$



则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_n) = a = \lim_{n \rightarrow \infty} (c_{n+1} - c_n).$$

再令

$$\begin{aligned} \tilde{b}_1 &= b_1, & \tilde{b}_n &= b_n - b_{n-1} \quad (n \geq 2); \\ \tilde{c}_1 &= c_1, & \tilde{c}_n &= c_n - c_{n-1} \quad (n \geq 2), \end{aligned}$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{b}_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{c}_n$$

并且

$$b_n = \sum_{k=1}^n \tilde{b}_k, \quad c_n = \sum_{k=1}^n \tilde{c}_k, \quad \forall n \geq 2.$$

利用 Cauchy 命题就可得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{n},$$

从而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{2n-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2}a, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{2n} &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{n} = \frac{1}{2}a, \end{aligned}$$

即数列  $\{\frac{a_n}{n}\}$  的奇数子列和偶数子列的极限均为  $\frac{1}{2}a$ , 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{2}a.$$

(2) 由于

$$\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \frac{a}{2} \cdot 1 = \frac{a}{2},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{n} = \frac{a}{2} - \frac{a}{2} = 0.$$

□

### 作业题 10.2 证明

#### 定理 10.1. $\frac{0}{0}$ 型 Stolz 定理

设  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  都是无穷小数列, 并且  $\{a_n\}$  严格减. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l,$$

其中  $l$  可以是实数、 $+\infty$  或  $-\infty$  (不能是  $\infty$ ), 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l.$$



**证明** 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  并且  $\{a_n\}$  严格减, 则

$$a_n > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

I. 当  $l \in \mathbb{R}$  时, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l,$$

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $k \geq N$ , 都有

$$\left| \frac{b_{k+1} - b_k}{a_{k+1} - a_k} - l \right| < \varepsilon,$$

即

$$l - \varepsilon < \frac{b_{k+1} - b_k}{a_{k+1} - a_k} < l + \varepsilon, \quad \forall k \geq N.$$

由于  $a_{k+1} - a_k < 0$  ( $\forall k \in \mathbb{N}_+$ ), 因此

$$(l + \varepsilon)(a_{k+1} - a_k) < b_{k+1} - b_k < (l - \varepsilon)(a_{k+1} - a_k), \quad k \geq N. \quad (10.1)$$

对任意  $m > n \geq N$ , 有  $a_m - a_n < 0$  并且

$$a_m - a_n = \sum_{k=n}^{m-1} (a_{k+1} - a_k), \quad b_m - b_n = \sum_{k=n}^{m-1} (b_{k+1} - b_k),$$

结合(10.1)式就可得

$$(l + \varepsilon)(a_m - a_n) < b_m - b_n < (l - \varepsilon)(a_m - a_n), \quad \forall m, n > N.$$

从而

$$l - \varepsilon < \frac{b_m - b_n}{a_m - a_n} < l + \varepsilon,$$

即

$$\left| \frac{b_m - b_n}{a_m - a_n} - l \right| < \varepsilon, \quad \forall m, n > N. \quad (10.2)$$

由于

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_m = 0 = \lim_{m \rightarrow \infty} b_m,$$

固定(10.2)式中的  $n$ , 并令  $m \rightarrow \infty$  可得

$$\left| \frac{b_n}{a_n} - l \right| = \left| \frac{0 - b_n}{0 - a_n} - l \right| \leq \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l.$$

II. 当  $l = +\infty$  时, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = +\infty,$$

则存在正整数  $N_0$ , 使得对任意  $n \geq N_0$ , 都有

$$\frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} > 0,$$

从而

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} > 0, \quad \forall n \geq N_0 \quad \text{并且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = 0. \quad (10.3)$$

由于  $a_{n+1} - a_n < 0$ , 则

$$b_{n+1} - b_n < 0, \quad \forall n \geq N_0,$$

即  $n \geq N_0$  时,  $\{b_n\}$  是严格减的无穷小数列并且  $b_n > 0$ . 根据(10.3)式以及上一步的结论可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = 0.$$

又因为

$$a_n > 0, \quad b_n > 0, \quad \forall n \geq N_0,$$

则易证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = +\infty.$$

III. 当  $l = -\infty$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = -\infty.$$

令  $c_n = -b_n$ , 则易证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1} - c_n}{a_{n+1} - a_n} = +\infty.$$


由上一步的结论可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{a_n} = +\infty,$$

由此可证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = -\infty.$$

□


 **作业题 10.3** 利用 Stolz 定理计算以下数列的极限:

$$(1) \quad a_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n^\alpha}, \text{ 其中 } \alpha > 0.$$

$$(2) \quad a_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n}.$$

$$(3) \quad a_n = \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}.$$

$$(4) \quad a_n = n \left( \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} - \frac{1}{k+1} \right), \text{ 其中 } k \text{ 为正整数}.$$

 **注意** 本题第 (1) 题处理  $0 < \alpha < 1$  的情形的方法稍微超纲, 同学们可以学完第 6 章第 1 节后再看.

**解** (1) 显然  $\{n^\alpha\}$  是严格增的正无穷大列.

(i) 当  $\alpha \geq 1$  时, 有

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\frac{1}{n+1}}{(n+1)^\alpha - n^\alpha} \\ &= \frac{1}{(n+1)n^\alpha \left[ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right]} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)n^\alpha \left[ \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right]} \\ &= \frac{1}{n^\alpha \left(1 + \frac{1}{n}\right)} \\ &< \frac{1}{n^\alpha}. \end{aligned}$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ , 则由数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{(n+1)^\alpha - n^\alpha} = 0 \quad (\alpha \geq 1).$$

(ii) 当  $0 < \alpha < 1$  时, 根据微分中值定理, 存在  $\theta \in (0, 1)$ , 使得

$$(n+1)^\alpha - n^\alpha = \alpha(n+\theta)^{\alpha-1} = \frac{\alpha}{(n+\theta)^{1-\alpha}} > \frac{\alpha}{(n+1)^{1-\alpha}},$$

从而

$$0 < \frac{\frac{1}{n+1}}{(n+1)^\alpha - n^\alpha} < \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{\alpha}{(n+1)^{1-\alpha}}} = \frac{\alpha}{(n+1)^\alpha}.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{(n+1)^\alpha} = 0,$$

则由数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{(n+1)^\alpha - n^\alpha} = 0 \quad (0 < \alpha < 1).$$

综上, 利用 Stolz 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{(n+1)^\alpha - n^\alpha} = 0.$$

(2) 易证  $\{\ln n\}$  是严格增的正无穷大数列. 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 有

$$\frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(n+1) - \ln n} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{n}{n+1} \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ , 根据数列极限的保号性, 对任意  $\varepsilon \in (0, 1)$ , 存在正整数  $N$ , 使得对任意  $n > N$ , 都有

$$e^{1-\varepsilon} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e^{1+\varepsilon},$$

从而

$$1 - \varepsilon < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 + \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1$ . 又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = 1.$$

根据 Stolz 定理, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(n+1) - \ln n} = 1.$$

(3) 由于

$$\frac{(n+1)!}{(n+1)! - n!} = \frac{n+1}{(n+1) - 1} = \frac{n+1}{n},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)! - n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1.$$

由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)! - n!} = 1.$$

(4) 对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 有

$$a_n = n \left( \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{(k+1)(1^k + 2^k + \cdots + n^k) - n^{k+1}}{(k+1)n^k}.$$

设

$$b_n = (k+1)(1^k + 2^k + \cdots + n^k) - n^{k+1}, \quad c_n = (k+1)n^k,$$

则

$$\begin{aligned} & b_{n+1} - b_n \\ &= (k+1)(n+1)^k - (n+1)^{k+1} + n^{k+1} \\ &= (k+1) \left( n^k + kn^{k-1} + \cdots + 1 \right) - \left[ n^{k+1} + (k+1)n^k + \frac{k(k+1)}{2}n^{k-1} + \cdots + 1 \right] + n^{k+1} \\ &= \frac{k(k+1)}{2}n^{k-1} + \cdots + k, \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} & c_{n+1} - c_n \\ &= (k+1)(n+1)^k - (k+1)n^k \\ &= (k+1) \left[ n^k + kn^{k-1} + \cdots + 1 \right] - (k+1)n^k \\ &= k(k+1)n^{k-1} + \cdots + (k+1), \end{aligned}$$


于是  $b_{n+1} - b_n$  和  $c_{n+1} - c_n$  都是关于  $n$  的  $k-1$  次多项式, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1} - c_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{k(k+1)}{2}n^{k-1} + \cdots + k}{k(k+1)n^{k-1} + \cdots + (k+1)} = \frac{1}{2}.$$

由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1} - c_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{1}{2}.$$

□

 **作业题 10.4** 设数列  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ , 证明

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2^k a_2 + 3^k a_3 + \cdots + n^k a_n}{n^{k+1}} = \frac{a}{k+1}, \text{ 其中 } k \text{ 为非负整数}.$$

**证明** (1) 设  $b_n = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n$ ,  $c_n = n^2$ , 则

$$b_{n+1} - b_n = (n+1)a_{n+1}, \quad c_{n+1} - c_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1,$$

从而

$$\frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = \frac{n+1}{2n+1} \cdot a_{n+1}.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \frac{1}{2}a.$$

根据 Stolz 定理就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = \frac{a}{2}.$$

(2) 当  $k = 0$  时, 由 Cauchy 命题可知结论成立; 当  $k = 1$  时, 由本题 (1) 可知结论也成立. 下面假设  $k \geq 2$ . 设  $b_n = a_1 + 2^k a_2 + 3^k a_3 + \cdots + n^k a_n$ ,  $c_n = n^{k+1}$ , 则

$$b_{n+1} - b_n = (n+1)^k a_{n+1},$$

$$c_{n+1} - c_n = (n+1)^{k+1} - n^{k+1} = (k+1)n^k + \frac{k(k+1)}{2}n^{k-1} + \cdots + 1.$$


由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k}{(k+1)n^k + \frac{k(k+1)}{2}n^{k-1} + \cdots + 1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \\ &= \frac{1}{k+1} \cdot a. \end{aligned}$$

根据 Stolz 定理就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = \frac{a}{k+1}.$$

□

 **作业题 10.5** 给出以下函数极限等式的严格定义.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty.$$

(第 1 步, 先指明函数  $f$  在何种形式的范围内有定义.)

**解** (1) 设函数  $f$  在  $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$  内有定义. 若对任意  $M < 0$ , 存在  $N > 0$ , 使得  $N \geq b$ ,  $-N \leq a$  并且对任意  $x: |x| > N$ , 都有

$$f(x) < M,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty.$$

(2) 设函数  $f$  在  $(-\infty, a)$  内有定义. 若对任意  $M > 0$ , 存在  $N \leq a$ , 使得对任意  $x < N$ , 都有

$$|f(x)| > M,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty.$$

(3) 设函数  $f$  在  $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$  内有定义. 若对任意  $M > 0$ , 存在  $N > 0$ , 使得  $N \geq b$ ,  $-N \leq a$  并且对任意  $x: |x| > N$ , 都有

$$|f(x)| > M,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

(4) 设函数  $f$  在  $x_0$  的某去心邻域  $U^\circ(x_0; \delta')$  内有定义. 若对任意  $M < 0$ , 存在正数  $\delta (< \delta')$ , 使得

$$\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta,$$

都有

$$f(x) < M,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty.$$

□

### 总结:

1. 许多同学对课本内容掌握不熟, 例如 P30 例 4 有理分式求极限的问题, 该题的结论可以直接用 (但是要注意前提条件).
2. 只有极限存在时, 才能用四则运算法则, 先确定极限是否存在, 再去做加减乘除.
3. 求极限时, 最好不要一开始就写极限符号 “lim”, 先处理要求极限的数列或函数, 处理完后再用极限符号.