

%两个VAR模型的比较

t=1992:2008;

A=[9.4178E-06 2.49147E-08

4.32506E-06 7.02785E-07

9.77019E-06 7.36726E-06

0.000170712 2.59967E-05

5.09438E-06 7.61361E-08

6.88741E-06 3.68919E-07

1.27311E-05 1.04256E-06

3.39226E-06 8.49731E-07

3.59764E-06 8.22186E-07

6.02222E-06 6.4645E-07

4.31995E-08 1.78215E-07

7.6171E-06 2.34062E-06

1.57922E-05 1.11079E-06

1.75299E-05 1.14208E-08

4.13498E-05 3.31378E-06

6.03391E-05 1.11411E-05

1.74103E-09 1.12341E-05

];

plot(t,A(:,1),'-*r',t,A(:,2),'-ob');

%两个VAR模型的误差散点图

xlabel('Ŷ');

ylabel('Ŷ²');

legend('VAR1','VAR2')

s=std(A)./mean(A);

s1=s(1);

%VAR1模型误差的变异系数

s2=s(2);

%VAR2模型误差的变异系数

SR=sum(A.^2);

SR1=SR(1);

%VAR1模型的误差平方和

SR2=SR(2);

%VAR2 模型的误差平方和