

报告阅读指南

i 本宏基因组报告旨在为您提供肠道微生物群落的全面分析与深入理解。以下内容涵盖了宏基因组的基本概念、技术解析和注意事项。

? 什么是肠道菌群的宏基因组？和16S有什么区别？

💡 肠道菌群的宏基因组是指从肠道微生物群体中提取的所有微生物（包括细菌、古菌、真菌和病毒等）的遗传物质（DNA）进行分析与研究的领域。宏基因组分析提供了更为详尽和全面的微生物谱系信息，能够揭示真菌和病毒的存在，并识别毒理和耐药基因。而16S rRNA主要集中于分类学信息的分析，在样本积累和数据库支持方面更为丰富。

⚠️ 特别注意：本报告采用高通量测序技术对肠道菌群进行宏基因组检测，并利用大数据和人工智能技术对各项指标进行评估。以下是您阅读报告前需注意的事项：

- **结果的解读并非绝对：**
 - 报告中的数据和结果只是对您肠道菌群的一个快照，它们可能会受到多种因素的影响，如饮食、生活方式、地理环境等。因此，请保持对结果的审慎态度，不要将其视为绝对的健康指标。
- **技术和方法的限制：**
 - 尽管高通量测序和人工智能技术能提供强大的分析能力，但这些技术也有局限性。
- **临床相关性并不确定：**
 - 报告可能会提到与某些健康状况的相关性，但关联并不等于因果关系。个别结果需结合您的整体健康状况和其他临床因素进行判断，而不是单一指标决定健康状况。
- **避免过度解读：**
 - 有些微小的变化可能并不具有临床意义。
- **跟踪研究的重要性：**
 - 肠道菌群是动态的，定期监测和跟踪会提供更好的健康状态评估。单次测试结果的意义有限，尤其是在没有长期数据对比的情况下。

宏基因组检测报告

姓名

阎淑芳

性别

女性

年龄

65岁

样本编号

608076970

报告日期

2025-03-16

健康总分



整体健康状况不佳有疾病高风险

菌群健康




肠道菌群多样性良好

慢病控制




慢性疾病风险较低

营养均衡



营养摄入基本均衡

肠道年龄



当肠道菌群反映的年龄大幅偏离真实年龄时通常代表您的肠道菌群出现了紊乱、存在疾病风险或发育滞后

肠型

类型 A

拟杆菌型

类型 B

普雷沃氏菌型

类型 C (您的类型)

厚壁菌型

健康总分解读

i 健康总分的满分为100分。在评估健康总分时，综合了三个部分：**肠道菌群健康状况**、**疾病风险情况**和**营养均衡饮食情况**综合评估计算，并采用扣分制，具体包括因疾病风险、营养不均衡和菌群失衡等因素而导致的相应减分。

- 常见的健康分数范围：20分-90分
- 人群平均健康得分：**75分**
- 数据库中最高健康得分：**93分**

您的健康总分

48/100

三项分值的标准



90-95分

表明极好的健康状况，菌群和营养都非常均衡。



80~90分

表明很健康，适当针对性改善营养饮食即可。



70~80分

属于健康状态，但是需要注意调整不良的生活方式和注意营养饮食均衡。



60~70分

属于亚健康，可能有疾病风险需要注意，营养和生活方式也存在不合理。



50~60分

表明存在个别疾病高风险或较多疾病提示注意，已有慢性疾病状态，需要针对性检查和治疗，此外生活方式也可能存在不良状态。



40~50分

表明至少有一项疾病处于高风险状况，整体健康状况不佳，请进行医疗检查并马上纠正生活方式。



低于40分

表明有多项疾病风险或某种疾病程度较为严重，强烈建议进行复查或进行治疗。

肠道年龄解读

i 肠道预测年龄是基于超过 6 万人群队列的深度学习模型构建的，通过识别每个年龄段的核心和标志性菌群特征进行分析预测。伴随年龄的变化肠道菌群也会相应的改变，当肠道菌群反映的年龄大幅偏离真实年龄时通常代表您的肠道菌群出现了紊乱、存在疾病风险或发育滞后。例如：

- 肠道年龄远小于生理年龄：可能意味着菌群发育滞后。
- 肠道年龄远大于生理年龄：可能意味着菌群多样性下降或致病菌增多。

肠道年龄

72.06 岁

不同年龄段的正常偏差范围

0-2岁儿童

偏差小于3个月

这个阶段是肠道菌群发育的初始阶段，菌群组成随着婴儿的成长和饮食变化而迅速变化。

3-5岁儿童

偏差在6个月以内

幼儿期肠道菌群逐渐稳定，但仍然受饮食和环境因素影响较大，比婴儿期更稳定。

6-15岁儿童

偏差在1岁左右

学龄期和青春期前的儿童肠道菌群结构更加稳定，但仍在不断发育完善。

16-50岁人群

正常偏差在3岁以内

成年期肠道菌群相对稳定，但工作压力、生活方式和饮食习惯的变化仍会影响菌群结构。

50岁以上

正常偏差在5岁以内

在正常偏差内年轻差异可以理解为年轻或衰老，超出正常偏差的年龄无论超过或低于都可能是菌群异常或健康状况不佳。

80岁以上

特殊情况

高龄期肠道菌群特征独特，参考数据主要来自长寿人群的样本。肠道年龄通常不宜意味着衰老，因为高龄队列主要来自长寿老人的样本。

评估指标总结

肠道整体评估16项10 / 16 项正常

全面分析评估您的肠道基础生理功能

- 偏低

代谢健康, 肠道屏障, 草酸盐代谢, 有益菌, 菌群恢复力
- 偏高

肠道产气

慢病风险评估18项10 / 18 项低风险

全面评估您的慢性疾病潜在风险, 提前预警健康隐患。

- 中等风险

结直肠癌, II型糖尿病
- 需注意

感染型腹泻, 肝病, 胆病, 抑郁症, 老年痴呆, 帕金森

饮食营养评估32项25 / 32 项正常

全面分析您的日常饮食结构和营养摄入情况, 识别潜在的营养缺陷和不平衡。

- 日常饮食

缺乏

纤维

缺乏

乳制品

不足

锌

过量

盐
- 维生素

缺乏

叶酸

不足

A
- 氨基酸

过量

丝氨酸

菌群代谢物评估22项18 / 22 项正常

全面评估肠道菌群代谢活动, 深入洞察营养转化、免疫调节和代谢健康的微生物网络。

- 偏低

γ-氨基丁酸, 丙酸盐
- 偏高

血清素, 雌激素

炎症免疫评估20项16 / 20 项正常

解析炎症免疫分子标志物, 全面评估机体免疫平衡和慢性炎症风险。

- 免疫指标

偏低

IgM, 白蛋白
- 炎症感染

偏高

高敏C反应蛋白 (心脑血管炎症指标)
- 菌群代谢

正常

菌群代谢指标均在参考范围内

检测指标总结

常见肠道细菌 184项

157 / 184 项检测丰度在参考范围内

全面分析评估您的肠道基础生理功能

核心菌属	13 / 21 项检测丰度在参考范围内
非核心重要菌属	9 / 12 项检测丰度在参考范围内
常见有益菌属	47 / 54 项检测丰度在参考范围内
常见有害菌属	12 / 17 项检测丰度在参考范围内
常见机会致病菌属	22 / 25 项检测丰度在参考范围内
常见致病菌属	54 / 55 项检测丰度在参考范围内

常见肠道真菌 17项

1 / 17 项检出

全面分析评估您的肠道基础生理功能

常见肠道寄生虫 38项

0 / 38 项检出

全面分析评估您的肠道基础生理功能

肠道病毒 0项

0 / 0 项检出

全面分析评估您的肠道基础生理功能

疾病症状相关菌 156项

97 / 156 项检测丰度在参考范围内

揭示肠道微生物组失衡与临床症状的内在关联机制

肥胖相关菌	34 / 45 项检测丰度在参考范围内
便秘相关菌	21 / 29 项检测丰度在参考范围内
腹胀相关菌	7 / 14 项检测丰度在参考范围内
过敏相关菌	14 / 28 项检测丰度在参考范围内
抑郁相关菌	16 / 29 项检测丰度在参考范围内
失眠相关菌	5 / 11 项检测丰度在参考范围内

耐药基因检测 23项

23 / 23 项检出

全面解析抗生素耐药基因谱系，预测个体药物敏感性和潜在治疗风险。

reads数量 TOP3: catA13 | 24400 | 氯霉素 aadE | 9600 | 氨基糖苷类 tet(40) | 6600 | 四环素

毒力基因检测 34项

0 / 35 项检出

深入解析致病菌毒力基因，全面评估您的微生物组潜在致病风险和抗性特征。

肠道整体评估

i 本部分总结了您本次肠道菌群检测的整体关键指标，主要涵盖以下两个核心维度：

- **肠道基础功能：**评估肠道的基本生理功能，包括：
 - 蛋白质发酵能力：测定肠道中细菌对蛋白质的发酵和利用能力，反映肠道微生物的代谢功能。
 - 消化吸收效率：评估肠道对营养物质的消化与吸收能力，影响整体营养状态。
 - 肠道产气情况：监测肠道气体的生成量，过量气体可能提示消化不良或肠道菌群失衡。
 - 肠道屏障完整性：评估肠道粘膜的健康状况，影响体内物质的吸收和免疫反应。
 - 肠道炎症状态：评估肠道内的炎症反应，可能与各种消化系统疾病关联。
- **肠道菌群整体：**评估肠道菌群的整体功能状态，包括：
 - 菌种数量：反映肠道中微生物菌种的多样性，多样性越高，通常代表健康的肠道环境。
 - 菌群多样性：评估不同类型菌群的存在比例，有助于判断肠道生态平衡。
 - 肠道菌群平衡：分析有益菌与有害菌的比例，维持平衡对健康至关重要。
 - 菌群恢复力：衡量菌群在遭受外部干扰后恢复到正常状态的能力，表示肠道的抗压能力。
 - 有益菌和有害菌的比例：评估有益菌（如乳酸菌）与有害菌（如病原菌）的相对数量，直接影响健康。
 - 革兰氏阴性菌和好氧菌的分布：分析不同类别细菌的比例，帮助了解肠道生态及其对健康的影响。

? 理想且健康的肠道状态是怎样的？

💡 理想而健康的肠道不仅依赖于合理、丰富且平衡的菌群构成，还需要具备完善的基础功能。这些功能和菌群状态相辅相成，共同维系肠道的健康与稳定。

肠道基础功能评估

下列各项评估了您的肠道的基础生理功能。

肠道基础功能项目	参考范围	评估数值	结果评价
蛋白发酵 Protein fermentation	0-70	30	正常
过高表示大量蛋白质未在小肠充分吸收进入结直肠，引发肠道菌群的蛋白质代谢，需要调整蛋白摄入方式。			
消化效率 Digestive Efficiency	25-100	99	正常
综合评估菌群对多种营养物质的消化效率和利用率，过低通常存在消化不良。			
肠道产气 Intestinal Gas Production	0-70	93 ↑	产气过度
过高表示菌群具有很高的产气水平，可能会引发消化道症状，异常需要适度控制高产气食物和调整菌群。			
肠道屏障 Intestinal Barrier	25-100	12 ↓	屏障破坏
评估菌群参与的肠道屏障水平，肠道屏障帮助抵御病原感染和炎症或过敏。			
肠道炎症 Intestinal Inflammation	0-75	54	正常
反映肠道内炎症水平，过高可能伴随感染或消化道症状，长期慢性炎症也会诱发代谢和其他疾病。			
代谢健康 Metabolic health	25-100	5 ↓	代谢异常
评估与代谢健康相关的水平，包括血糖和代谢综合征，一般肥胖、糖尿病或缺乏运动会偏低。			
草酸盐代谢 Oxalate metabolism	25-100	13 ↓	草酸累积
过低表明菌群转化草酸盐的代谢能力不足，可能会导致草酸钙积累引发肾结石，建议控制高草酸食物摄入或焯水后食用。			

肠道菌群整体评估

下列各项对您的肠道菌群进行了整体性评估。

肠道菌群整体项目	参考范围	评估数值	结果评价
菌种数量 Gut microbial count	200-2500	883	正常
菌种数量，随发育增加，过低说明菌群多样性太低，过高表明存在较多非肠道常见菌，可能有感染。			
菌群多样性 Gut microbial diversity	15-95	80	正常
多样性水平表明肠道菌群的构成分布的均衡程度以及种类的多样性，过低和过高都不理想。			
肠道菌群平衡 Gut microbiota balance	15-100	27	正常
过低表明存在菌群失衡，正常肠道菌群占比过低，部分机会致病菌或病原菌过高，益生菌缺乏。			
菌群恢复力 Gut microbial resilience	25-100	4 ↓	菌群不稳定
高表示抗生素使用后整个菌群更易恢复回使用前的状态，低表示菌群构成很容易发生变化。			
生物膜形成 Biofilm Formation	0-0.5	0.1	正常
高表示菌群具有较强的生物膜形成能力。			
有益菌 Beneficial bacteria	16-100	6 ↓	缺乏
包括双歧杆菌、乳杆菌、粪栖杆菌、AKK菌等有助于肠道健康的菌，不仅仅是益生菌。			
有害菌 Pathogenic bacteria	0-84	46	正常
机会致病菌和病原菌，过高表示可能存在病原菌过多或消化道感染的风险。			
革兰氏阴性菌 Gram-negative bacteria	0-0.4	0.14	正常
肠道菌群主要以阳性菌为主，阴性菌一般是病原菌较多。			
好氧菌 Aerobic bacteria	0-0.3	0.02	正常
肠道菌群绝大部分厌氧，出现好氧菌过多一般也是病原菌入侵或肠道菌群紊乱的情况。			

慢病风险评估阅读指南

❓ 慢病的风险是如何评估的？

💡 肠道菌群与多种疾病密切相关，涵盖消化系统、免疫系统、神经系统、代谢紊乱以及心脑血管疾病。此外，研究还发现肠道菌群与呼吸系统疾病及多种类型的肿瘤之间也存在关联。通过分析数十万例临床和人群样本数据，并结合机器学习技术，我们针对多种疾病运用肠道菌群数据进行疾病状态及风险的预测，且提供了相应的风险概率。

❓ 如何阅读慢病风险评估的表格？

💡 以下是对慢病风险评估的表格中的各部分信息进行的说明解释：

- **慢病名称：** 这一列列出进行风险评估的慢病名称。
- **风险评估数值：** 此列显示该慢病的具体风险评估数值，以0-1之间的小数和进度条显示（进度条中的刻度代表了四个风险等级所对应的区间）。
- **风险评估结果：** 这一列显示该慢病的风险评估值经过预设的4个风险等级区间比较后所得到的对应的风险评估等级，4个预设的风险等级区间定义如下：

0-0.3: 低风险 | 0.3-0.5: 注意 | 0.5-0.7: 中等风险 | 0.7-1.0: 高风险

❓ 评估结果易受到自身的一些疾病症状或者环境影响吗？



❓ 如何对待不同慢病评估的风险值？



⚠️ **特别注意：** 慢病相关风险评估结果旨在提供参考信息，不能作为疾病诊断或治疗的唯一依据。慢性疾病的发生和发展通常受到多种因素（如生活方式、遗传因素、环境因素等）的综合影响，检测结果需结合个人的实际情况、其他医学检查和专业医生的建议进行综合评估。分析结果中提及的风险相关性仅为可能性参考，不能直接等同于因果关系或作为健康状况的绝对判断依据。如果出现与相关慢病风险相关的异常症状或健康问题，请务必及时咨询医生，以确保获得科学、准确的诊断和适当的治疗或干预方案。

慢病风险评估

❶ 下列表格展示了各项慢病风险水平的评估标准以及您各型慢病风险评估数据（以风险评估等级递减排序）。


风险评估参考标准



评估慢病名称	风险评估数值	风险评估结果
II型糖尿病 Type 2 Diabetes	0.56	中等风险
❶ 您的风险为中等风险，该分值段可能是近期生活方式不当或其他疾病导致风险上升，也可能由于其他疾病干扰。如果分值接近0.7表示较大可能存在糖尿病，需要及时关注。		
结直肠癌 Colorectal Cancer	0.51	中等风险
❶ 您的结直肠癌风险为中等风险，该分值段表示可能为息肉或结直肠癌，其他疾病存在一定可能导致该风险上升至0.5左右，如果分值接近0.7表示为结直肠癌较高概率，如果存在大便秘状改变、便血或腹痛等情况需要及时关注。		
老年痴呆 Alzheimer's disease	0.46	注意
❶ 您的风险为注意，该分值段可能是近期生活方式不当导致风险上升，也可能由于其他疾病干扰。如果分值接近0.5表示出现认知退化风险较高。		
帕金森 Parkinson's disease	0.38	注意
❶ 您的风险为注意，该分值段可能是近期生活方式不当导致风险上升，也可能由于其他疾病干扰。如果分值接近0.5表示出现帕金森风险较高。		
感染型腹泻 Infectious Diarrhea	0.34	注意
❶ 您的风险为注意，该分值段可能是近期生活方式不当或其他疾病导致风险上升，也可能由于其他疾病干扰，如果分值接近0.5表示存在感染型腹泻风险的风险，如果存在腹泻、便血或反复腹痛等情况需要及时关注。		
胆病 Gallbladder Disease	0.34	注意
❶ 您的风险为注意，该分值段可能是近期生活方式不当或其他疾病导致风险上升，也可能由于其他疾病干扰，部分健康人也会有一定概率处于该分值段。如果分值接近0.5表示存在一定的胆病风险。		

抑郁症

Depression




注意

您的风险为注意，该分值段可能是近期生活方式不当导致风险上升，部分血糖控制良好的患者以及健康人也会有一定比例处于该分值段。如果分值接近0.5表示存在一定的糖尿病风险。

肝病

Liver Disease




注意

您的风险为注意，该分值段可能是近期生活方式不当或其他疾病导致风险上升，也可能由于其他疾病干扰，部分健康人也会有一定概率处于该分值段。如果分值接近0.5表示存在肝病的风险。

心脑血管疾病

CVD




低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及发生心脑血管风险因素。

胃病

Gastric Disease




低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及胃病风险因素。

炎症性肠炎

IBD




低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及炎症性肠炎风险因素。

肠易激综合征

IBS




低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及肠易激综合征风险因素。

肺部疾病

Lung Disease




低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及避免肺部疾病风险因素。

甲状腺疾病

Thyroid Disease




低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及发生甲状腺疾病风险因素。

肾病

Kidney Disease




低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及避免肾病风险因素。

自体免疫疾病

Autoimmune Disease




低风险

您的风险值在0.3以下，自体免疫性疾病风险较低，绝大部分健康人分值均在0.3以下，但也有部分患者位于0.2~0.3之间。

肠道病毒感染


Intestinal Viral Infection



低风险

您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及肠道病毒感染风险因素。

过敏性腹泻
Allergic Diarrhea



低风险

 您的风险值在0.3以下，风险较低，如果分值接近0.3仍然需要注意生活方式以及食物过敏或不耐受的风险因素。

日常饮食和微量元素评估

i 糖、盐、膳食纤维和乳制品是人体日常饮食中重要的营养成分，对维持人体基本生理功能和健康发挥着关键作用。本报告将通过肠道菌群等检测指标，全面评估这些营养成分在人体中的代谢水平和整体状况。

饮食评估指标	参考范围（缺乏-不足-过量）	评估数值	评估结果
糖 Sugar	0-0-75	57	正常
盐 Salt	0-0-75	83 ↑	过量
纤维 Dietary Fiber	20-20-33	13.78 ↓	缺乏
i 纤维素的摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可增加其他主要营养摄入，均衡的营养配比更健康。			
乳制品 Dairy Products	15-15-95	11 ↓	缺乏
i 乳制品的摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5为过少，低于15为偏少。			
铁 Iron	8-15-50	21.54	正常
i 成年人摄入水平建议保持在15~50mg每天之间最佳，低于8属于缺乏，低于15属于偏少。			
锌 Zinc	6-12-37	9.71 ↓	不足
i 成年人建议摄入水平建议保持在12~37mg每天之间最佳，低于6属于缺乏，低于12属于偏少。			

维生素评估

维生素评估指标	参考范围（缺乏-不足-过量）	评估数值	评估结果
维生素A Vitamin A	350-700-2000	521.17 ↓	不足
i 成年人摄入水平建议在700-2000mcg，低于350mcg属于缺乏，低于700mcg属于偏少，高于2000mcg可适当减少摄入。			
维生素B1 Vitamin B1	0.75-1.3-50	1.58	正常
i 成年人摄入水平建议在1.3-50mg，低于0.75mg属于缺乏，低于1.3mg属于偏少。			
维生素B2 Vitamin B2	0.6-1.2-100	1.64	正常
i 成年人摄入水平建议在1.2-100mg每日，低于0.6mg属于缺乏，低于1.2mg属于偏少。			
维生素B6 Vitamin B6	0.6-1.2-100	1.51	正常
i 成年人摄入水平建议在1.2~100mg每日，低于350mcg属于缺乏，低于700mcg属于偏少，高于2000mcg可适当减少摄入。			
维生素B12 Vitamin B12	1.2-2.4-50	3.75	正常
i 摄入水平建议保持在2.4-50mg每日之间最佳，低于1.2mg属于缺乏，低于2.4mg属于偏少。			
维生素B9 (叶酸) Folic Acid	200-400-1000	134.17 ↓	缺乏
i 摄入水平建议保持在400~1000ug每日之间最佳，低于200ug属于缺乏，低于400ug属于偏少。			
维生素C Vitamin C	50-100-1000	217.05	正常
i 摄入水平建议保持在100~1000mg每日之间最佳，低于50mg属于缺乏，低于100mg属于偏少。			
维生素D Vitamin D	20-30-150	45.46	正常
i 维生素D水平建议保持在30~150之间最佳，低于20属于缺乏，低于30属于偏少。			
维生素E Vitamin E	7-14-100	17.35	正常
i 水平建议保持在14~100mg每日之间最佳，低于7mg属于缺乏，低于14mg属于偏少。			

维生素K

Vitamin K

7-15-100

30

正常

 水平建议保持在14~100mg每日之间最佳，低于7mg属于缺乏，低于14mg属于偏少。

氨基酸评估

i 氨基酸是蛋白质的基本构建单位，在人体内参与多种重要的生理功能。人体所需的 20 种氨基酸中，9 种必需氨基酸需要从食物中获取，其余可由人体自身合成。氨基酸评估可以反映蛋白质营养状况以及代谢功能等。

氨基酸评估指标	参考范围（缺乏-不足-过量）	评估数值	评估结果
苏氨酸 Threonine	6-6-98	80	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			
异亮氨酸 Isoleucine	6-6-98	86	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			
亮氨酸 Leucine	6-6-98	65	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。肾功能障碍患者需要避免大量摄入亮氨酸。			
赖氨酸 Lysine	6-6-98	18	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			
蛋氨酸 Methionine	6-6-98	93	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			
半胱氨酸 Cysteine	6-6-98	17	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			
苯丙氨酸 Phenylalanine	6-6-98	35	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			
酪氨酸 Tyrosine	6-6-98	76	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			
缬氨酸 Valine	6-6-98	92	正常
i 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。			

组氨酸 Histidine	6-6-98	54	正常
------------------	--------	----	----

 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。

丙氨酸 Alanine	6-6-98	42	正常
----------------	--------	----	----

 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。

谷氨酸 Glutamic Acid	6-6-98	48	正常
----------------------	--------	----	----

 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。

甘氨酸 Glycine	6-6-98	11	正常
----------------	--------	----	----

 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。

脯氨酸 Proline	6-6-98	37	正常
----------------	--------	----	----

 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。

丝氨酸 Serine	6-6-98	98 ↑	过量
---------------	--------	------	----

 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。

色氨酸 Tryptophan	6-6-98	68	正常
-------------------	--------	----	----

 摄入水平建议保持在70~80之间最佳，低于5属于缺乏，低于15属于偏少，高于95可适当减少摄入。

菌群代谢物评估

i 菌群代谢物和神经递质是肠道微生物与宿主相互作用的重要媒介，已发现数百种不同的活性分子。这些代谢物在维持肠道健康和影响宿主生理功能方面发挥着关键作用。健康成年人肠道中的主要代谢产物包括短链脂肪酸（SCFAs）、胆汁酸、色氨酸代谢物和神经递质等。以下是对这些代谢物的详细介绍。

菌群代谢物名称	参考范围	评估数值	评估结果
丁酸盐 Butyrate	15-98	31	正常
i 短链脂肪酸，由肠道菌群通过发酵膳食纤维产生，为结肠细胞提供主要能量来源，维持肠道屏障完整性，具有抗炎和抗肿瘤作用。 · 超标的影响：肠溃疡、直肠炎 · 偏低的影响：自闭症、焦虑症、IBD			
γ-氨基丁酸 GABA	15-95	13 ↓	偏低
i 主要抑制性神经递质，由谷氨酸脱羧酶作用于谷氨酸形成，调节神经系统活动，促进放松，减轻焦虑，改善睡眠质量。 · 超标的影响：肌无力、焦虑症 · 偏低的影响：焦虑、失眠、抑郁、自闭、多动症			
谷氨酸 Glutamate	15-95	48	正常
i 最丰富的兴奋性神经递质，参与神经突触传递，对学习、记忆和认知功能至关重要，同时也是多种神经递质的前体物质。 · 超标的影响：自闭、精神分裂、多动症、偏头痛、癫痫 · 偏低的影响：神经衰弱			
丙酸盐 Propionate	15-98	13 ↓	偏低
i 短链脂肪酸，肠道菌群代谢产物，调节食欲和能量代谢，降低血糖和胆固醇水平，具有抗炎作用，参与肠-脑轴通讯。 · 超标的影响：癫痫、自闭症、糖尿病 · 偏低的影响：暂无数据			
对甲酚 p-Cresol	0-85	77	正常
i 由肠道菌群代谢酪氨酸产生的芳香族化合物，高浓度时可作为尿毒症毒素，影响肠道屏障和神经发育，与多种疾病相关。 · 超标的影响：尿毒症毒素、慢性肾病、神经行为疾病、结直肠癌、自闭症、慢性便秘 · 偏低的影响：暂无数据			
血清素 5-HT	20-95	99 ↑	超标
i 重要的神经递质和激素，调节情绪、睡眠、食欲和疼痛感知，肠道中产生的5-HT占体内总量的90%，参与肠道蠕动和免疫调节。 · 超标的影响：癫痫、心率不齐 · 偏低的影响：焦虑、抑郁、失眠、社交恐惧、纤维肌痛			

乙酸盐
Acetate

15-98

39

正常

i

最丰富的短链脂肪酸，被肝脏、肌肉和脑部利用产生能量，调节食欲和能量代谢，具有抗炎和免疫调节作用。

• 超标的影响：支气管炎、慢性咽炎

• 偏低的影响：暂无数据

异戊酸盐
Isovaleric

5-98

64

正常

i

支链短链脂肪酸，由特定菌群代谢支链氨基酸产生，高浓度时可能具有神经毒性，影响能量代谢和神经系统功能。

• 超标的影响：神经受损、癫痫、体重增长

• 偏低的影响：暂无数据

色氨
Tryptophan

5-90

68

正常

i

必需氨基酸，是血清素和烟酸的前体，参与调节情绪、睡眠和免疫功能，肠道菌群可影响其代谢途径，进而影响宿主健康。

• 超标的影响：心率过速、神志失常

• 偏低的影响：抑郁、失眠、糙皮病、自杀倾向

DOPAC

10-95

81

正常

i

多巴胺的主要代谢产物，反映多巴胺的代谢和转换情况，与多巴胺能神经功能和神经退行性疾病相关，是评估多巴胺系统活性的指标。

• 超标的影响：暂无数据

• 偏低的影响：抑郁

雌激素
Estrogen

10-95

97 ↑

超标

i

性激素，由肠道菌群参与代谢和循环，影响生殖系统、骨骼健康、心血管系统和神经系统功能，肠道菌群可调节其活性。

• 超标的影响：月经不调、焦虑、不育

• 偏低的影响：抑郁、失眠、偏头痛、月经不调、骨质疏松

多巴胺

5-95

90

正常

i

重要的神经递质，参与奖励和动机系统，调节运动功能、情绪和认知过程，肠道菌群可通过多种途径影响其合成和代谢。

• 超标的影响：精神分裂、上瘾、失眠、偏执

• 偏低的影响：抑郁、帕金森、精神分裂

组胺
Histamine

5-95

92

正常

i

生物活性胺，由肠道菌群和宿主细胞产生，参与免疫应答、胃酸分泌和神经传递，过量可引起过敏反应和炎症。

• 超标的影响：抑郁、哮喘

• 偏低的影响：抑郁、多动症、精神分裂

一氧化氮

5-95

79

正常

i

信号分子，参与血管舒张、神经传递和免疫防御，肠道菌群通过硝酸盐-亚硝酸盐途径影响其产生，调节肠道屏障和血压。

• 超标的影响：低血压、呼吸困难

• 偏低的影响：抑郁、焦虑、勃起功能障碍

喹啉

Quinolinic

5-95

61

正常

- i

色氨酸代谢产物，通过犬尿酸途径产生，高浓度具有神经毒性，与多种神经精神疾病和肝肾功能障碍相关。
- 超标的影响：肝病、心率不齐、肾衰
- 偏低的影响：暂无数据

维生素k2

5-95

30

正常

- i

由肠道菌群合成的脂溶性维生素，对骨骼健康和血液凝固至关重要，具有抗钙化作用，保护心血管系统，参与细胞信号传导。
- 超标的影响：暂无数据
- 偏低的影响：乳糜泻、溃疡性肠炎

肌醇

Inositol

5-95

6

正常

- i

糖醇类化合物，参与细胞信号传导和脂质代谢，支持神经系统功能，改善胰岛素敏感性，肠道菌群可影响其代谢和吸收。
- 超标的影响：暂无数据
- 偏低的影响：便秘、银屑病

吲哚

15-95

39

正常

- i

由肠道菌群代谢色氨酸产生的芳香族化合物，低浓度时作为抗氧化剂和抗炎剂，高浓度时可能成为尿毒症毒素，影响肝功能。
- 超标的影响：食物上瘾、焦虑、慢性肾病
- 偏低的影响：致病菌定植、炎症反应

苯酚

5-85

28

正常

- i

肠道菌群代谢酪氨酸产生的芳香族化合物，高浓度可能具有肝毒性和肾毒性，影响肠道屏障功能，与肠道炎症和多种代谢疾病相关。
- 超标的影响：结直肠癌、糖尿病肾病、尿毒症、艰难梭菌定植
- 偏低的影响：暂无数据

腐胺

5-85

76

正常

- i

生物胺类化合物，由肠道菌群通过代谢精氨酸和鸟氨酸产生，参与细胞增殖和分化，高浓度可增加肠道通透性，促进炎症反应。
- 超标的影响：结直肠癌、IBD、结肠炎、增加肠道通透、变形菌门正相关
- 偏低的影响：炎症

硫化氢

5-85

40

正常

- i

肠道菌群代谢含硫氨基酸产生的气体信号分子，低浓度时具有保护作用，高浓度时可能损伤肠黏膜，与肠道炎症和多种疾病相关。
- 超标的影响：IBD、腹胀气、抑制乳酸菌、心血管疾病、2型糖尿病、肝硬化
- 偏低的影响：暂无数据

尸胺

5-85

22

正常

- i

生物胺类化合物，由肠道菌群代谢赖氨酸产生，参与细胞增殖，高浓度可增加肠道通透性，影响神经系统功能，与多种疾病相关。
- 超标的影响：肠炎、结直肠疾病、乳腺癌
- 偏低的影响：阿尔茨海默病、帕金森病

免疫指标评估

i 肠道菌群通过调节免疫系统的平衡和功能，维护人体健康。

体液免疫指标	参考范围	评估数值	评估结果
免疫球蛋白A IgA	15-98	88	正常
i 体液免疫			
免疫球蛋白D IgD	15-98	62	正常
i 体液免疫			
免疫球蛋白M IgM	15-98	1 ↓	免疫球蛋白异常
i 体液免疫			
白蛋白 Albumin	15-98	9 ↓	免疫球蛋白异常
i 体液免疫			
嗜铬粒蛋白A Chromogranin A (CgA)	5-95	88	正常
i 免疫-肿瘤			
白介素6 IL-6	1-85	74	正常
i 促炎症细胞因子			
肿瘤坏死因子-α TNF-α	5-85	5	正常
i 促炎症细胞因子			
IL-17a IL-17a	5-85	82	正常
i 促炎症细胞因子			
IL-10 IL-10	15-95	77	正常
i 抗炎症细胞因子			
干扰素-γ IFN-γ	15-95	72	正常
i 抗炎症细胞因子			

炎症感染指标评估

i 炎症标志物是评估机体炎症状态的重要指标。通过检测不同的炎症标志物，可以了解系统的炎症程度。

炎症感染指标	参考范围	评估数值	评估结果
白细胞总数及分类 IgA	15-98	88	正常
i 体液免疫			
降钙素原 PCT	0-0	0	阴性
i 感染指标			
高敏C反应蛋白 hsCRP	0.068-8.2	8.26 ↑	炎症
i 心脑血管炎症指标			
粪便钙蛋白 FC	0-85	22	正常
i IBD等炎症指标			
粪便嗜酸性粒细胞蛋白X EPX	0-85	2	正常
i 肠炎标志物			

菌群代谢物指标评估

i 肠道菌群代谢物是评估肠道健康和免疫功能的重要指标。这些指标可以反应肠道微生态平衡状况和炎症反应水平。

菌群代谢物指标	参考范围	评估数值	评估结果
脂多糖 LPS	0-85	37	正常
i 致炎症代谢物			
胆汁酸 Bile acid	15-95	83	正常
i 抗炎代谢物			
氢气 H ₂	15-95	92	正常
i 抗炎代谢物			
丁酸盐 Butyrate	15-98	31	正常
i 抗炎代谢物			
乙酸盐 Acetate	15-98	39	正常
i 抗炎代谢物			

耐药基因分布

- i** 耐药基因是指能够使微生物对抗生素产生抵抗力的基因序列，这些基因可以通过编码特定蛋白质，使微生物具备各种耐药机制，如药物降解、药物外排、靶点改变等。耐药基因的存在使得抗生素治疗变得困难，增加了感染治疗的挑战。
- 下列是您肠道中检出的耐药基因，按照相关耐药基因片段reads数量递减排列。

来源菌株	耐药基因	reads数量	分类	药物分类	耐药药物
<i>Intestinimonas massiliensis</i>	catA13	24400	耐药	氯霉素	氯霉素
<i>Limosilactobacillus reuteri</i>	aadE	9600	耐药	氨基糖苷类	链霉素
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	tet(40)	6600	耐药	四环素	四环素
<i>Escherichia coli</i>	espX1	5000		毒力基因	
<i>Escherichia coli</i>	sat_auto	4400		毒力基因	
<i>Lachnospiraceae bacterium 6_1_63FAA</i>	msr(D)	3200	耐药	大环内酯类 链脲菌胺	阿奇霉素 红霉素 链球菌素B
<i>Lachnospiraceae bacterium 6_1_63FAA</i>	mef(A)	3200	耐药	大环内酯	阿奇霉素 红霉素
<i>Escherichia coli</i>	arsR_K-12	2800	金属	ARSENIC	砷
<i>Escherichia coli</i>	arsC_gluta	2800	金属	ARSENIC	砷
<i>Escherichia coli</i>	fdeC	2200		毒力基因	
<i>Lachnospiraceae bacterium KGMB03038</i>	lnu(C)	2000	耐药	林可酰胺	林可酰胺
<i>Escherichia coli</i>	iutA	2000		毒力基因	
<i>Escherichia coli</i>	iucD	2000		毒力基因	
<i>Escherichia coli</i>	iucC	2000		毒力基因	
<i>Escherichia coli</i>	iucB	2000		毒力基因	
<i>Escherichia coli</i>	iucA	2000		毒力基因	
肺炎克雷伯菌 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	gyrA	1800	点突变	喹诺酮类	喹诺酮类
埃希氏菌 <i>Escherichia</i>	gyrA	1800	点突变	喹诺酮类	喹诺酮类
<i>Escherichia coli</i>	ybtQ	1800		毒力基因	
<i>Escherichia coli</i>	ybtP	1800		毒力基因	
<i>Luxibacter massiliensis</i>	fosXCC	400	耐药	磷霉素	磷霉素

<i>Clostridioides difficile</i>	aac(6')_E111	400	耐药	氨基糖苷类	阿米卡星 卡那霉素 妥布霉素
<i>Clostridium perfringens</i>	lnu(P)	200	耐药	林可酰胺	林可酰胺

重要毒力基因分布


来源菌株	毒力基因	检测结果
产志贺毒素大肠杆菌 <i>STEC</i>	stx1A	阴性
	stx1B	阴性
	stx2A	阴性
	stx2B	阴性
肠集聚性大肠埃希氏菌 <i>EAggEC</i>	aggR	阴性
	aggA	阴性
	aggB	阴性
	aggC	阴性
	aggD	阴性
	aafA	阴性
	aafB	阴性
	aafC	阴性
	aafD	阴性
	agg3A	阴性
	agg3B	阴性
	agg3C	阴性
	agg3D	阴性
肠致病性大肠杆菌 <i>EPEC</i>	eae	阴性
	bfpA	阴性
肠产毒性大肠埃希氏菌 <i>ETEC</i>	eltA	阴性
	eltB	阴性
肠侵袭性大肠埃希氏菌 <i>EIEC</i>	ipaH	阴性
艰难梭菌毒素基因 <i>Clostridium difficile toxin gene</i>	tcdA	阴性
	tcdB	阴性
志贺肠毒素基因 <i>Shiga toxin gene</i>	set1A	阴性
	set1B	阴性
	senB	阴性
	gtrA	阴性
	gtrB	阴性
	ipaH7.8	阴性
	ipaH9.8	阴性
	ipaH1.4	阴性
	ipaH2.5	阴性
	ipaH4.5	阴性

肠道微生物分布

i 肠道微生物群由多种微生物组成，包括细菌、真菌、真核生物和病毒，这些微生物共同维持肠道生态平衡和人体健康。分析肠道微生物的分布结构有助于深入了解其对消化、免疫及代谢的影响。以下展示了您肠道内微生物的层级结构（按界（__k）、门（__p）、属（__g）、种等级排序）。不同类型的微生物在肠道中的平衡关系直接影响宿主的健康，具体介绍如下：

- **细菌**：肠道内最丰富的微生物，参与食物的分解和营养的吸收，有助于维持免疫系统的平衡。
- **真菌**：包括酵母和霉菌，能分解复杂的有机物，参与肠道的营养代谢。
- **真核生物**：更广泛的分类，通常指具有细胞核的微生物，有助于维持肠道内的生态稳定。
- **病毒**：在肠道中可能感染细菌，调节微生物群落的组成，维护群落的多样性。

肠道微生物层级构成（仅显示检测丰度 $\geq 0.5\%$ ）



肠道细菌

i 肠道微生物主要由肠道细菌组成，人体肠道中存在数千种细菌，总数量可达数十万亿个。健康成年人的肠道细菌主要分为厚壁菌门（Firmicutes）、拟杆菌门（Bacteroidetes）、放线菌门（Actinobacteria）和变形菌门（Proteobacteria），其中厚壁菌门和拟杆菌门占据了90%以上的比例。评估肠道菌群时，我们可以从丰度和菌群特性两个维度入手，这两者的结合有助于深入理解不同菌属在肠道微生态中的重要性 and 分布特征。

肠道菌群细菌分类

按菌群丰度

核心菌属

在绝大多数健康人群肠道中普遍存在的优势菌属，包括厚壁菌属、拟杆菌属等，占据总菌群的主要组成部分。

非核心重要菌属

虽然丰度相对较低，但对维持肠道健康具有重要作用的菌属，如乳酸菌属、双歧杆菌属等。

按菌群特性

有益菌

对人体健康有益的菌群，如双歧杆菌、乳酸菌等。它们参与营养物质的消化吸收，产生维生素，增强免疫力。

有害菌

有害菌通常是指那些在肠道中可能对宿主产生负面影响的细菌，这些细菌可能会干扰肠道平衡，导致消化问题，或促进肠道炎症。

机会致病菌

通常情况下与人体和平共处，但在特定条件下（如免疫力下降时）可能导致疾病的菌群。

致病菌

能够直接导致疾病的有害菌群，它们会破坏肠道环境，引起感染和炎症等症状。

核心菌属

核心菌属是指在肠道菌群中相对丰度较高、对生理功能具有重要作用的优势菌群。它们在维持肠道健康、参与营养物质代谢和调节免疫系统等方面发挥着主导作用，构成了肠道微生物生态系统的基石。主要的核心菌属包括拟杆菌属（Bacteroides）、普雷沃氏菌属（Prevotella）和瘤胃球菌属（Ruminococcus）等。在正常情况下，这些菌群能帮助消化纤维、产生短链脂肪酸，维持肠道屏障功能。此外，核心肠道菌属还在合成维生素、促进矿物质吸收和抑制病原菌生长中发挥重要作用。它们通过与肠道内的免疫系统相互作用，增强机体的免疫反应，抵御外界的病原体侵袭。因此，保持核心菌属的平衡与多样性是维护肠道健康的关键。对于饮食和生活方式的调整，能够有效影响这些核心菌属的构成，从而促进整体健康。

- 在本报告中，核心菌属指的是在90%人群中可被检测出，且人群平均丰度在1%以上的菌属。
- 核心菌属及有益菌累加占总肠道菌群比例低于60%的可能出现肠道菌群紊乱。
- 在本报告中，菌群的检测为ND意味着该菌群未检出，或该菌群的丰度低于检测的最低限度。

核心菌名称	检测丰度%	参考范围%	有%的正常人检出
梭菌属 <i>Clostridium</i>	0.17999	0-4.464	99.52%
多 导致人体炎症、致病，导致菌群失衡，产丁酸，肥胖人群丰度较高，参与胆汁酸代谢，对抗艰难梭菌，参与纤维素、花青素以及蛋白质分解			
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	0.00054	0-67.801	99.52%
核心菌 ，健康的植物性饮食相关菌，在自闭症、多发性硬化中减少；丰度高促炎，加剧过敏、刺激肠道敏感加剧IBS症状，基础丰度高更容易减脂			
瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i>	2.42642	0.054-19.799	99.52%
消化抗性淀粉、纤维素 ，丰度高促进肠炎和过敏相关疾病，高盐动物饮食增加有害Ruminococcus gnavus，水果蔬菜增加有益Ruminococcus bromii			
拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>	0.17322 ↓	1.058-47.322	99.04%
基石菌 ，消化蔬菜和谷食，蛋白，降解复杂多糖，交叉喂养关键菌，维持免疫和肠道稳态，维生素K的主要合成菌，预防骨质疏松症，过高过低都会诱发炎症			
改善建议： 增加摄入纤维和抗性淀粉，动物蛋白食物，多吃含低聚果糖的多叶蔬菜、豆类、种子、坚果等；葡萄籽提取物/白藜芦醇			
优杆菌属 <i>Eubacterium</i>	2.80311	0.115-9.488	98.56%
基石菌 ，产短链脂肪酸尤其丁酸，有助于肠道健康，降解胆固醇、调节餐后血糖、预防肠道炎症、改善自闭抑郁、缓解II型糖尿病、肥胖个体较高			

Lachnoclostridium <i>Lachnoclostridium</i>	0.39903 ↑	0-0.209	98.56%
💡 丁酸，与内脏脂肪积累相关，与肥胖、高血压、糖尿病正相关，与肠道炎症、肠癌和阿尔茨海默病进展有关，调节免疫和抗氧化，与营养消化吸收有关，抗肿瘤与预后生存延长有关，桥本和肌肉减少症中偏少 🔔 改善建议：植物蛋白质、高脂饮食			
粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i>	0.22163 ↓	1.935-17.794	98.08%
💡 基石菌，丁酸生产菌，下一代益生菌，抗炎，慢性便秘、乳糜泻、肠易激综合征和炎症性肠病中减少，维持肠道稳态，抑制病原菌，与拟杆菌，青春双歧杆菌等交叉喂养，生产B12，缓解过敏，改善肝脏健康，蓝莓蔓越莓等可以增加其丰度，过多也会导致菌群紊乱 🔔 改善建议：高纤维、低肉的饮食、全谷物、蔬菜、水果、坚果、种子和豆类、菊粉型果聚糖和阿拉伯木聚糖			
经黏液真杆菌属 <i>Blautia</i>	10.28500 ↑	0.085-6.906	97.60%
💡 消化复合碳水化合物，健康菌，偏低与炎症肠病，营养不良相关，减肥有效菌，缓解炎症性疾病和代谢疾病，抑制病原菌，老年，氟喹诺酮和克林霉素饮酒会减少，参与类黄酮，姜黄素生物转化 🔔 改善建议：高胆汁酸，红酒、啤酒			
戴阿利斯特杆菌属 <i>Dialister</i>	ND	0-3.736	96.15%
💡 代谢碳水化合物、产短链脂肪酸，许多种都可能导致感染，但是抑郁症患者缺乏，关节炎患者富集，与强直性脊柱炎正相关，癌症患者样本中显着升高，丰度高难以减肥，油炸食品会增加其丰度			
罗氏菌属 <i>Roseburia</i>	0.14488 ↓	0.583-16.358	96.15%
💡 基石菌，产丁酸，丙酸，乙酸，影响结肠运动，具抗炎特性，分解不可消化的碳水化合物，百岁老人富集，抗炎，IBD和IBS，直肠癌，代谢类疾病患者减少，与神经，免疫，过敏相关，缺乏加剧疾病，过多也会导致菌群紊乱，与会碳水化合物会促进其生长，例如蘑菇，燕麦，青香蕉等 🔔 改善建议：地中海饮食、植物性食物、全谷物、豆类和坚果、蘑菇、燕麦、几丁质、菊粉、膳食多酚			
直肠真杆菌属 <i>Agathobacter</i>	0.39598	0-8.633	95.67%
💡 可利用抗性淀粉，个别研究报道与结直肠癌预后恢复，抑郁症康复有关			
吉米菌属 <i>Gemmiger</i>	0.00808	0.004-0.973	95.67%
💡 健康饮食，高果蔬、谷物及豆类饮食含量高，与雄激素分泌相关，缓解便秘，与脂肪堆积分布负相关，双相情感障碍和抑郁，阿尔兹海默症患者丰度降低，早期肝癌丰度富集			
副拟杆菌属 <i>Parabacteroides</i>	0.04445 ↓	0.11-8.73	95.19%
💡 帮助糖脂代谢，改善高脂影响，产生强大的降解酶，参与胆碱代谢，顺产宝宝和长寿老人肠道丰富，过多会导致菌群紊乱，过敏性鼻炎患者增加，生酮饮食、铁皮石斛，玉米纤维可增加其丰度 🔔 改善建议：抗性淀粉、二甲双胍或白藜芦醇			

另枝菌属

0.15441

0.081-18.12

91.83%

Alistipes

耐胆汁酸菌，丙酸，乙酸生产者，参与腐败途径产生氨、H2S、甲酚、吲哚和苯酚，诱发诱发结直肠癌，肝纤维化，心房颤动，自闭症患者减少，抑郁，焦虑患者增加，丰度增加可能与 GABA 的增加相关

毛螺菌属

2.08635

0.035-8.66

88.94%

Lachnospira

基石菌，发酵代谢膳食纤维，利用果蔬果胶产生乙酸，丁酸，与睡眠质量呈负相关，过少与多种疾病相关，哮喘、过敏、认知障碍、系统性红斑狼疮、甲状腺功能亢进、II型糖尿病相关

考拉杆菌属

0.11815

0-3.749

88.94%

Phascolarctobacterium

东方人肠道的核心菌属，高易减肥，与水果蔬菜摄入相关，随年龄增加，在重度抑郁、阿尔茨海默病(AD)、自闭症富集，利用琥珀酸的细菌缓解腹泻，阻止艰难梭菌定植，低聚果糖会降低其丰度，与拟杆菌，颤螺菌属共存有利于维生素B的生产，可能与免疫疗效相关

巨单胞菌属

ND

0-0.692

87.50%

Megamonas

发酵各种碳水化合物、产乙酸、丙酸、乳酸，自闭症谱系障碍、注意缺陷、多动障碍（ADHD）急性脑卒中（AIS）较对照增高，减少与虚弱，炎症肠病，营养不良有关，饮食中豆类，玉米，马铃薯，鸡肉，牛肉会增加

粪球菌属

1.91786

0.083-9.419

86.06%

Coprococcus

可产丁酸，抑制免疫反应，降低过敏，抑郁、帕金森、认知障碍便秘，慢性肾病、虚弱者减少，过多导致菌群紊乱，与体重、总胆固醇和甘油三酯的变化呈正相关

双歧杆菌属

0.79402 ↓

1.755-35.501

97.12%

Bifidobacterium

最重要的益生菌属，基石菌，维持肠道菌群平衡，合成B族维生素，γ-氨基丁酸 (GABA)，产乙酸，有机酸、抗菌肽抑制病原菌，抗感染，提高免疫，抗肿瘤，多种疾病发生和进展期丰度减少，交叉喂养菌，丰度高体重较轻，过高会导致菌群紊乱

改善建议：益生菌补充、发酵食品、低聚果糖，抗性淀粉，白藜芦醇、镁、绿茶、杏仁、岩藻多糖、大麦、菊芋、阿拉伯木聚糖、菊粉、减少饮酒

乳杆菌属

0.03118

0-0.43

91.83%

Lactobacillus

婴幼儿较多，益生菌，消化和代谢蛋白质和碳水化合物，合成B族维生素和维生素K，分解代谢胆汁盐，改善消化缓解过敏，增强免疫，抑制炎症，降低胆固醇，抗菌，丰度过高体重增加，也有机会病原体，过高会导致菌群失调

芽孢杆菌属

ND ↓

0-0.553

77.88%

Bacillus

革兰氏阳性菌，自闭症儿童显著较高，可能与短链脂肪酸较高有关，部分菌种有益（例如，枯草芽孢杆菌，凝结芽孢杆菌，克劳氏芽孢杆菌），部分条件致病菌（蜡样芽孢杆菌，炭疽杆菌），过多致病，导致菌群失衡

改善建议：母乳低聚糖

其他非核心重要菌属

i 其他非核心重要菌属指的是在人群中丰度不高，但对肠道健康有重要影响的菌属。

其他非核心重要菌属名称	检测丰度%	参考范围%	%正常人有检出
柯林斯氏菌属 <i>Collinsella</i>	3.0531	0-9.153	90.38%
i 产气菌，与脂质代谢及心脑血管相关，过多可导致菌群紊乱，部分病原菌			
嗜胆菌属 <i>Bilophila</i>	ND	0-0.154	66.83%
i 条件致病菌，与耐胆汁酸与脂肪摄入相关，便秘人群含量更高			
Flavonifractor <i>Flavonifractor</i>	0.04223	0-0.729	91.83%
i 参与肠道儿茶素代谢，减轻免疫反应，产丁酸			
Dorea菌属 <i>Dorea</i>	3.29143	0.058-5.212	89.42%
i 消化碳水化合物产气，自闭症谱系障碍发病相关			
Hungatella <i>Hungatella</i>	0.09489 ↑	0-0.027	89.42%
i 参与生成氧化三甲胺和牛磺酸			
🔔 改善建议：乳杆菌补充、双歧杆菌补充、白藜芦醇、低聚果糖			
颤螺菌属 <i>Oscillospira</i>	ND ↓	0.003-0.535	87.50%
i 基石菌、核心菌群，帮助消化抗性淀粉，产丁酸，并在大肠中发酵。与儿童过敏和肥胖呈负相关。			
🔔 改善建议：开菲尔奶、低聚果糖、褐藻糖胶和低聚半乳糖、豌豆、马铃薯、多酚、绿茶多酚、辣椒素、蔓越莓、地中海饮食、杏仁			
枸橼酸杆菌属 <i>Citrobacter</i>	ND	0-0.05	78.37%
i 常见菌，免疫力下降可能引发感染			
Akkermansia <i>Akkermansia</i>	0.00032	0-5.798	74.52%
i 基石菌，可降解淀粉，黏蛋白降解菌，可控制体重，改善代谢和炎症，过多导致肠粘膜屏障破坏。			

肠杆菌属 <i>Enterobacter</i>	ND	0-0.05	63.46%
💡 产酸产气，不引起腹泻，机会性感染，过多导致菌群紊乱和肥胖			
Turicibacter <i>Turicibacter</i>	0.0468	0-0.123	49.52%
💡 发酵生成乳酸，参与肌肉和疲劳调节			
丁酸弧菌属 <i>Butyrivibrio</i>	0.01525	0-3.259	35.58%
💡 利用纤维素、淀粉和其他多聚糖生成丁酸			
Christensenella <i>Christensenella</i>	0.09762 ↑	0-0.005	5.77%
🔔 改善建议：盐酸硫胺素（维生素B1）、高脂肪饮食、乳杆菌补充			

Enterobacter

ND

0-0.05

63.46%

i 产酸产气，不引起腹泻，机会性感染，过多导致菌群紊乱和肥胖

Turcibacter

Turcibacter

0.0468

0-0.123

49.52%

i 发酵生成乳酸，参与肌肉和疲劳调节

丁酸弧菌属

Butyrivibrio

0.01525

0-3.259

35.58%

i 利用纤维素、淀粉和其他多聚糖生成丁酸

Christensenella

Christensenella

0.09762 ↑

0-0.005

5.77%

改善建议： 盐酸硫胺素（维生素B1）、高脂肪饮食、乳杆菌补充

常见有益菌

i 有益菌是指对宿主健康有积极影响的微生物，特别是在肠道内，有助于维持菌群平衡、促进消化和增强免疫力。下列是常见有益菌在您肠道中的检测情况。有益菌名称后的符号表示：

- #**：益生菌
- ***：食品可添加菌
- 未标注特殊符号：对人体有益微生物




? 肠道有益菌是越多越好吗？

💡 肠道有益菌并不是越多越好，关键在于微生物的多样性与平衡：
多样性: 健康的肠道微生物群依赖于多样性，不同菌种间的相互作用有助于维持肠道功能和免疫系统。
过度生长: 虽然有益菌有助于消化和防病，但过多可能导致代谢问题或肠道不适。
个体差异: 每个人的肠道微生物群组成不同，适宜的有益菌数量因人而异。总之，保持有益菌的多样性和适宜数量是促进肠道健康的关键。

有益菌名称	检测丰度%	参考范围%
嗜粘蛋白-艾克曼菌 <i>Akkermansia muciniphila</i>	0.00032 	0-6.639
凝结芽孢杆菌 * <i>Bacillus coagulans</i>	ND 	0-0.001
枯草芽孢杆菌 <i>Bacillus subtilis</i>	ND 	0-0.001
多形拟杆菌 <i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>	0.00503 	0-2.786
青春双歧杆菌 * <i>Bifidobacterium adolescentis</i>	0.00171 	0-14.286
角双歧杆菌 <i>Bifidobacterium angulatum</i>	ND 	0-0.153
动物双歧杆菌 # <i>Bifidobacterium animalis</i>	ND 	0-0.188
两歧双歧杆菌 # <i>Bifidobacterium bifidum</i>	0.00083 	0-2.123
短双歧杆菌 # <i>Bifidobacterium breve</i>	0.02759 ↑ 	0-0.001
链状双歧杆菌 <i>Bifidobacterium catenulatum</i>	0.00145 	0-0.508

乳双歧杆菌 # <i>Bifidobacterium crudilactis</i>	ND	0-0.001
婴儿双歧杆菌 <i>Bifidobacterium infantis</i>	ND	0-0.001
长双歧杆菌 # <i>Bifidobacterium longum</i>	0.69586	0-6.854
胃瘤双歧杆菌 <i>Bifidobacterium merycicum</i>	ND	0-0.001
穆卡拉巴双歧杆菌 <i>Bifidobacterium moukalabense</i>	ND	0-0.001
假长双歧杆菌 <i>Bifidobacterium pseudolongum</i>	ND	0-0.001
分支双歧杆菌 <i>Bifidobacterium ramosum</i>	ND	0-0.001
罗伊氏双歧杆菌 * <i>Bifidobacterium reuteri</i>	ND	0-0.001
短柄双歧杆菌 <i>Bifidobacterium stellenboschense</i>	ND	0-0.001
粪双歧杆菌 <i>Bifidobacterium stercoris</i>	ND	0-0.001
布劳特氏菌属氢营养菌 <i>Blautia hydrogenotrophica</i>	0.45723 ↑	0-0.026
穗状丁酸弧菌 <i>Butyrivibrio crossotus</i>	0.01472	0-2.933
丁酸梭菌 <i>Clostridium butyricum</i>	ND	0-0.001
霍氏真杆菌 <i>Eubacterium hallii</i>	3.19263	0-3.551
直肠真杆菌 <i>Eubacterium rectale</i>	0.3891	0-13.029
普拉梭菌 <i>Faecalibacterium prausnitzii</i>	0.11574 ↓	0.18-14.003
嗜酸乳杆菌 # <i>Lactobacillus acidophilus</i>	0.00043	0-0.001
短乳杆菌 <i>Lactobacillus brevis</i>	ND	0-0.001
干酪乳杆菌 * <i>Lactobacillus casei</i>	ND	0-0.001
卷曲乳杆菌 * <i>Lactobacillus crispatus</i>	0.00118 ↑	0-0.001

弯曲乳杆菌 <i>Lactobacillus curvatus</i>	ND	0-0.001
德氏乳杆菌 # <i>Lactobacillus delbrueckii</i>	ND	0-0.01
发酵乳杆菌 * <i>Lactobacillus fermentum</i>	ND	0-0.001
格氏乳杆菌 * <i>Lactobacillus gasseri</i>	0.00931 ↑	0-0.001
瑞士乳杆菌 # <i>Lactobacillus helveticus</i>	ND	0-0.001
约氏乳杆菌 * <i>Lactobacillus johnsonii</i>	ND	0-0.001
副干酪乳杆菌 # <i>Lactobacillus paracasei</i>	0.00201 ↑	0-0.001
植物乳杆菌 # <i>Lactobacillus plantarum</i>	ND	0-0.001
罗伊氏乳杆菌 # <i>Lactobacillus reuteri</i>	ND	0-0.001
鼠李糖乳杆菌 # <i>Lactobacillus rhamnosus</i>	0.00214 ↑	0-0.001
唾液乳杆菌 * <i>Lactobacillus salivarius</i>	0.0008	0-0.001
乳酸乳球菌 * <i>Lactococcus lactis</i>	0.00819	0-0.042
棉子糖乳球菌 <i>Lactococcus raffinolactis</i>	ND	0-0.001
台湾乳球菌 <i>Lactococcus taiwanensis</i>	ND	0-0.001
草酸杆菌 <i>Oxalobacter formigenes</i>	ND	0-0.001
乳酸片球菌 * <i>Pediococcus acidilactici</i>	ND	0-0.001
戊糖片球菌 * <i>Pediococcus pentosaceus</i>	ND	0-0.001
琥珀酸考拉杆菌 <i>Phascolarctobacterium succinatutens</i>	ND	0-2.48
肠道罗斯拜瑞氏菌 <i>Roseburia intestinalis</i>	0.08558	0-4.835
食葡萄糖罗斯拜瑞氏菌 <i>Roseburia inulinivorans</i>	ND	0-2.765

肉葡萄球菌 *	ND	0-0.001
<i>Staphylococcus carnosus</i>		
小牛葡萄球菌 *	ND	0-0.001
<i>Staphylococcus vitulinus</i>		
木糖葡萄球菌 *	ND	0-0.001
<i>Staphylococcus xylosus</i>		
嗜热链球菌 #	0.00905	0-1.011
<i>Streptococcus thermophilus</i>		

常见有害菌

肠道有害菌能够破坏肠道内生态平衡，引起肠道功能紊乱等，损害人体健康。下列是17种常见肠道有害菌在您的肠道中的检测情况。（可以优先关注异常菌和其对应的改善方法）

肠道有害菌是越少越好吗？

肠道有害菌并不是越少越好。关键在于维持肠道微生物的平衡：适度存在: 有害菌在一定数量下可以与有益菌竞争，并促进微生物生态的平衡。过度抑制风险: 过度抑制有害菌可能会导致有益菌失衡，破坏微生物群落。健康维持: 健康饮食和生活方式有助于控制有害菌的数量，保持整体肠道健康。总之，重要的是保持有益菌占主导，有害菌在可控范围内。

有害菌名称	检测丰度%	参考范围%	%正常人有检出
埃希氏菌属 <i>Escherichia</i>	13.09266 ↑	0-3.83	99.52%
正常菌属，条件致病菌，过多致病，导致菌群失衡 改善建议：乳杆菌补充、双歧杆菌补充、大麦、大蒜			
链球菌属 <i>Streptococcus</i>	1.36204 ↑	0-0.3496	99.52%
可引起化脓性炎症，个别菌为益生菌，常见皮肤，口腔，肠道，婴幼儿常见菌 改善建议：蜂蜜、植物提取物、大蒜、大豆			
韦荣菌属 <i>Veillonella</i>	0.00235	0-0.0086	98.56%
过多导致菌群失衡，也见于口腔、咽部、呼吸道菌，健康口腔核心菌，幼儿常见影响早期免疫系统，代谢乳酸产生丙酸可以提供运动耐力，容易形成生物膜耐药，与过敏，哮喘负相关，可能影响几种癌症的发生，例如肝癌，肺癌			
泛菌属 <i>Pantoea</i>	ND	0-0.05	0.02%
属于变形菌门肠杆菌科，条件致病菌，环境土壤、水、植物常见菌，免疫力低下，幼儿和老年人常检出，过多导致菌群紊乱，炎症和感染			
梭杆菌属 <i>Fusobacterium</i>	0.00059	0-0.05	80.29%
聚合梭杆菌可诱发促进结直肠癌，产生脂多糖，代谢生成苯酚，引发感染和并发症，胃肠到肿瘤患者富集			

志贺氏菌属 <i>Shigella</i>	0.07397 ↑	0-0.05	62.98%
i 致病菌，引发腹泻等疾病，有不同的血型型，人类是该菌唯一宿主，粪口途径传播，通常与卫生条件差和食品安全有关 🔔 改善建议： 乳杆菌补充、双歧杆菌补充、大麦、乳清			
弯曲杆菌属 <i>Campylobacter</i>	0.00099	0-0.05	55.29%
i 人和动物条件致病菌，导致肠道疾病，常见肠胃炎和菌群紊乱，空肠弯曲杆菌会引起腹泻发烧，食物家养宠物都可能携带弯曲杆菌			
克雷伯氏菌属 <i>Klebsiella</i>	0.01070	0-0.05	89.06%
i 条件致病菌，人群检出率较高，过高导致肠道菌群紊乱，在口腔和肠道均有分布，易引发感染炎症，耐药，易感因素包括营养不良，抗生素，开放性伤口，肝病肾病，不卫生的环境和遗传易感性等			
脱硫弧菌属 <i>Desulfovibrio</i>	0.15387 ↑	0-0.05	33.65%
i 属于变形菌门，产生硫化氢，导致炎症、腹泻，对肠道上皮产生毒性，导致胃肠道疾病，约50%人的口腔和肠道携带，过多通常肥胖，便秘型肠易激综合征患者，帕金森，系统性硬化症患者患者富集，与普拉梭菌共存有利于丁酸生产 🔔 改善建议： 特级初榨橄榄油、多酚、黄酮类物质			
螺杆菌属 <i>Helicobacter</i>	ND	0-0.05	22.12%
i 革兰氏阴性菌，微需氧菌，该菌属一些菌种被发现在人类上消化道内壁，部分种为致病菌，与消化性溃疡、慢性胃炎、十二指肠炎症、胃癌有关。包括幽门螺旋杆菌			
弓形菌属 <i>Arcobacter</i>	ND	0-0.05	7.69%
i 好氧菌，腹泻致病菌，与河流海洋污染相关的潜在病原菌，人畜共患菌			
厌氧螺菌 <i>Anaerobiospirillum</i>	ND	0-0.05	0.00%
i 引起腹泻，感染，常见于猫狗体内，过多会导致菌群紊乱			
肠球菌属 <i>Enterococcus</i>	0.05861 ↑	0-0.05	81.25%
i 常见上呼吸道，口腔或肠道的常居菌，也分布在畜、禽养殖环境，饲料或肠道，抑菌调节肠道菌群，部分病原体引起菌血症，很多菌耐药，在肝癌，房颤患者中富集，锌缺乏会增加 🔔 改善建议： 乳杆菌补充、可可、母乳低聚糖、槲皮素			
奈瑟氏菌属 <i>Neisseria</i>	ND	0-0.05	46.15%
i 部分为人体病原菌，口腔，唾液，鼻腔，肺部正常菌，需氧，对干燥、热、消毒剂敏感，部分菌种产生内毒素LPS引起坏死、出血，微循环障碍，婴幼儿易检出			

不动杆菌属 <i>Acinetobacter</i>	ND	0-0.05	45.19%
i 条件致病菌，医院感染病原体之一，尤其ICU，易引起呼吸道感染、泌尿道感染、创伤感染，累积不同耐药基因多多种抗生素耐药， 风险因素包括抗生素使用，人群接触，识别感染源，主动监测			
假单胞菌属 <i>Pseudomonas</i>	ND	0-0.05	45.19%
i 属于变形菌们，环境广泛存在，代谢多变适应力强，好氧或微需，会导致感染和食物变质，医院获得性感染主要原因，免疫抑制个体和住院患者丰度增加， 肠道定植会增加肺部感染风险，损伤肠道屏障，包括病原菌铜绿假单胞菌，消化道症状为腹痛、腹胀和腹泻，长时间住院、创伤ICU住院、消毒干预等与肠道假单胞菌过度生长有关			
霍尔德曼氏菌属 <i>Holdeman</i>	0.01871	0-0.0378	29.33%
i 肠道共生菌，降解黏蛋白，机会致病菌，少数研究表明与痛风正相关，帕金森，双向情感障碍患者富集			

常见机会致病菌

i 常见的机会致病菌是那些通常不致病，但在特定条件下（例如宿主免疫力降低、伤口感染等）可以引起疾病的微生物。以下是一些常见的机会致病菌：

机会致病菌名称	检测丰度%	参考范围%
鲍曼不动杆菌 <i>Acinetobacter baumannii</i>	ND 	0-0.05
醋酸钙不动杆菌 <i>Acinetobacter calcoaceticus</i>	ND 	0-0.05
约氏不动杆菌 <i>Acinetobacter johnsonii</i>	ND 	0-0.05
琼氏不动杆菌 <i>Acinetobacter junii</i>	ND 	0-0.05
鲁氏不动杆菌 <i>Acinetobacter lwoffii</i>	ND 	0-0.05
蜡样芽孢杆菌 <i>Bacillus cereus</i>	ND 	0-0.05
脆弱拟杆菌 <i>Bacteroides fragilis</i>	0.00993 	0-1.8852
普通拟杆菌 <i>Bacteroides vulgatus</i>	0.08194 	0-20.066
艰难梭菌 <i>Clostridioides difficile</i>	0.23986 ↑ 	0-0.05
阴沟肠杆菌 <i>Enterobacter cloacae</i>	ND 	0-0.05
粪肠球菌 <i>Enterococcus faecalis</i>	0.00471 	0-0.05
屎肠球菌 <i>Enterococcus faecium</i>	0.04723 	0-0.05
大肠埃希氏菌 <i>Escherichia coli</i>	10.08510 ↑ 	0-3.8364
具核梭杆菌 <i>Fusobacterium nucleatum</i>	0.00040 	0-0.05
肺炎克雷伯菌 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	0.00995 	0-0.24019
铜绿假单胞菌 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ND 	0-0.05

脱氮假单胞杆菌 <i>Pseudomonas denitrificans</i>	ND	0-0.05
荧光假单胞菌 <i>Pseudomonas fluorescens</i>	ND	0-0.05
黄褐假单胞菌 <i>Pseudomonas fulva</i>	ND	0-0.05
门多萨假单胞菌 <i>Pseudomonas mendocina</i>	ND	0-0.05
恶臭假单胞菌 <i>Pseudomonas putida</i>	ND	0-0.05
斯氏假单胞菌 <i>Pseudomonas stutzeri</i>	ND	0-0.05
咽峡链球菌 <i>Streptococcus anginosus</i>	0.19712 ↑	0-0.05
肺炎链球菌 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	0.00225	0-0.05
小韦荣球菌 <i>Veillonella parvula</i>	0.00128	0-0.13203

常见致病菌

i 肠道致病菌是指能直接引起疾病的肠道病原微生物，它们具有明确的致病性，一旦在肠道中检出就可能对健康造成威胁。这类细菌通常具有特定的致病机制，如产生毒素、侵犯宿主细胞、触发炎症反应等。

致病菌名称	检测丰度%	参考范围%
豚鼠气单胞菌 <i>Aeromonas caviae</i>	ND 	0-0.05
嗜水气单胞菌 <i>Aeromonas hydrophila</i>	ND 	0-0.05
温和气单胞菌 <i>Aeromonas sobria</i>	ND 	0-0.05
牛布鲁氏杆菌 <i>Brucella abortus</i>	ND 	0-0.05
犬布鲁氏杆菌 <i>Brucella canis</i>	ND 	0-0.05
羊布鲁氏杆菌 <i>Brucella melitensis</i>	ND 	0-0.05
绵羊布鲁氏杆菌 <i>Brucella ovis</i>	ND 	0-0.05
猪布鲁氏杆菌 <i>Brucella suis</i>	ND 	0-0.05
唐菖蒲伯克霍尔德氏菌 <i>Burkholderia gladioli</i>	ND 	0-0.05
大肠弯曲菌 <i>Campylobacter coli</i>	0.00067 	0-0.05
胎儿弯曲菌 <i>Campylobacter fetus</i>	ND 	0-0.05
空肠弯曲菌 <i>Campylobacter jejuni</i>	ND 	0-0.05
肉毒梭菌 <i>Clostridium botulinum</i>	ND 	0-0.05
产气荚膜梭菌 <i>Clostridium perfringens</i>	0.07009 ↑ 	0-0.05
阪崎肠杆菌 <i>Cronobacter sakazakii</i>	ND 	0-0.05

猪红斑丹毒丝菌 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	0.00040	0-0.05
大肠埃希菌 <i>Escherichia coli O157:H7</i>	ND	0-0.05
幽门螺杆菌 <i>Helicobacter pylori</i>	ND	0-0.05
博杰曼军团菌 <i>Legionella bozemanæ</i>	ND	0-0.05
杜莫夫军团菌 <i>Legionella dumoffii</i>	ND	0-0.05
长滩军团菌 <i>Legionella longbeachæ</i>	ND	0-0.05
嗜肺军团菌 <i>Legionella pneumophila</i>	ND	0-0.05
单核细胞增生李斯特菌 <i>Listeria monocytogenes</i>	ND	0-0.05
鸟胞内分枝杆菌 <i>Mycobacterium avium complex sp.</i>	ND	0-0.05
龟分枝杆菌 <i>Mycobacteroides chelonæ</i>	ND	0-0.05
偶发分枝杆菌 <i>Mycobacterium fortuitum</i>	ND	0-0.05
堪萨斯分枝杆菌 <i>Mycobacterium kansasii</i>	ND	0-0.05
海分枝杆菌 <i>Mycobacterium marinum</i>	ND	0-0.05
瘰癧分枝杆菌 <i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	ND	0-0.05
结核分枝杆菌 <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	ND	0-0.05
溃疡分枝杆菌 <i>Mycobacterium ulcerans</i>	ND	0-0.05
类志贺邻单胞菌 <i>Plesiomonas shigelloides</i>	ND	0-0.05
猪霍乱沙氏菌 <i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis</i>	ND	0-0.05
肠炎沙门氏菌 <i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis</i>	ND	0-0.05

副伤寒沙门氏菌-A <i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A</i>	ND	0-0.05
副伤寒沙门氏菌-B <i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B</i>	ND	0-0.05
副伤寒沙门氏菌-C <i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi C</i>	ND	0-0.05
伤寒沙门氏菌 <i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi</i>	ND	0-0.05
鼠伤寒沙门菌 <i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium</i>	ND	0-0.05
鲍氏志贺氏菌 <i>Shigella boydii</i>	0.01472	0-0.05
痢疾志贺氏菌 <i>Shigella dysenteriae</i>	0.00878	0-0.05
福氏志贺氏菌 <i>Shigella flexneri</i>	0.02481	0-0.05
宋内志贺氏菌 <i>Shigella sonnei</i>	0.01822	0-0.05
金黄色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i>	ND	0-0.05
猪链球菌 <i>Streptococcus suis</i>	0.01817	0-0.05
齿垢密螺旋体 <i>Treponema denticola</i>	0.00233	0-0.05
梅毒密螺旋体 <i>Treponema pallidum</i>	ND	0-0.05
文氏密螺旋体 <i>Treponema vincentii</i>	ND	0-0.05
霍乱弧菌 <i>Vibrio cholerae</i>	ND	0-0.05
拟态弧菌 <i>Vibrio mimicus</i>	ND	0-0.05
副溶血弧菌 <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	ND	0-0.05
创伤弧菌 <i>Vibrio vulnificus</i>	ND	0-0.05
小肠结肠炎耶尔森氏菌 <i>Yersinia enterocolitica</i>	ND	0-0.05

鼠疫耶尔森菌 <i>Yersinia pestis</i>	ND	0-0.05
假结核耶尔森氏菌 <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	ND	0-0.05

常见真菌

i 真菌检测对于评估免疫状态和潜在感染风险非常重要。尽管一些真菌在正常情况下不会引起健康问题，但对于免疫系统较弱的人群来说，持续监测是预防真菌感染的关键。下列是一些常见肠道真菌在您肠道中的检测情况。

真菌名称	检测丰度%	参考范围%
白色念珠菌 <i>Candida albicans</i>	ND 	0-0.05
酿酒酵母 <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	0.01903 	0-0.05
真贝酵母 <i>Saccharomyces eubayanus</i>	ND 	0-0.05
奇异酵母 <i>Saccharomyces paradoxus</i>	ND 	0-0.05
木糖发酵酵母 <i>Scheffersomyces stipitis</i>	ND 	0-0.05
黄曲霉 <i>Aspergillus flavus</i>	ND 	0-0.05
烟曲霉 <i>Aspergillus fumigatus</i>	ND 	0-0.05
米曲霉 <i>Aspergillus oryzae</i>	ND 	0-0.05
新型隐球菌 <i>Cryptococcus neoformans</i>	ND 	0-0.05
汉氏德巴利氏酵母 <i>Debaryomyces hansenii</i>	ND 	0-0.05
产甘油假丝酵母 <i>Eremothecium gossypii</i>	ND 	0-0.05
轮枝镰刀菌 <i>Fusarium verticillioides</i>	ND 	0-0.05
尖孢镰刀菌 <i>Fusarium oxysporum</i>	ND 	0-0.05
禾谷镰刀菌 <i>Fusarium graminearum</i>	ND 	0-0.05
乳酸克鲁维酵母 <i>Kluyveromyces lactis</i>	ND 	0-0.05

稻瘟病菌 <i>Pyricularia grisea</i>	ND	0-0.05
玉米黑粉菌 <i>Ustilago maydis</i>	ND	0-0.05

常见肠道寄生虫

i 肠道常见寄生虫检测对于评估肠道健康和潜在感染风险具有重要意义。虽然部分寄生虫在低水平时可能不会造成明显症状，但持续监测对预防寄生虫相关疾病至关重要。

寄生虫名称	检测丰度%	参考范围%
人隐孢子虫 <i>Cryptosporidium hominis</i>	ND 	0-0.05
布氏姜片吸虫 <i>Fasciolopsis buski</i>	ND 	0-0.05
脑炎微孢子虫 <i>Encephalitozoon hellem</i>	ND 	0-0.05
卫氏并殖吸虫 <i>Paragonimus westermani</i>	ND 	0-0.05
毛首鞭形线虫 <i>Trichuris trichiura</i>	ND 	0-0.05
疟原虫 <i>Plasmodium ovale</i>	ND 	0-0.05
肉孢子虫 <i>Sarcocystis neurona</i>	ND 	0-0.05
十二指肠钩口线虫 <i>Ancylostoma duodenale</i>	ND 	0-0.05
蠕形住肠线虫 <i>Enterobius vermicularis</i>	ND 	0-0.05
美洲板口线虫 <i>Necator americanus</i>	ND 	0-0.05
巴西利士曼原虫 <i>Leishmania braziliensis</i>	ND 	0-0.05
杜氏利什曼原虫 <i>Leishmania donovani</i>	ND 	0-0.05
硕大利什曼虫 <i>Leishmania major</i>	ND 	0-0.05
婴儿利什曼虫 <i>Leishmania infantum</i>	ND 	0-0.05
布氏锥虫 <i>Trypanosoma brucei</i>	ND 	0-0.05
枯氏锥虫 <i>Trypanosoma cruzi</i>	ND 	0-0.05

阴道毛滴虫 <i>Trichomonas vaginalis</i>	ND	0-0.05
肠贾第虫 <i>Giardia intestinalis</i>	ND	0-0.05
蓝氏贾第鞭毛 <i>Giardia intestinalis</i>	ND	0-0.05
溶组织内阿米巴 <i>Entamoeba histolytica</i>	ND	0-0.05
小隐孢子虫 <i>Cryptosporidium parvum</i>	ND	0-0.05
鼠隐孢子虫 <i>Cryptosporidium muris</i>	ND	0-0.05
刚地弓形虫 <i>Toxoplasma gondii</i>	ND	0-0.05
恶性疟原虫 <i>Plasmodium falciparum</i>	ND	0-0.05
间日疟原虫 <i>Plasmodium vivax</i>	ND	0-0.05
牛环形泰勒虫 <i>Theileria annulata</i>	ND	0-0.05
小泰勒虫 <i>Theileria parva</i>	ND	0-0.05
肠脑炎微孢子虫 <i>Encephalitozoon intestinalis</i>	ND	0-0.05
兔脑炎微孢子虫 <i>Encephalitozoon cuniculi</i>	ND	0-0.05
日本血吸虫 <i>Schistosoma japonicum</i>	ND	0-0.05
曼氏血吸虫 <i>Schistosoma mansoni</i>	ND	0-0.05
埃及血吸虫 <i>Schistosoma haematotium</i>	ND	0-0.05
链状带绦虫 <i>Taenia solium</i>	ND	0-0.05
肥胖带绦虫 <i>Taenia saginata</i>	ND	0-0.05
似蚓蛔线虫 <i>Ascaris lumbricoides</i>	ND	0-0.05
旋毛形线虫 <i>Trichinella spiralis</i>	ND	0-0.05

华支睾吸虫 <i>Clonorchis sinensis</i>	ND	0-0.05
环孢子虫 <i>Cyclospora cayetanensis</i>	ND	0-0.05

疾病症状相关菌

i 临床研究数据揭示，肠道菌群丰度特征与疾病发生呈现显著相关性。特定菌群失调（如拟杆菌/厚壁菌比值异常）与代谢性疾病（肥胖、糖尿病）、免疫性疾病（过敏、IBD）及神经精神类疾病（抑郁、自闭症）存在明确生物标志物关联。通过菌群检测可识别微生态失衡特征，为疾病早期预警和精准干预提供重要依据。

肥胖

肥胖与肠道菌群失调密切相关，研究表明肥胖人群的肠道菌群多样性显著降低，拟杆菌/厚壁菌比例失衡。这种失衡会影响能量代谢、脂肪存储和食欲调节，同时增加炎症因子水平，形成恶性循环。益生菌干预可通过调节GLP-1和PYY等饱腹激素，帮助改善代谢功能。

便秘

便秘往往反映肠道菌群功能紊乱，主要表现为产丁酸菌群减少、肠道蠕动功能受损。健康菌群通过产生短链脂肪酸促进肠道蠕动，调节水分代谢，维持正常排便功能。双歧杆菌和乳酸菌的补充可有效改善肠道微环境，促进肠道蠕动。

腹胀

腹胀常见于肠道菌群发酵异常，产气菌群过度生长。这种状况会导致肠道气体产生增多，肠壁张力改变，引起腹部不适。调节肠道菌群结构，特别是限制产气菌群过度生长，同时增加有益菌数量，可有效缓解腹胀症状。

过敏

过敏与免疫系统过度反应及肠道屏障功能受损有关。健康的肠道菌群可通过调节Th1/Th2平衡，促进调节性T细胞生成，抑制过度免疫反应。益生菌干预能够增强肠道屏障功能，降低过敏原穿透，减轻过敏症状。

抑郁

肠-脑轴研究表明，肠道菌群通过神经递质、内分泌和免疫调节影响情绪。菌群失调会降低血清素、GABA等神经递质水平，增加炎症因子表达，影响认知功能和情绪调节。补充特定益生菌可改善肠道微生态，帮助缓解抑郁症状。

失眠

失眠与昼夜节律紊乱和神经递质失衡相关。肠道菌群参与褪黑激素、血清素等睡眠相关物质的合成与代谢，影响睡眠-觉醒周期。改善肠道菌群结构可以优化褪黑激素分泌节律，帮助调节睡眠周期。

疾病症状相关菌阅读指南

 临床研究数据揭示，肠道菌群丰度特征与疾病症状的表现呈现显著相关性。通过菌群检测可识别微生态失衡特征，为疾病症状早期预警和精准干预提供重要依据。

如何阅读疾病症状相关菌的表格？

 以下是对疾病症状相关菌的表格中的各部分信息进行的说明解释：

- **疾病症状相关菌名称：** 这一列列出特定的症状相关菌群名称。
- **参考范围%：** 此列显示该菌群的参考范围，此范围为比较您的检测结果提供了参考标准。
- **检测丰度%：** 这一列显示经过检测后您体内该菌群在肠道微生物中的相对丰度，以数字（包括未检出）和进度条展示。
 - ：表示该菌群的检测丰度较参考范围的下限偏少。
 - ：表示该菌群的检测丰度较参考范围的上限偏多。
 - **未检出：** 表示表示该菌群的相对丰度低于检出下限。
- **相关性：** 这一列标示该菌群丰度与特定疾病相关症状之间的关系。
 - 若标记为“正相关”，则表示菌群丰度的升高与症状的发生与进展呈正相关。
 - 若标记为“负相关”，则表示菌群丰度的降低与症状的发生与进展呈正相关。
- **相关性强度：** 这一列表明该菌群和该疾病症状之间的相关性证据的强度，分为三个强度级别（正相关的相关性强度为，负相关的相关性强度为）
 - （）：依据的是单一研究或人群数据统计。
 -  （ ）：基于大规模人群样本统计和至少一项研究的支持。
 -   （  ）：有大量研究论文对此结果的确认。

在阅读表格时应着重关注下列菌群：

- 检测丰度较参考范围相对超标+相关性为正相关的菌群，该菌群整行会被橙色的边框包围来提示您重点关注。
- 检测丰度较参考范围相对偏少+相关性为负相关的菌群，该菌群整行会被蓝色的边框包围来提示您重点关注。
-  与  分别是通过对全球最大规模的调查样本进行相关性分析和统计检验得出的菌群简介信息和丰度较参考范围异常时相对应的饮食改善。

常见问题与说明

❓ 为什么选取这些疾病症状相关菌？

💡 这些疾病症状相关菌的选取主要基于两方面的依据：

- **文献报告：**通过参考已有的科学文献和研究成果，筛选出不同疾病和健康状态中具有明确关联的菌群。
- **数据分析：**利用我们数据库中的疾病样本与健康对照样本进行统计分析，筛选出在两者之间存在显著差异的菌群。

❓ 涉及到的疾病症状相关菌和相对应的疾病症状存在因果关系吗？

💡 涉及到的疾病症状相关菌与相对应的疾病症状之间仅表现为相关性，并不能直接说明存在因果关系。相关性仅说明两者在统计数据中具有一定关联，但并不意味着一种情况会直接导致另一种情况的发生。对于因果关系的判断，还需要通过更多的机制研究才能确定。

❓ 疾病症状相关菌的检测丰度较参考范围正常代表着一定不会出现该疾病相关症状吗？

💡 菌群的检测丰度较参考违反正常并不能完全排除疾病相关症状的出现。疾病的发生通常是多种因素综合作用的结果，包括其他菌群的丰度变化、遗传因素、免疫状态、环境影响、生活习惯等。此外，有些疾病的表现可能由其他病原体或非微生物因素引发，而不一定完全依赖特定菌群的丰度异常。因此，即使检测结果显示菌群丰度正常，如果仍出现相关疾病的症状，建议及时咨询医生进行更全面的检查和评估，以明确病因并采取适当的诊疗措施。











❓ 疾病症状相关菌的检测丰度较参考范围异常代表着一定会出现该疾病相关症状吗？

💡 疾病症状相关菌的检测丰度异常（无论是较参考范围偏少还是偏多）只是提示该菌群可能与某种疾病的相关症状相关，但它并不能直接证明一定会出现该疾病的相关症状。人体微生物组是一个复杂的生态系统，菌群丰度的变化受到多种因素的影响，包括饮食、生活习惯、遗传、药物使用等。此外，疾病的发生往往是多因素共同作用的结果，即使某种菌群与疾病存在关联，也需结合其他生物标志物、临床症状和医学检查进行综合评估。菌群的丰度异常更倾向于提供风险提示，如果确实出现了相关疾病症状，请及时咨询医生，以便得到专业诊断和治疗。

肥胖相关菌

i 肠道菌群失衡会显著影响人体的代谢功能，研究表明，肥胖人群的肠道菌群结构与正常体重人群存在明显差异，这种失衡可能是导致肥胖的重要因素之一。

肥胖相关菌名称	参考范围%	检测丰度%	相关性	相关性强度
厚壁菌门 Firmicutes	28.594-83.961	63.603	正相关	★★★★
i Firmicutes菌门的数量在肥胖人群中较高。可以从食物中提取更多的能量，并将其储存为脂肪。				
阿德勒氏菌属 Adlercreutzia	0-0.75	3.515 ↑	正相关	★★★★
i 能够代谢大豆异黄酮，促进女性肥胖。 b 改善建议：蔓越莓、附盆子、微晶纤维素、高饱和脂肪饮食				
双歧杆菌属 Bifidobacterium	1.755-35.501	0.794 ↓	正相关	★★★★
i 促进肠道内有益菌的生长，抑制有害菌的生长，减少肥胖相关的炎症反应和代谢紊乱，影响食欲和能量摄入，进而影响体重。				
嗜胆菌属 Bilophila	0-0.154	ND	正相关	★★★★
i Bilophila wadsworthia是一种能够产生硫化物的细菌，其在肥胖人群中的丰度较高。与代谢标志物（如血糖、胰岛素抵抗等）呈正相关。				
梭菌属 Clostridium	0-4.465	0.18	正相关	★★★★
i 肥胖者的丰度较高，尤其Clostridium butyricum，可通过增强营养吸收促进肥胖的发展。Clostridium ornithine和citrulline降低肥胖。				
埃希氏菌属 Escherichia	0-3.83	13.093 ↑	正相关	★★★★
i 肥胖人群丰度明显增加，能够产生酒精，从而导致血液中酒精水平升高，也可能是肥胖人群易患非酒精性脂肪肝性的原因之一。 b 改善建议：乳杆菌补充、双歧杆菌补充、大麦、大蒜				
霍尔德曼氏菌属 Holdemanian	0-0.378	0.019	正相关	★★★★
i 在肥胖人群中明显增加，与神经炎症、脂质和葡萄糖代谢障碍相关。与肥胖相关的肝硬化、糖尿病和代谢综合征等疾病有关。				

巨单胞菌属 <i>Megamonas</i>	0-0.692		正相关	★★★★
<i>i</i> 肥胖人群丰度较高，与糖尿病、炎症反应等代谢性疾病密切相关。				
震颤杆菌属 <i>Oscillibacter</i>	0-3.196		正相关	★★★★
<i>i</i> 在肥胖症患者中的丰度明显增加，与肥胖症的发生和发展密切相关。增加可能导致肠道菌群失衡，从而影响能量代谢和肥胖症的发生。				
丹毒丝菌科 <i>Erysipelotrichaceae</i>	0-1.716		正相关	★★★★
<i>i</i> 在肥胖人群中明显增加，与肥胖相关的代谢紊乱和炎症反应有关。 📌 改善建议：植物蛋白、亚麻籽、褪黑素				
红螭菌科 <i>Coriobacteriaceae</i>	0-10.241		正相关	★★★★
<i>i</i> 通过调节胆固醇吸收来影响能量代谢，与高脂饮食下的肝病和肥胖的抵抗力相关。				
脆弱拟杆菌 <i>Bacteroides fragilis</i>	0-0.05		正相关	★★★★
<i>i</i> 与婴儿3周和26周时的BMI呈正相关。可能通过抑制乙酸水平来加速肥胖，与ALT呈负相关。				
牙龈卟啉单胞菌 <i>Porphyromonas gingivalis</i>	0-0.05		正相关	★★★★
<i>i</i> Porphyromonas gingivalis是一种牙周病原菌，会导致饮食性肥胖，进一步增重，改变棕色脂肪组织的内分泌功能，影响肥胖。				
活泼瘤胃球菌 <i>Ruminococcus gnavus</i>	0-0.05		正相关	★★★★
<i>i</i> 与短链脂肪酸的产生有关。在女性中与ICPP、NAFLD和肥胖等疾病有关。 📌 改善建议：咖啡、乳杆菌补充、白藜芦醇、母乳低聚糖、羧甲基纤维素				
另枝菌属 <i>Alistipes</i>	0.081-18.12		正相关	★★★☆☆
<i>i</i> 高脂肪饮食促进其生长，在肥胖患者中丰度较高。				
厌氧棍状菌属 <i>Anaerotruncus</i>	0-0.137		正相关	★★★☆☆
<i>i</i> 在肠道菌群失调，饱和脂肪酸摄入量较高时丰度更高，与肥胖有关。				
柯林斯氏菌属 <i>Collinsella</i>	0-9.153		正相关	★★★☆☆
<i>i</i> 增加导致肠道微生物群落的失衡，潜在的促炎症成分增加，如短链脂肪酸减少，可能会导致肥胖和代谢综合征的发生。				

乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	0-0.43	0.031	正相关	★★★
<i>i</i> 肥胖人群中丰度增加，但是一些菌株能够对肥胖产生有益影响。与其抑制脂肪酸合成酶基因表达、降低脂肪酸氧化酶活性有关。				
乳球菌属 <i>Lactococcus</i>	0-0.058	0.012	正相关	★★★
<i>i</i> 肥胖人群的肠道微生物组中丰度较少，而正常体重人群中较多。参与调节肠道内的卡路里代谢和能量平衡，从而影响体重。				
颤螺菌属 <i>Oscillospira</i>	0.033-5.346	ND ↓	正相关	★★★
<i>i</i> Oscillospira过多或过少都与肥胖相关。益生菌或益生元可以增加Oscillospira的数量，从而减轻肥胖和代谢疾病的症状。				
副萨特氏菌属 <i>Parasutterella</i>	0-0.824	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 与L-半胱氨酸和脂肪酸生物合成途径有关。在肥胖人群中，丰度与BMI和2型糖尿病呈正相关。				
龙包茨氏菌属 <i>Romboutsia</i>	0-0.021	0.117 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 肠道黏膜屏障功能下降、肠道炎症反应增强、葡萄糖代谢异常等现象有关。 🚩 改善建议：胆汁（酸）、乳杆菌补充、芭蕉、茶叶				
瘤胃梭菌属 <i>Ruminiclostridium</i>	0-0	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 丰度与肥胖表型呈正相关。				
普雷沃氏菌科 <i>Prevotellaceae</i>	0-56.537	0.001	正相关	★★★
<i>i</i> 肥胖人群肠道中Prevotellaceae的丰度增加，女性中高丰度的Prevotellaceae与肥胖有关。				
具核梭杆菌 <i>Fusobacterium nucleatum</i>	0-0.05	0	正相关	★★★
<i>i</i> Fusobacterium nucleatum在肥胖人群中更为丰富，是一种机会性病原菌，与牙周病的发生和发展密切相关。				
扭链瘤胃球菌 <i>Ruminococcus torques</i>	0-3.836	2.88	正相关	★★★
<i>i</i> 增加导致牛磺酸结合胆酸（TCA）和脱氧胆酸（DCA）水平升高，并激活脂肪组织的G蛋白偶联胆酸受体（GPBAR1，TGR5）。				
棒杆菌属 <i>Corynebacterium</i>	0-0.05	0.033	正相关	★★★
<i>i</i> Corynebacterium jeddahense和K. massiliensis是从患有病态肥胖的人的粪便中分离出来的菌。				

戴阿利斯特杆菌属
Dialister 0-3.737 ND 正相关 ★★☆☆

i Dialister属与高炎症指数相关，运动可以增加Dialister属的丰度，从而改善肥胖儿童的肠道菌群组成。

粪杆菌属
Faecalibacterium 1.935-17.794 0.222 ↓ 正相关 ★★☆☆

i 肥胖人群中丰度明显降低，炎症反应增加。促进脂肪分解和吸收，减少脂肪的累积。促进肠道内瘦素的分泌，减少食欲和促进代谢。

纤毛菌属
Leptotrichia 0-0 ND 正相关 ★★☆☆

i 在肥胖女性中的相对丰度较高。与糖尿病、中风等代谢性疾病有关联。

巨球形菌属
Megasphaera 0-0.13 ND 正相关 ★★☆☆

i 在肥胖人群中富集。促进脂肪沉积和代谢。

普雷沃氏菌属
Prevotella 0-67.801 0.001 正相关 ★★☆☆

i 丰度与体重、腰围、BMI、脂肪质量指数、甘油三酯和高敏C-反应蛋白水平呈正相关，而与高密度脂蛋白胆固醇水平呈负相关。

瘤胃球菌属
Ruminococcus 0.054-19.799 2.426 正相关 ★★☆☆

i 肥胖者的肠道菌群中明显增加。产生支链氨基酸和谷氨酸等代谢物可增加肥胖可能性。

产碱菌科
Alcaligenaceae 0-0 ND 正相关 ★★☆☆

i 肥胖者肠道中相对丰度较高，可以产生内毒素LPS，引起慢性低度炎症，也是机会性病原菌，特别是在患有自闭症的儿童中。

赭色噬帽菌
Capnocytophaga ochracea 0-0 ND 正相关 ★★☆☆

i 肥胖女性的Streptococcus sanguinis、Streptococcus oralis和Capnocytophaga ochracea的水平显著高于非肥胖女性。

柯氏杆菌
Collinsella aerofaciens 0-10.121 2.539 正相关 ★★☆☆

i Collinsella aerofaciens是一种与肥胖和代谢综合征相关的微生物生物标志物。

长链多尔氏菌
Dorea longicatena 0-4.289 1.436 正相关 ★★☆☆

i Dorea longicatena是肥胖的生物标志物之一。

史氏甲烷短杆菌 <i>Methanobrevibacter smithii</i>	0-3.33	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 产生的甲烷与便秘、肠易激综合征和肥胖有关。				
血链球菌 <i>Streptococcus sanguinis</i>	0-0.05	0.005	正相关	★★★
<i>i</i> 研究还发现， <i>Streptococcus sanguinis</i> 、 <i>Streptococcus oralis</i> 和 <i>Capnocytophaga ochracea</i> 在肥胖女性中的水平显著高于非肥胖女性。				
艾克曼菌 <i>Akkermansia muciniphila</i>	0-6.639	0	负相关	★★★★
<i>i</i> 降低肠道黏膜的炎症程度、增加肠道屏障功能，降低肥胖相关的代谢疾病发生的风险				
粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i>	1.935-17.794	0.222 ↓	负相关	★★★★
<i>i</i> 肥胖人群中丰度明显降低，炎症反应增加。促进脂肪分解和吸收，减少脂肪的累积。促进肠道内瘦素的分泌，减少食欲和促进代谢。				
拟杆菌门 <i>Bacteroidetes</i>	19.203-90.8	0.469 ↓	负相关	★★★★
<i>i</i> 丰度与肥胖呈负相关，越多肥胖的风险越低。				
优杆菌属 <i>Eubacterium</i>	0.115-9.488	2.803	负相关	★★★
<i>i</i> <i>Eubacterium</i> 属的一些成员能够产生短链脂肪酸（SCFAs），通过影响宿主的能量平衡和代谢影响肥胖。				
卵形拟杆菌 <i>Bacteroides ovatus</i>	0-3.062	0.005	负相关	★★★
<i>i</i> 具有抗炎作用。在肥胖、2型糖尿病和动脉粥样硬化疾病患者中数量减少，具有保护作用。可以诱导肠道IgA的产生，有益于肠道稳态和免疫健康。				
颤螺菌属 <i>Oscillospira</i>	0.033-5.346	ND ↓	负相关	★★★
<i>i</i> <i>Oscillospira</i> 过多或过少都与肥胖相关，益生菌或益生元可以增加 <i>Oscillospira</i> 的数量，从而减轻肥胖和代谢疾病的症状。				

便秘相关菌

肠道菌群失衡与便秘密切相关。健康肠道需要微生物平衡，当有益菌减少时，肠道蠕动变慢，易导致便秘。便秘患者的菌群多样性降低，微生物组成异常，影响肠道正常功能。调节肠道菌群平衡，如补充益生菌和调整饮食，能有效改善便秘症状，促进肠道健康。

便秘相关菌种名称	参考范围%	检测丰度%	相关性	相关性强度
史氏甲烷短杆菌 <i>Methanobrevibacter smithii</i>	0-3.33	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 产生甲烷，而甲烷能够延迟肠道的传输时间，从而导致便秘。				
粪球菌属 <i>Coprococcus</i>	0.083-9.42	1.918	正相关	★★★
<i>i</i> Coprococcus的丰度过高或过低都可能与功能性便秘有关。				
埃希氏菌属 <i>Escherichia</i>	0-3.83	13.093 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 过度生长会导致色氨酸转化为吲哚，从而增加肠道细菌产生的吲哚含量，与慢性便秘患者尿液成分的改变有关。 🔔 改善建议：乳杆菌补充、双歧杆菌补充、大麦、大蒜				
毛螺菌属 <i>Lachnospira</i>	0.035-8.66	2.086	正相关	★★★
<i>i</i> 一些菌株能够产生乳酸和醋酸，这些物质通过抑制粘液分泌导致便秘。				
厌氧棍状菌属 <i>Anaerotruncus</i>	0-0.137	0.024	正相关	★★★
<i>i</i> 便秘患者的肠道中Anaerotruncus的数量明显增加。可以产生一些酸和气体等代谢产物，可能会刺激肠道神经，进一步影响肠道蠕动和排便功能。				
葡萄球菌属 <i>Staphylococcus</i>	0-0.05	0.003	正相关	★★★
<i>i</i> 感染导致后感染性肠易激综合征（PI-IBS）的潜在病原因素之一。与肠道梗阻和肠穿孔等疾病有关。				
链球菌属 <i>Streptococcus</i>	0-0.35	1.362 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 在IBS患者中富集，与便秘的发生和发展有关。 🔔 改善建议：蜂蜜、植物提取物、大蒜、大豆				

脆弱拟杆菌 <i>Bacteroides fragilis</i>	0-0.05	0.01	正相关	★★★
<i>i</i> 功能性便秘的儿童和老年患者中丰度增加。				
卵形拟杆菌 <i>Bacteroides ovatus</i>	0-3.062	0.005	正相关	★★★
<i>i</i> 在老年便秘患者和儿童功能性便秘患者中，相对丰度增加。				
下水道菌属 <i>Cloacibacillus</i>	0-0	0.051 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> Cloacibacillus在便秘患者的肠道中更为丰富。过度生长时，可能会导致肠道菌群失衡，从而引起便秘。				
梭菌属 <i>Clostridium</i>	0-4.465	0.18	正相关	★★★
<i>i</i> 便秘患者的肠道中Lachnospira和Clostridium的水平明显升高。而Clostridium difficile则被证明增加了后感染性肠易激综合征的风险。				
肠杆菌属 <i>Enterobacter</i>	0-0.5	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 与便秘症状有关。				
Erysipelatoclostridium	0-0.275	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 在便秘患者中相对更为丰富。				
粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i>	1.935-17.794	0.222 ↓	正相关	★★★
<i>i</i> 过多可能导致便秘，产生的丁酸可以抑制肠粘液分泌，减少粪便体积，促进结肠对水和电解质的吸收，抑制结肠平滑肌收缩，这些效应可能导致便秘。				
梭杆菌属 <i>Fusobacterium</i>	0-0.05	0.001	正相关	★★★
<i>i</i> 自闭症患者和慢性功能性便秘患者中，Fusobacterium的丰度增加。与结直肠癌变有关。产生有害代谢产物来影响肠道蠕动，从而导致便秘。				
霍尔德曼穆尔菌属 <i>Holdemanella</i>	0-1.161	ND	正相关	★★★
<i>i</i> Holdemanella丰度与便秘、不平衡的脂质代谢和慢性肾脏疾病有关，高丰度影响肠道蠕动和排便功能。				
霍尔德曼氏菌属 <i>Holdemania</i>	0-0.378	0.019	正相关	★★★
<i>i</i> 会使得结肠运输减慢导致便秘				
巨球形菌属 <i>Megasphaera</i>	0-0.13	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 在便秘患儿的肠道微生物群落中，Megasphaera的水平与便秘的严重程度有关。				

臭气杆菌属
Odoribacter

0-1.409

0.003

正相关



降低其丰度有助于改善便秘和抑郁样行为，可能与抑郁相关

副拟杆菌属
Parabacteroides

0.11-8.73

0.044 ↓

正相关



在克罗恩病和功能性便秘患者中的丰度比健康人更高。

瘤胃球菌属
Ruminococcus

0.054-19.799

2.426

正相关



其丰度过高与便秘的加重有关。其代谢产物可以影响肠道的运动和水分吸收，从而促进排便，因此缺乏也可能导致便秘。

链球菌属
Streptococcus

0-0.35

1.362 ↑

正相关



在IBS患者中富集，与便秘的发生和发展有关。

改善建议：蜂蜜、植物提取物、大蒜、大豆

双歧杆菌属
Bifidobacterium

1.755-35.501

0.794 ↓

负相关



可以与其他菌种合作产生短链脂肪酸和气体，促进肠道蠕动，缓解便秘症状。可以增加乳酸菌的丰度，从而缓解便秘。但也可能会促进腹胀症状的发生。

乳杆菌属
Lactobacillus

0-0.43

0.031

负相关



乳杆菌属参与短链脂肪酸和气体产生，刺激肠道蠕动。

阿克曼氏菌属
Akkermansia

0-5.798

0

负相关



调节肠道黏膜屏障的功能，促进肠道蠕动和水分吸收，减少肠道炎症反应，从而改善便秘症状。

经黏液真杆菌属
Blautia

0.085-6.906

10.285 ↑

负相关



在便秘患者中明显降低。通过摄入亚麻籽等食物，可以增加Blautia的数量，从而改善便秘症状。能够产生丁酸，可以促进肠道蠕动，从而改善便秘。

改善建议：高胆汁酸，红酒、啤酒

普雷沃氏菌属
Prevotella

0-67.801

0.001

负相关



可以分解纤维素和其他难以消化的食物成分，产生大量的短链脂肪酸，刺激肠道蠕动，促进排便。

梭菌属
Clostridium

0-4.465

0.18


负相关



便秘患者的肠道中Lachnospira和Clostridium的水平明显升高。而Clostridium difficile则被证明增加了后感染性肠易激综合征的风险。

瘤胃球菌属
Ruminococcus

0.054-19.799



2.426

负相关



 其丰度过高与便秘的加重有关。其代谢产物可以影响肠道的运动和水分吸收，从而促进排便，因此缺乏也可能导致便秘。

腹胀相关菌

肠道菌群失衡与腹胀症状关系密切。当肠道内产气菌群过度增殖时，肠道气体产生增多，容易导致腹部膨胀和不适感。腹胀患者常见双歧杆菌等有益菌减少，而产气细菌和产甲烷菌增多，导致肠道发酵异常。调节肠道菌群结构，减少高发酵食物摄入，补充特定益生菌，有助于缓解腹胀症状，恢复肠道健康。

腹胀相关菌名称	参考范围%	检测丰度%	相关性	相关性强度
史氏甲烷短杆菌 <i>Methanobrevibacter smithii</i>	0-3.33	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 发酵碳水化合物产生甲烷气体导致腹胀。				
拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>	1.058-47.323	0.173 ↓	正相关	★★★
<i>i</i> 过多可能会导致腹胀和腹痛等症状的加重。产生气体和有机酸，其中包括甲烷和氢气等气体，导致肠道胀气的症状。				
梭菌属 <i>Clostridium</i>	0-4.465	0.18	正相关	★★★
<i>i</i> 部分菌株与腹胀有显著的正相关性。				
瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i>	0.054-19.799	2.426	正相关	★★★
<i>i</i> Ruminococcus的相对丰度与腹胀的严重程度呈正相关。				
变形菌门 <i>Proteobacteria</i>	0-1.742	14.996 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 小肠细菌过度生长（SIBO）患者，其相对丰度明显增加，其中甲酸代谢通路的富集与氢气产生相关，导致出现腹痛、不适、腹胀、胀气和腹泻等症状。 🔔 改善建议：低脂饮食、牛磺酸、生酮饮食、聚甘露糖醛酸				
艰难梭菌 <i>Clostridium difficile</i>	0-0.05	0.24 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 过度生长和毒素产生时会导致腹胀和腹泻，可能导致严重疾病。 🔔 改善建议：乳杆菌补充、胆汁（酸）、芭蕉、茶叶				
肠球菌属 <i>Enterococcus</i>	0-0.05	0.059 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 过多可能与腹部肿块、腹痛等症状有关。 🔔 改善建议：乳杆菌补充、可可、母乳低聚糖、槲皮素				

普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	0-67.801	0.001	正相关	★☆☆
<i>Prevotella</i> 属菌可能与腹胀症状有关				
链球菌属 <i>Streptococcus</i>	0-0.35	1.362 ↑	正相关	★☆☆
Streptococcus感染可能与腹胀有关，导致肠道内气体产生增加，从而引起腹胀症状。 改善建议：蜂蜜、植物提取物、大蒜、大豆				
蓝藻门 <i>Cyanobacteria</i>	0-0	ND	正相关	★☆☆
丰度增加会导致腹胀、饱腹感或增加腹部不适的症状。				
产气荚膜梭菌 <i>Clostridium perfringens</i>	0-0.05	0.07 ↑	正相关	★☆☆
产生毒素，导致肠道上皮细胞坏死和溃烂，从而引起肠道内气体的积聚和膨胀，进而导致腹胀的发生。 改善建议：乳杆菌补充、双歧杆菌补充、可可、芽孢杆菌补充				
乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	0-0.43	0.031	负相关	★★★★
在儿童肠易激综合征患者中具有显著的减轻腹痛、打嗝、腹胀和便秘的作用。与高纤维饮食结合可有效减少结肠憩室病患者的腹胀和长期腹痛。				
毛螺旋菌科 <i>Lachnospiraceae</i>	1.825-46.849	42.669	负相关	★★★★
减少与腹胀有关。可将复杂的植物多糖发酵成乙酸、丁酸和丙酸等短链脂肪酸。				
双歧杆菌属 <i>Bifidobacterium</i>	1.755-35.501	0.794 ↓	负相关	★★★☆☆
与腹胀和腹痛等症状的减轻有关。口服VSL#3等益生菌可以增加有益菌的数量，从而改善便秘、腹泻等症状，并减轻腹胀的程度。				

过敏相关菌

肠道菌群失衡与过敏症状密切相关。健康的肠道微生物群落对免疫系统发育和调控至关重要。

过敏相关菌名称	参考范围%	检测丰度%	相关性	相关性强度
脆弱拟杆菌 <i>Bacteroides fragilis</i>	0-0.05	0.01	正相关	★★★
<i>i</i> 花粉过敏成年人丰度上升，可以通过补充双歧杆菌来预防。会诱导更多的Th2细胞因子。与花生和坚果过敏存在相关。				
枸橼酸杆菌属 <i>Citrobacter</i>	0-0.5	ND	正相关	★★★
<i>i</i> Citrobacter在食物过敏的肠道中明显富集。会加重系统性过敏症状并减少肠道Th17细胞。				
克雷伯氏菌属 <i>Klebsiella</i>	0-0.05	0.011	正相关	★★★
<i>i</i> 过度生长可能会导致肠道微生物群落失衡，从而引发过敏反应。过敏婴儿肠道中Klebsiella的数量明显增加，有益菌数量减少。				
莫拉氏菌属 <i>Moraxella</i>	0-0	ND	正相关	★★★
<i>i</i> 与哮喘等过敏性疾病有关联。儿童早期感染Moraxella会增加呼吸道疾病的严重程度和发生急性哮喘的风险。				
变形菌门 <i>Proteobacteria</i>	0-1.742	14.996 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 增加血液中的脂多糖内毒素，增加肠道通透性，导致慢性炎症反应。摄入低聚果糖可调节肠道微生物，改善过敏反应。 🔔 改善建议：低脂饮食、牛磺酸、生酮饮食、聚甘露糖醛酸				
肠杆菌科 <i>Enterobacteriaceae</i>	0-5.727	13.081 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 早期婴儿肠道微生物群落中，丰度的增加与食物敏感化的发展有关联。可以产生脂多糖（LPS），刺激HPA轴并与多种代谢性疾病的炎症有关。				
活泼瘤胃球菌 <i>Ruminococcus gnavus</i>	0-0.05	0.901 ↑	正相关	★★★
<i>i</i> 与食物过敏、哮喘、呼吸道过敏等疾病的发生有关。会导致肠道内炎症反应的加剧，从而引发过敏症状。降低肠道内纤维素降解酶的潜力。 🔔 改善建议：咖啡、乳杆菌补充、白藜芦醇、母乳低聚糖、羧甲基纤维素				

气单胞菌属 <i>Aeromonas</i>	0-0.05	ND	正相关	★☆☆
<i>i</i> 感染会引起过敏反应，如Kounis综合征，同时过敏患者对某些抗生素也可能存在过敏反应，因此需要注意过敏史				
经黏液真杆菌属 <i>Blautia</i>	0.085-6.906	10.285 ↑	正相关	★☆☆
<i>i</i> 高丰度可能会导致过敏疾病的发展，如婴儿的食物过敏和儿童的1型糖尿病。 🛎 改善建议：高胆汁酸，红酒、啤酒				
肠球菌属 <i>Enterococcus</i>	0-0.05	0.059 ↑	正相关	★☆☆
<i>i</i> 通过激活巨噬细胞，促进炎症过程，从而影响过敏或变态反应的人类IgE抗体调节。 🛎 改善建议：乳杆菌补充、可可、母乳低聚糖、槲皮素				
粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i>	1.935-17.794	0.222 ↓	正相关	★☆☆
<i>i</i> 能够产生丰富的短链脂肪酸和其他代谢物。减少过敏原物质的进入和吸收。减少过度的免疫和炎症反应，降低过敏的严重程度和持续时间。				
丙酸杆菌属 <i>Propionibacterium</i>	0-0	0.001 ↑	正相关	★☆☆
<i>i</i> 能够产生丙酸和细菌素，可以防止S. aureus或其他病原菌的增殖，被认为具有抗过敏的作用，包括对哮喘和AD的保护作用。 🛎 改善建议：乳杆菌补充				
罗氏菌属 <i>Roseburia</i>	0.583-16.358	0.145 ↓	正相关	★☆☆
<i>i</i> 可产生丁酸的益生菌，食物过敏患者的肠道中Roseburia的丰度较低。通过膳食干预或益生菌治疗，可以增加Roseburia的丰度，促进过敏的缓解。				
链状双歧杆菌 <i>Bifidobacterium catenulatum</i>	0-0.508	0.001	正相关	★☆☆
<i>i</i> 成人型菌株可能会促进过敏炎症所特有的Th2偏向免疫反应。				
铜绿假单胞菌 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0-0.05	ND	正相关	★☆☆
<i>i</i> 感染也可能会引起过敏反应，也可能会导致过敏性支气管肺曲霉病（ABPA）的发生。增加宿主患上过敏性疾病的风险。				
双歧杆菌属 <i>Bifidobacterium</i>	1.755-35.501	0.794 ↓	负相关	★★★★
<i>i</i> 可以调节肠道免疫系统，减少过敏反应。Bifidobacterium可以改善过敏症状，如哮喘和湿疹。可以进一步提高其对过敏的保护作用。				

乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	0-0.43	0.031	负相关	★★★★
<i>i</i> 可以减轻食物过敏和湿疹等过敏症状。可以通过降低食物中过敏原的含量来减轻过敏症状。				
粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i>	1.935-17.794	0.222 ↓	负相关	★★★★
<i>i</i> 产生丰富的短链脂肪酸，如丙酸、丁酸和乙酸等，维持肠道健康和免疫系统的正常功能，促进免疫系统的平衡，减少过敏症状的发生。				
艾克曼菌 <i>Akkermansia muciniphila</i>	0-6.639	0	负相关	★★★★
<i>i</i> 可以调节肠道微生物群和短链脂肪酸预防过敏，阻断免疫细胞的流入，减轻病理，降低了炎症水平				
阿克曼氏菌属 <i>Akkermansia</i>	0-5.798	0	负相关	★★★
<i>i</i> 减少多种炎症标志物，修复肠道，富含多酚的蔓越莓提取物和其他富含类黄酮的食物，包括绿茶和红茶可提高Akk水平				
拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>	1.058-47.323	0.173 ↓	负相关	★★★
<i>i</i> 在婴儿期和幼儿期，丰度降低与食物过敏或特应性皮炎的发生有关。过多也与过敏结果有关，包括哮喘、花粉症和食物过敏等。				
经黏液真杆菌属 <i>Blautia</i>	0.085-6.906	10.285 ↑	负相关	★★★
<i>i</i> 高丰度可能会导致过敏疾病的发展，如婴儿的食物过敏和儿童的1型糖尿病。 📌 改善建议：高胆汁酸，红酒、啤酒				
未知 <i>Dorea</i> 菌属 <i>Dorea</i>	0.058-5.212	3.291	负相关	★★★
<i>i</i> Dorea与食物过敏和免疫有关。有助于保护免疫系统免受食物敏感和食物过敏的影响。				
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	0-67.801	0.001	负相关	★★★
<i>i</i> 孕期母亲肠道微生物中Prevotella的丰度增加可以预防食物过敏。在食物过敏患者中，Prevotella的丰度较低。				
罗氏菌属 <i>Roseburia</i>	0.583-16.358	0.145 ↓	负相关	★★★
<i>i</i> 可产生丁酸的益生菌，食物过敏患者的肠道中Roseburia的丰度较低。通过膳食干预或益生菌治疗，可以增加Roseburia的丰度，促进过敏的缓解。				

青春双歧杆菌

Bifidobacterium adolescentis

0-14.286

0.002

负相关

★★★

i

过敏儿童的肠道中数量较少。缺乏可能导致免疫系统的失调，使食物过敏原更容易穿过肠道屏障，导致食物敏感性的增加。

Lachnoclostridium

0-0.209

0.399 ↑

负相关

★★★

i

Lachnoclostridium可产生短链脂肪酸，减少食物过敏的发生。

🔔

改善建议：植物蛋白质、高脂饮食

普通拟杆菌

Bacteroides vulgatus

0-20.066

0.082

负相关

★★★

i

食物过敏与Bacteroides vulgatus相对丰度呈负相关。

抑郁相关菌

i 肠道菌群失衡与过敏症状密切相关。健康的肠道微生物群落对免疫系统发育和调控至关重要，当有益菌减少时，肠道屏障功能受损，免疫耐受机制被破坏。

抑郁相关菌名称	参考范围%	检测丰度%	相关性	相关性强度
脱硫弧菌属 <i>Desulfovibrio</i>	0-0.05	0.154 ↑	正相关	★★★★
i 可以通过产生有毒代谢产物，如硫化氢和LPS，导致肠道黏膜屏障的破坏和炎症反应的增加，从而影响神经递质的合成和释放，最终导致抑郁症的发生。 🔔 改善建议： 特级初榨橄榄油、多酚、黄酮类物质				
另枝菌属 <i>Alistipes</i>	0.081-18.12	0.154	正相关	★★★☆☆
i 高脂或动物性饮食中会富集，患有抑郁症的患者比例较高，与炎症有关，可以影响色氨酸的可用性，从而干扰肠道内的血清素系统。				
拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>	1.058-47.323	0.173 ↓	正相关	★★★☆☆
i 产生益生元和短链脂肪酸影响神经递质的水平，减轻抑郁和焦虑症状。还可以产生γ-氨基丁酸（GABA）降低与抑郁和焦虑有关的神经递质水平。				
埃希氏菌属 <i>Escherichia</i>	0-3.83	13.093 ↑	正相关	★★★☆☆
i 丰度与系统性炎症存在显著正相关，可能导致血脑屏障通透性增加和慢性神经炎症，最终导致抑郁症状。与焦虑和抑郁成正相关。 🔔 改善建议： 乳杆菌补充、双歧杆菌补充、大麦、大蒜				
解黄酮菌属 <i>Flavonifractor</i>	0-0.729	0.042	正相关	★★★☆☆
i 会代谢消耗γ-氨基丁酸（GABA），影响抑郁症的发生和发展。				
震颤杆菌属 <i>Oscillibacter</i>	0-3.196	0.172	正相关	★★★☆☆
i 可以产生氨基丁酸（GABA）的同源物，在抑郁症患者中更高，与肠道屏障的紧密连接蛋白表达和肠道上皮阻力呈负相关，对肠道屏障有害。				
副拟杆菌属 <i>Parabacteroides</i>	0.11-8.73	0.044 ↓	正相关	★★★☆☆
i 相对丰度与抑郁症状严重程度一致。				

放线菌属 <i>Actinomyces</i>	0-0.054	0.103 ↑	正相关	★☆☆
与抑郁症以及一些慢性炎症性疾病，如克罗恩病和抑郁症状的加重有关。 改善建议：植物蛋白、坚果、乳杆菌补充、双歧杆菌补充、锌				
厌氧棒状菌属 <i>Anaerostipes</i>	0.093-9.555	13.688 ↑	正相关	★☆☆
抑郁症患者中明显增加。还与情绪和行为异常有关。 改善建议：乳杆菌补充、白藜芦醇、地中海饮食、槲皮素、白藜芦醇				
经黏液真杆菌属 <i>Blautia</i>	0.085-6.906	10.285 ↑	正相关	★☆☆
与肠道黏膜炎症有关，而肠道炎症与抑郁症和焦虑症有关。 改善建议：高胆汁酸，红酒、啤酒				
梭菌属 <i>Clostridium</i>	0-4.465	0.18	正相关	★☆☆
在抑郁症患者中，Clostridium属的丰度显著增加。				
爱格士氏菌属 <i>Eggerthella</i>	0-0.043	0.367 ↑	正相关	★☆☆
抑郁症患者丰度较高。与短链脂肪酸（SCFAs）消耗有关。 改善建议：地中海饮食、精氨酸				
嗜血杆菌属 <i>Haemophilus</i>	0-0.098	ND	正相关	★☆☆
丰度与负面心理症状、认知、兴奋和抑郁等因素呈正相关。				
霍尔德曼氏菌属 <i>Holdemania</i>	0-0.378	0.019	正相关	★☆☆
磷酸戊糖和淀粉和蔗糖代谢过程是抑郁症的重要途径。霍尔德曼氏菌属在葡萄糖代谢和代谢综合征中发挥作用。				
克雷伯氏菌属 <i>Klebsiella</i>	0-0.05	0.011	正相关	★☆☆
引起抑郁和结肠炎，且这种关联是剂量依赖性的。可能是由于肠道菌群失调引起的神经炎症反应所致。				
副普雷沃氏菌属 <i>Paraprevotella</i>	0-0.761	ND	正相关	★☆☆
抑郁症患者的肠道菌群中Paraprevotella的丰度与抑郁症严重程度呈正相关。通过LPS刺激免疫反应和促炎症细胞因子的释放。				
副萨特氏菌属 <i>Parasutterella</i>	0-0.824	ND	正相关	★☆☆
社交焦虑症患者体内的的丰度增加。应激下丰度升高，会影响色氨酸代谢				

普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	0-67.801	0.001	正相关	★☆☆
<i>Prevotella</i> 与多种神经递质的产生有关，如γ-氨基丁酸（GABA）和色氨酸途径。缺乏可能导致肠道菌群失衡，进而影响心理健康。				
韦荣菌属 <i>Veillonella</i>	0-0.009	0.002	正相关	★☆☆
与抑郁症等精神疾病的发生有关。在患有抑郁症和认知障碍的人的微生物群中数量较高。能够产生多种毒素，如溶血素、链溶素等。				
单形拟杆菌 <i>Bacteroides uniformis</i>	0-17.741	0.062	负相关	★★★
与抑郁呈负相关，通过产生丁酸和丙酸，还可能调节天冬氨酸、谷氨酸、色氨酸等氨基酸代谢途径（例如，将谷氨酸转化为γ-氨基丁酸；将色氨酸转化为血清素、犬尿酸或色胺），影响牛磺酸和皮质醇代谢				
普氏栖粪杆菌 <i>Faecalibacterium prausnitzii</i>	0.18-14.003	0.116 ↓	负相关	★★★
抑郁患者中丰度降低，可以降低皮质酮和C反应蛋白(CRP)水平，同时提高IL-10水平				
食葡萄糖罗斯拜瑞氏菌 <i>Roseburia inulinivorans</i>	0-2.765	ND	负相关	★★★
潜在的精神益生菌，影响丙酸和丁酸、氨基酸、牛磺酸、皮质醇的代谢，减轻焦虑和抑郁				
双歧杆菌属 <i>Bifidobacterium</i>	1.755-35.501	0.794 ↓	负相关	★★★
调节肠道菌群平衡、减少炎症反应、增加血清色氨酸水平等，可通过多种途径实现减轻焦虑和抑郁症状。				
粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i>	1.935-17.794	0.222 ↓	负相关	★★★
患有双相情感障碍和重度抑郁症的患者肠道中 <i>Faecalibacterium</i> 水平较低。丰度与生活质量得分呈正相关，与抑郁症状呈负相关。				
乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	0-0.43	0.031	负相关	★★★
通过上调海马体中的GABA来缓解抑郁症。 <i>Lactobacillus helveticus</i> 可以通过降低血清犬尿氨酸/色氨酸比值来预防抑郁症。				
罗氏菌属 <i>Roseburia</i>	0.583-16.358	0.145 ↓	负相关	★★★
能够产生短链脂肪酸调节肠道-脑轴，从而影响情绪和行为。抑郁症患者丰度较低，提高 <i>Roseburia</i> 丰度可能有助于缓解抑郁症状。				

拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>	1.058-47.323	0.173 ↓ 	负相关	★☆☆
产生益生元和短链脂肪酸，影响神经递质的水平，减轻抑郁和焦虑症状。还可以产生γ-氨基丁酸（GABA）降低与抑郁和焦虑有关的神经递质水平。				
优杆菌属 <i>Eubacterium</i>	0.115-9.488	2.803 	负相关	★☆☆
与改善焦虑和抑郁症状有显著的正相关性。与降低血清炎症标志物、增加短链脂肪酸和支链脂肪酸的产生等有关。				
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	0-67.801	0.001 	负相关	★☆☆
Prevotella与多种神经递质的产生有关，如γ-氨基丁酸（GABA）和色氨酸途径。缺乏可能导致肠道菌群失衡，进而影响心理健康。				

失眠相关菌

肠道菌群失衡与失眠存在显著关联。通过肠-脑轴，肠道微生物可影响大脑功能和睡眠调节。失眠患者的肠道菌群多样性常见降低，某些有益菌群比例减少。

失眠相关菌名称	参考范围%	检测丰度%	相关性	相关性强度
拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>	1.058-47.323	0.173 ↓	正相关	★★★★
i 丰度与睡眠效率和炎症因子IL-6的浓度呈正相关。				
梭菌目 <i>Clostridiales</i>	6.265-69.865	9.694	正相关	★★★★
i 丰度与睡眠效率和炎症因子IL-6的浓度呈正相关。				
经黏液真杆菌属 <i>Blautia</i>	0.085-6.906	10.285 ↑	正相关	★★★
i 慢性失眠患者的睡眠质量和白细胞介素-1（IL-1）水平显著相关。可能通过影响线粒体功能来影响睡眠。 🔔 改善建议：高胆汁酸，红酒、啤酒				
梭菌属 <i>Clostridium</i>	0-4.465	0.18	正相关	★★★
i 失眠相关，与特定代谢物（Amide c18、Benzoyl chloride、Cytosine和N, n-dimethylarginine）的水平正相关。				
链球菌属 <i>Streptococcus</i>	0-0.35	1.362 ↑	正相关	★★★
i 其丰度在失眠患者中显著高于对照。 🔔 改善建议：蜂蜜、植物提取物、大蒜、大豆				
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	0-67.801	0.001	正相关	★★★
i 与失眠相关的氨基酸代谢和炎症因子IL-1之间存在关联。可能通过调节氨基酸代谢和促炎因子来影响睡眠。				
龙包茨氏菌属 <i>Romboutsia</i>	0-0.021	0.117 ↑	正相关	★★★
i 丰度在失眠患者中显著增加，而在治疗后有所降低。 🔔 改善建议：胆汁（酸）、乳杆菌补充、芭蕉、茶叶				
粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i>	1.935-17.794	0.222 ↓	负相关	★★★★
i 与慢性失眠负相关，可能与宿主的葡萄糖稳态和脂质代谢有关。				

阿克曼氏菌属

Akkermansia

0-5.798

0

负相关

★★★

i 增加丰度有助于预防肥胖、动脉粥样硬化和失眠等健康问题。

长双歧杆菌

Bifidobacterium longum

0-6.854

0.696

负相关

★★★

i 通过改变肠道菌群和抑制肠道细菌LPS的产生，改善认知功能。

Lachnoclostridium

0-0.209

0.399 ↑

负相关

★★★

i 与失眠患者的自我报告睡眠效率(SE)呈正相关。

🔔 改善建议：植物蛋白质、高脂饮食

检出肠道细菌

i 下列表格展示了您肠道中实际检出的细菌。如果检测到的细菌超过35种，则仅列出丰度最高的前35种。

细菌拉丁名	细菌中文名	参考范围%	检出丰度%
<i>Anaerostipes hadrus</i>	宠大厌氧棒状菌	0-5.593	13.345
<i>Escherichia coli</i>	大肠埃希氏菌	0-3.836	10.085
<i>uncultured bacterium</i>	uncultured bacterium	0-0.001	3.907
<i>Erysipelatoclostridium ramosum</i>	<i>Erysipelatoclostridium ramosum</i>	0-0.082	3.746
<i>Blautia obeum</i>	卵形布劳特氏菌	0-2.652	3.430
<i>Anaerobutyricum hallii</i>	霍尔氏厌氧丁酸杆菌	0-3.551	3.193
<i>[Ruminococcus] torques</i>	<i>[Ruminococcus] torques</i>	0-3.836	2.880
<i>Adlercreutzia equolifaciens</i>	产雌马阿德勒氏菌	0-0.731	2.706
<i>Faecalibacillus intestinalis</i>	肠道人粪杆菌	0-0.001	2.699
<i>Blautia massiliensis</i>	<i>Blautia massiliensis</i>	0-0.001	2.679
<i>Collinsella aerofaciens</i>	产气柯林斯氏菌	0-10.121	2.539
<i>Eubacterium callanderi</i>	卡氏真杆菌	0-0.001	2.508
<i>Blautia wexlerae</i>	韦氏布劳特氏菌	0-1.970	2.356
<i>Dorea formicigenerans</i>	产甲酸多尔氏菌	0-1.384	1.772
<i>[Ruminococcus] lactaris</i>	<i>[Ruminococcus] lactaris</i>	0-1.661	1.729
<i>Coprococcus catus</i>	规则粪球菌	0-1.492	1.504
<i>Dorea longicatena</i>	长链多尔氏菌	0-4.289	1.436
<i>Lachnospira eligens</i>	挑剔毛螺菌	0-4.489	1.434
<i>Massilistercora timonensis</i>	<i>Massilistercora timonensis</i>	0-0.001	1.086
<i>[Ruminococcus] gnavus</i>	<i>[Ruminococcus] gnavus</i>	0-0.929	0.901
<i>Bifidobacterium longum</i>	长双歧杆菌	0-6.854	0.696
<i>Ruthenibacterium lactatiformans</i>	产乳酸俄罗斯杆菌	0-0.734	0.53
<i>Emergencia timonensis</i>	<i>Emergencia timonensis</i>	0-0.001	0.519
<i>Amedibacterium intestinale</i>	肠道日医学研究开发署杆状菌	0-0.001	0.512
<i>Clostridiales bacterium</i>	<i>Clostridiales bacterium</i>	0-0.001	0.495
<i>Blautia hydrogenotrophica</i>	氢养布劳特氏菌	0-0.026	0.457
<i>Blautia sp. SC05B48</i>	<i>Blautia sp. SC05B48</i>	0-0.001	0.445
<i>Streptococcus salivarius</i>	唾液链球菌	0-1.039	0.438
<i>Enterocloster bolteae</i>	波尔特氏肠道梭状菌	0-0.095	0.429
<i>[Clostridium] spiroforme</i>	<i>[Clostridium] spiroforme</i>	0-0.068	0.411
<i>[Eubacterium] rectale</i>	直肠真杆菌	0-13.029	0.389
<i>Eggerthella lenta</i>	缓慢爱格士氏菌	0-0.311	0.36
<i>Lachnospiraceae bacterium KGM03038</i>	<i>Lachnospiraceae bacterium KGM03038</i>	0-0.001	0.345
<i>[Clostridium] scindens</i>	<i>[Clostridium] scindens</i>	0-0.001	0.317
<i>Coprococcus comes</i>	伶俐粪球菌	0-2.799	0.306

检出肠道真菌

i 下列表格展示了您肠道中实际检出的真菌。如果检测到的真菌超过35种，则仅列出丰度最高的前35种。

真菌拉丁名	真菌中文名	参考范围%	检出丰度%
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	酿酒酵母	0-0.05	0.01903

检出肠道真核生物

i 下列表格展示了您肠道中实际检出的真核生物。如果检测到的真核生物超过35种，则仅列出丰度最高的前35种。

真核生物拉丁名	真核生物中文名	参考范围%	检出丰度%
暂无检出真核生物数据			

检出肠道病毒

i 下列表格展示了您肠道中实际检出的病毒。如果检测到的病毒超过35种，则仅列出丰度最高的前35种。

病毒拉丁名	病毒中文名	参考范围%	检出丰度%
暂无检出病毒			

个性化饮食推荐

i 我们为您提供了200多种常见食物的个性化推荐指数，评分范围从 -100 到 100，并附有每种食物的详细营养成分构成（基于每 100g 计算）。

- **推荐原理**

- 基于您的肠道菌群构成、营养状况和疾病风险进行综合评估
- 计算每种食物的营养构成与您当前营养状况的匹配程度
- 考虑特定疾病需要避免的食物
- 正分值表示建议增加摄入，负分值表示建议减少摄入
- 对于营养缺乏的成分，含该营养较高的食物会获得更高的推荐分值


- **使用说明**

- 本推荐适用于成年人，不适合 2 岁以下婴幼儿
- 母乳喂养期间，可作为母亲的膳食参考
- 建议2个月后重新检测更新建议，以适应健康状况变化

- **数据来源**

- 基于大规模人群营养饮食调查
- 参考《2017中国居民膳食指南》
- 采用机器学习和统计方法计算
- 营养成分数据参考了来自 USDA 食品成分数据库

个性化饮食推荐TOP30



主食类饮食推荐

i 主食类饮食是指以谷物、淀粉类食物为主要组成部分的饮食习惯，通常包括米饭、面条、面包、土豆、玉米等。主食是人体获取能量的主要来源，富含碳水化合物，是维持日常活动和身体功能所需的重要营养成分。

食物名称	推荐指数	能量(KJ)	蛋白(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	淀粉(g)	膳食纤维(g)	胆固醇(mg)
玉米粒	74.2	298	1	0	14	14	0	0
燕麦	73.4	297	17	6	66	0	1	0
大麦	71.0	1481	12	2	73	0	17	0
小麦	60.1	1423	10	1	75	0	12	0
玉米饼	45.5	912	5	2	44	0	6	0
小米	43.7	1582	11	4	72	0	8	0
意大利面	33.3	386	1	3	13	0	2	0
荞麦面粉	27.0	1402	12	3	70	0	10	0
黑麦面包	24.8	1188	9	3	53	0	6	0
鸡蛋面包	4.9	1201	9	6	47	0	2	51
米饭	2.5	1527	7	0	79	0	1	0
葡萄干 浆即食 谷物	0	1354	7	1	78	0	13	0
面条	-3.4	1609	14	4	71	0	3	84
小麦面包	-9.8	1116	10	3	48	36	4	0

肉类推荐



肉类饮食是指以各种肉类为主要组成部分的饮食习惯，包括红肉（如牛肉、羊肉、猪肉）、禽肉（如鸡肉、鸭肉）和海鲜（如鱼、虾、贝类等）。

食物名称	推荐指数	能量(KJ)	蛋白(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	淀粉(g)	膳食纤维(g)	胆固醇(mg)
鹅肝	56.4	556	16	4	6	0	0	515
鸡肝	44.1	496	16	4	0	0	0	345
猪肝	41.2	690	26	4	3	0	0	355
牛蛙	34.0	305	16	0	0	0	0	50
牛肉瘦	33.0	488	23	2	0	0	0	55
猪瘦肉	25.2	562	21	4	0	0	0	64
鸡心	22.0	640	15	9	0	0	0	136
瘦羊肉	13.0	862	28	9	0	0	0	92
火鸡	11.3	790	28	7	0	0	0	109
牛肉汤	6.7	25	1	0	0	0	0	0
鹌鹑	6.4	803	19	12	0	0	0	76
鸡汤	0.5	26	0	0	0	0	0	2
火腿	-6.9	683	16	8	3	0	1	57
猪蹄	-15.3	889	23	12	0	0	0	88
猪耳朵	-15.6	695	15	10	0	0	0	90
烧鹅	-19.5	1276	25	21	0	0	0	91
猪脑	-26.1	577	12	9	0	0	0	2552
鸡肉	-26.7	604	28	3	0	0	0	86
烤肉	-30.5	1512	20	30	0	0	0	105
烟熏火腿	-32.3	591	18	2	10	0	0	50
肉丸	-42.5	1196	14	22	8	2	2	66
猪头肉	-43.7	658	13	10	0	0	0	69

烤鸭	-45.7	1410	18	28	0	0	0	84
猪培根	-94.8	1744	12	39	1	0	0	66
肥猪肉	-94.9	2449	10	60	0	0	0	81
牛肉肥	-100.0	2845	10	70	0	0	0	95
肥羊肉	-100.0	2782	6	70	0	0	0	90

水产品推荐

i 水产品饮食是指以鱼类、贝类、甲壳类等水生动物为主要食材的饮食习惯。这类食品常见于地中海饮食和亚洲饮食中，因其营养丰富而备受推崇。

食物名称	推荐指数	能量(KJ)	蛋白(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	淀粉(g)	膳食纤维(g)	胆固醇(mg)
沙丁鱼	62.5	347	0	1	19	0	5	0
牡蛎	48.2	339	9	2	4	0	0	50
章鱼	46.0	343	14	1	2	0	0	48
鲷鱼	41.2	418	20	1	0	0	0	37
鳕鱼	39.3	364	18	0	0	0	0	41
石斑鱼	39.0	385	19	1	0	0	0	37
鲈鱼	37.8	381	19	0	0	0	0	90
蟹	37.6	364	18	1	0	0	0	78
小龙虾	37.4	322	15	0	0	0	0	114
大比目鱼	36.7	382	18	1	0	0	0	49
条纹鲈鱼	35.8	406	17	2	0	0	0	80
金枪鱼	34.5	602	23	4	0	0	0	38
贻贝	30.0	360	11	2	3	0	0	28
鲟鱼	29.3	519	20	4	0	0	0	59

鱿鱼	29.0	385	15	1	3	0	0	233
鲟鱼	28.8	439	16	4	0	0	0	60
墨鱼	28.1	331	16	0	0	0	0	112
鲤鱼	26.1	531	17	5	0	0	0	66
三文鱼	24.1	594	19	6	0	0	0	55
龙虾	23.8	324	16	0	0	0	0	127
鲍鱼	22.8	439	17	0	6	0	0	85
凤尾鱼	22.6	548	20	4	0	0	0	60
鳟鱼	21.9	619	20	6	0	0	0	58
蛤蜊	20.9	360	14	0	3	1	0	30
白鲑	20.8	611	17	8	0	0	0	65
海鲈鱼	20.1	332	15	1	0	0	0	52
扇贝	18.7	289	12	0	3	2	0	24
黄尾	18.5	611	23	5	0	0	0	55
鲾鱼	17.3	294	12	1	0	0	0	45
鲭鱼	14.8	858	18	13	0	0	0	70
虾	12.8	297	13	1	0	0	0	126
鳗鱼	8.9	770	18	11	0	0	0	126
大西洋鳕鱼	0	343	17	0	0	0	0	43
鲱鱼	-0.8	661	17	9	0	0	0	60
鱼子酱	-14.9	1105	24	17	4	0	0	588

乳制品推荐

i 乳制品饮食是指以牛奶及其衍生产品（如酸奶、奶酪、黄油等）为主要组成部分的饮食习惯。乳制品是重要的营养来源，富含蛋白质、钙、维生素D和多种微量元素。

食物名称	推荐指数	能量(KJ)	蛋白(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	淀粉(g)	膳食纤维(g)	胆固醇(mg)
脱脂牛奶	42.4	142	3	0	4	0	0	2
牛奶	25.9	268	3	3	4	0	0	14
冰淇淋	2.2	690	1	3	32	0	0	8
奶油	-2.8	515	3	10	4	0	0	35
奶酪	-30.2	1552	23	29	2	0	0	94
黄油	-100.0	2999	0	81	0	0	0	215

蔬菜推荐

i 蔬菜类饮食是指以各种蔬菜为主要组成部分的饮食习惯。蔬菜富含维生素、矿物质、纤维和抗氧化物质，对维护健康和预防疾病有重要作用。

食物名称	推荐指数	能量(KJ)	蛋白(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	淀粉(g)	膳食纤维(g)	胆固醇(mg)
生姜	100.0	75	0	0	3	0	1	0
羽衣甘蓝	100.0	207	4	0	8	0	3	0
芥末	100.0	114	2	0	4	0	3	0
苦瓜	100.0	126	5	0	3	0	0	0
菊苣	100.0	71	0	0	4	0	3	0
藜	100.0	180	4	0	7	0	4	0
豌豆	100.0	176	2	0	7	0	2	0
豇豆	99.0	376	2	0	18	0	5	0
牛蒡根	98.7	302	1	0	17	0	3	0

西兰花	98.3	141	2	0	6	0	2	0
花椒	97.8	80	0	0	4	0	1	0
蕨类	97.4	143	4	0	5	0	0	0
竹笋	95.5	115	2	0	5	0	2	0
白萝卜	94.1	59	1	0	2	0	1	0
红心萝卜	92.7	132	1	0	7	0	3	0
小萝卜	92.4	76	0	0	4	0	1	0
大白菜	91.9	55	1	0	2	0	1	0
甜菜叶	91.8	92	2	0	4	0	3	0
西红柿	89.7	74	0	0	3	0	1	0
甜菜	88.6	180	1	0	9	0	2	0
苋菜叶	88.4	97	2	0	4	0	0	0
秋葵	87.6	138	1	0	7	0	3	0
韭菜	87.6	126	3	0	4	0	2	0
豆芽	87.1	510	13	6	9	0	1	0
大蒜	86.4	623	6	0	33	0	2	0
芋头	86.1	469	1	0	26	0	4	0
南瓜	86.0	109	1	0	6	0	0	0
菠菜	86.0	97	2	0	3	0	2	0
香菇	85.3	160	1	0	6	0	3	0
四季豆	85.2	131	1	0	6	0	2	0
菜豆	83.9	280	6	0	13	0	0	0
白蘑菇	82.9	93	3	0	3	0	1	0
甜椒	82.1	84	0	0	4	0	1	0
芹菜	81.7	67	0	0	2	0	1	0
大豆	80.9	614	12	6	11	0	4	0

土豆	80.6	322	2	0	17	15	2	0
扁豆	78.7	444	8	0	22	0	0	0
绿豆	78.7	126	3	0	5	0	1	0
生菜	77.3	62	1	0	2	0	1	0
茄子	75.2	104	0	0	5	0	3	0
山药	74.9	343	1	0	20	0	0	0
芦笋	74.8	85	2	0	3	0	2	0
芝麻	74.5	2397	17	49	23	0	11	0
土豆面粉	74.3	1493	6	0	83	0	5	0
花椰菜	73.9	104	1	0	4	0	2	0
白菜	73.0	48	1	0	1	0	1	0
蘑菇	72.1	141	2	0	6	0	2	0
黄瓜	72.1	65	0	0	3	0	0	0
卷心菜	69.1	103	1	0	5	0	2	0
炒蘑菇	69.1	110	3	0	4	0	1	0
木薯	68.8	667	1	0	38	0	1	0
红豆	65.1	121	4	0	4	0	0	0
炒香菇	63.4	162	3	0	7	0	3	0
辣椒	60.0	88	0	0	5	0	1	0
洋葱	46.4	166	1	0	9	0	1	0
甜玉米	44.0	360	3	1	18	5	2	0
甘薯	33.0	359	1	0	20	12	3	0
胡萝卜	15.1	173	0	0	9	1	2	0
番茄汁	9.3	72	0	0	3	0	0	0
小南瓜	0	69	1	0	3	0	1	0

水果推荐

i 水果类饮食是指以新鲜水果为主要组成部分的饮食习惯。水果不仅美味可口，而且富含维生素、矿物质、抗氧化物和膳食纤维，对健康有诸多益处。

食物名称	推荐指数	能量(KJ)	蛋白(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	淀粉(g)	膳食纤维(g)	胆固醇(mg)
石榴	89.5	346	1	1	18	0	4	0
桑葚	87.2	180	1	0	9	0	1	0
黑莓	81.8	181	1	0	9	0	5	0
榴莲	81.6	615	1	5	27	0	3	0
柠檬	81.3	121	1	0	9	0	2	0
龙眼	79.9	251	1	0	15	0	1	0
杨桃	79.8	128	1	0	6	0	2	0
梨	79.1	239	0	0	15	0	3	0
橙皮	77.1	405	1	0	25	0	10	0
橙汁	76.3	188	0	0	10	0	0	0
葡萄柚	72.4	134	0	0	8	0	1	0
葡萄	67.6	280	0	0	17	0	0	0
覆盆子	67.3	220	1	0	11	0	6	0
面包果酱	61.6	431	1	0	27	0	4	0
鳄梨	59.3	670	2	14	8	0	6	0
荔枝	57.6	276	0	0	16	0	1	0
无花果	54.7	310	0	0	19	0	2	0
蔓越莓	46.3	191	0	0	11	0	3	0
草莓	45.0	136	0	0	7	0	2	0
橙菠萝汁	40.6	214	0	0	12	0	0	0

蓝莓	39.5	240	0	0	14	0	2	0
番木瓜	39.2	179	0	0	10	0	1	0
猕猴桃	36.2	255	1	0	14	0	3	0
樱桃	9.7	1395	1	0	80	0	2	0
柿子	4.9	293	0	0	18	0	3	0
西瓜	-5.0	127	0	0	7	0	0	0
红苹果	-9.0	247	0	0	14	0	2	0
苹果	-9.5	218	0	0	13	0	2	0
香蕉	-10.6	371	1	0	22	5	2	0
菠萝蜜	-11.3	397	1	0	23	1	1	0
李子	-20.1	192	0	0	11	0	1	0
甜瓜	-42.7	150	0	0	9	0	0	0
哈密瓜	-46.4	141	0	0	8	0	0	0
油桃	-50.4	185	1	0	10	0	1	0
桃	-54.7	165	0	0	9	0	1	0
杏	-57.3	201	1	0	11	0	2	0
橘子	-57.7	197	0	0	11	0	2	0
菠萝	-59.0	209	0	0	13	0	1	0
苹果汁	-73.0	191	0	0	11	0	0	0
芒果	-79.1	250	0	0	14	0	1	0
枣	-83.4	1176	4	0	72	0	6	0
葡萄干	-89.3	264	1	0	15	0	0	0

干果推荐

i 干果类饮食是指以坚果和干果为主要组成部分的饮食习惯。干果包括核桃、杏仁、腰果、榛子、桂圆、葡萄干等，经常被视为健康零食，富含营养成分。

食物名称	推荐指数	能量(KJ)	蛋白(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	淀粉(g)	膳食纤维(g)	胆固醇(mg)
莲子	78.6	372	4	0	17	0	0	0
栗子	58.8	1519	6	1	79	0	0	0
榛子	33.6	2629	14	60	16	0	9	0
橡子	9.6	1619	6	23	40	0	0	0
芝麻酱	9.4	2454	18	50	24	0	5	0
葵花子	2.5	2445	20	51	20	0	8	0
银杏坚果	1.4	1456	10	2	72	0	0	0
椰肉	0	1481	3	33	15	0	9	0
杏仁	-2.6	2423	21	49	21	0	12	0
山核桃干	-9.9	2749	12	64	18	0	6	0
腰果	-10.8	2402	15	46	32	0	3	0
核桃	-30.5	2738	15	65	13	0	6	0
开心果	-32.0	2392	21	45	28	1	10	0
山核桃	-35.7	2889	9	71	13	0	9	0
松子	-59.6	2816	13	68	13	1	3	0

参考文献

 下列是本宏基因组报告作参考的文献资料。

Exposure to concentrated ambient PM2.5 alters the composition of gut microbiota in a murine model

 Wang, W. et al. •  Part Fibre Toxicol 15, 17 •  2018

Gut Dysbiosis in Animals Due to Environmental Chemical Exposures

 Rosenfeld, C. S. •  Front Cell Infect Microbiol 7, 396 •  2017

Gut Microbiota Richness and Composition and Dietary Intake of Overweight Pregnant Women Are Related to Serum Zonulin Concentration, a Marker for Intestinal Permeability

 Mokkala, K. et al. •  J Nutr 146, 1694-1700 •  2016

Gut microbiota, dietary intakes and intestinal permeability reflected by serum zonulin in women

 Mörk, S. et al. •  Eur J Nutr 57, 2985-2997 •  2018

The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression

 Valles-Colomer, M. et al. •  Nature Microbiology 4, 623 •  2019

Impact of the Gut Microbiota on Intestinal Immunity Mediated by Tryptophan Metabolism

 Gao, J. et al. •  Front Cell Infect Microbiol 8 •  2018

Linking the gut microbiome to metabolism through endocrine hormones

 Brubaker, P. L. •  Endocrinology •  2018

Microbial endocrinology: host-bacteria communication within the gut microbiome

 Sandrini, S., Aldriwesh, M., Alruways, M. & Freestone, P. •  Journal of Endocrinology 225, R21-R34 •  2015

A High Salt Diet Modulates the Gut Microbiota and Short Chain Fatty Acids Production in a Salt-Sensitive Hypertension Rat Model

 Bier, A. et al. •  Nutrients 10 •  2018

Altered gut microbiome composition in children with refractory epilepsy after ketogenic diet

 Zhang, Y. et al. •  Epilepsy Res. 145, 163-168 •  2018

Association analysis of dietary habits with gut microbiota of a native Chinese community

 Qian, L. et al. •  Exp Ther Med 16, 856-866 •  2018

Effect of changes in food groups intake on magnesium, zinc, copper, and selenium serum levels during 2 years of dietary intervention

 Paz-Tal, O. et al. •  J Am Coll Nutr 34, 1-14 •  2015

Intersection of salt- and immune-mediated mechanisms of hypertension in the gut microbiome

 Wyatt, C. M. & Crowley, S. D. •  Kidney Int. 93, 532-534 •  2018

Salt-responsive gut commensal modulates TH17 axis and disease

 Wilck, N. et al. •  Nature 551, 585-589 •  2017

The Virtual Metabolic Human database: integrating human and gut microbiome metabolism with nutrition and disease

 Noronha, A. et al. •  bioRxiv 321331 •  2018

Fecal concentrations of bacterially derived vitamin K forms are associated with gut microbiota composition but not plasma or fecal cytokine concentrations in healthy adults

 Karl, J. P. et al. •  Am. J. Clin. Nutr. 106, 1052-1061 •  2017

A novel ultra high-throughput 16S rRNA gene amplicon sequencing library preparation method for the Illumina HiSeq platform

 de Muinck, E. J., Trosvik, P., Gilfillan, G. D., Hov, J. R. & Sundaram, A. Y. M. •  Microbiome 5, 68 •  2017

Role of Neurochemicals in the Interaction between the Microbiota and the Immune and the Nervous System of the Host Organism

 Oleskin, A. V., Shenderov, B. A. & Rogovsky, V. S. •  Probiotics Antimicrob Proteins 9, 215-234 •  2017

Linking the Gut Microbiota to a Brain Neurotransmitter

 Jameson, K. G. & Hsiao, E. Y. •  Trends Neurosci. 41, 413-414 •  2018