Exercice 2:

Q1: T = [5, 8, 5, 8, 6]
0 1 2 3 4 5

max1 = 5 ; max2 = 5 max1 = 8 max1 = 8
max2 = 5 max1 = 8 max2 = 5 max2 = 8

Donc le 2ème grand nombre est 8
C'est faux

Q2: T = [10, 10, 10]

max1 = 10 max1 = 10 max1 = 10
max2 = 10 max2 = 10 max2 = 10

2ème Grand nombre c'est 10 ; ce qui est faux

Le bug : max1 est supposé d'être ≠ max2

On peut le fixer au niveau de la condition:
T[i] > max2 ET T[i] ≠ max1

Q3: Le max1 = 3 max2 = 3 ✓
max2 = 3 max1 = 7

Le deuxième bug lié au initialisation de max1 et max2

```
Si T[1] > T[2] Alors
        max1 ← T[1]
        max2 ← T[2]
    Sinon
        max1 ← T[2]
        max2 ← T[1]
    FinSi
```

et on va commencer la boucle depuis 3

Partie B

```
Variable
somme, max, count, input   : entier
moy                        : réel
T                          : tableau d'entier
Début
somme ← 0, max ← 1
Tant que input ≠ 0 faire
    somme ← somme + input
    count ← count + 1
    Si max < input Alors   max ← input
    FinSi
FinTant que

Écrire("Valeur saisie", count)
Écrire("Somme : ", somme, " Moy : ", somme/count)
Écrire("max : ", max)
```

Q5) J'ai utilisé Tant que vu que la boucle est lié à une condition