

Probabilidad de colapso de la diversidad biológica en algunos de los socioecosistemas colombianos

Análisis de la relación actual entre amenazas y vulnerabilidades para Unidades de Análisis Territorial

Marcela Portocarrero-Aya*, Olga Lucía Hernández-Manrique* y Germán Corzo*

SE REALIZÓ UNA EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE COLAPSO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE ALGUNOS DE LOS SOCIOECOSISTEMAS EN APROXIMADAMENTE EL 60% DEL TERRITORIO CONTINENTAL DEL PAÍS. DICHO VALOR DE COLAPSO CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS VALORES DE LAS PROBABILIDADES DE COLAPSO TERRESTRE Y ACUÁTICO OBTENIDOS DE LA INTERACCIÓN DE AMENAZAS (MOTORES DE PÉRDIDA) Y VULNERABILIDADES (CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS) PROPRIAS DE CADA UNA DE LAS 268 UNIDADES DE ANÁLISIS TERRITORIAL - UAT Y 252 SUBZONAS HIDROGRÁFICAS - SZH ESTUDIADAS.

Institución: * Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Citar como: Portocarrero-Aya, M., Hernández-Manrique, O.L. y Corzo, G. Probabilidad de colapso de la diversidad biológica en algunos de los socioecosistemas colombianos. En: Bello et al. (ed). Biodiversidad 2014. Estado y tendencias de la biodiversidad continental en Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia. 2014.




Ficha en línea



Literatura citada


www.reporte.humboldt.org.co/biodiversidad2014/ficha/212

www.reporte.humboldt.org.co/biodiversidad2014/literatura/212




Mapa 1. Probabilidad de colapso de la diversidad biológica total de los ecosistemas evaluados.

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Área fuera de estudio



Mapa 2. Probabilidad de colapso de la diversidad biológica terrestre de los ecosistemas evaluados.

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Área fuera de estudio




Mapa 3. Probabilidad de colapso de la diversidad biológica acuática de los ecosistemas evaluados.


Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Área fuera de estudio



Gráfico 1. Valores porcentuales promedio de colapso de la diversidad biológica, según Evaluación Total, Terrestre y Acuática para las regiones del área de estudio.



Evaluación de colapso de biodiversidad
TERRESTRE



Evaluación de colapso de biodiversidad
ACUÁTICA

Evaluación de colapso de la diversidad natural. En el marco del Proyecto Planeación Ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas operativas de Ecopetrol, convenio N° 5211478 (IAVH 12-067) IAVH - Ecopetrol, que tiene como objetivo central identificar áreas prioritarias de conservación para la biodiversidad, se generó un proceso de evaluación de la probabilidad de colapso de la diversidad biológica de objetos de conservación de grano grueso (UAT). El área evaluada corresponde a 70 millones de hectáreas y comprende las regiones Orinoquía, Andina, Pacífico y Caribe, y el piedemonte amazónico.

Para los cálculos se tuvo en cuenta que la interacción entre amenazas y vulnerabilidades no es siempre la misma, ya que depende del tipo y origen de la amenaza, al igual que de las características intrínsecas de cada UAT y SZH, para reaccionar ante la amenaza. Por esta razón se desarrollaron varios algoritmos basados en las relaciones encontradas entre las variables.

Este cálculo permitió la identificación de Metas de Conservación y posteriormente la identificación de áreas prioritarias y complementarias de conservación. Así mismo, esta evaluación supone diversas estrategias de conservación, tales como la preservación, restauración, uso sostenible y la generación de conocimiento. El grado de implementación de cada una es reflejo de la composición, nivel de naturalidad y figura legal del territorio en cada UAT.

En cuanto a los resultados obtenidos, se puede ver claramente cómo la región Andina, seguida por la Caribe presentan los valores promedio más altos de probabilidad de colapso de la diversidad biológica. Ambas regiones se han visto sometidas a procesos de transformación por efecto de las actividades humanas desde hace varios siglos. En estas regiones, las características intrínsecas de las UAT, tales como forma, unicidad y pendiente, las hacen más vulnerables a las transformaciones.

Las regiones del Pacífico y piedemonte amazónico, muestran en la actualidad mejores valores promedio, lo que hace pensar que sin un manejo y gestión eficaces, a futuro se podrían enfrentar a un mayor riesgo al colapso, cuando su naturalidad y componentes asociados no puedan responder a las amenazas crecientes de transformación del territorio que están impactando a estas regiones. La región de la Orinoquía muestra valores intermedios, con tendencia a valores altos en especial en el análisis terrestre y en la zona del pie-

demonte llanero.