
a

native chain | TACo-Aptamer refold | interface residues (<5 Å) | ligand


per-cell metrics: recovery and scTM as TACo-Aptamer/RhoDesign

3GAO_A · xanthine




rec 0.70/0.61 · scTM 0.54/0.12

6UC7_B · N2-acetylguanine




rec 0.72/0.64 · scTM 0.71/0.31

7Q80_E · guanine




rec 0.88/0.67 · scTM 0.24/0.23

3FU2_C · preQ1




rec 0.78/0.66 · scTM 0.27/0.15

8D5L_A · TAL1




rec 0.94/0.79 · scTM 0.44/0.27

6UET_A · SAM




rec 0.69/0.65 · scTM 0.10/0.10

5BTP_B · ZMP




rec 0.76/0.69 · scTM 0.19/0.09

8HB1_A · NMN




rec 0.78/0.70 · scTM 0.14/0.12

4K31_B · apramycin




rec 1.00/0.95 · scTM 0.22/0.21

4FE5_B · hypoxanthine




rec 0.70/0.63 · scTM 0.58/0.40

6PRV_D · GTP



rec 0.72/0.74 · scTM 0.40/0.10

6E8S_B · TO1-biotin



rec 0.68/0.74 · scTM 0.28/0.33