
EGARPS+ native probability
ρ
Thrombin (n = 6)
VEGF (n = 8)
PDGF-BB (n = 5)
IL-17A (n = 6)
Angiopoietin-2 (n = 3)
SARS-CoV-2 N (n = 6)
FGF2 (n = 10)
swine H3 HA (n = 4)
IFN-γ (n = 6)
+0.31
+0.14
+0.10
+0.03
−0.50
+0.09
+0.47
−0.80
+0.71
ProteinX ipTM
Thrombin (n = 6)
VEGF (n = 8)
PDGF-BB (n = 5)
IL-17A (n = 6)
Angiopoietin-2 (n = 3)
SARS-CoV-2 N (n = 6)
FGF2 (n = 10)
swine H3 HA (n = 4)
IFN-γ (n = 6)
+0.31
+0.24
−0.41
+0.26
+1.00
−0.43
+0.43
+0.40
+0.66
RhoFold mean pLDDT
Thrombin (n = 6)
VEGF (n = 8)
PDGF-BB (n = 5)
IL-17A (n = 6)
Angiopoietin-2 (n = 3)
SARS-CoV-2 N (n = 6)
FGF2 (n = 10)
swine H3 HA (n = 4)
IFN-γ (n = 6)
−0.20
+0.17
+0.56
−0.03
+0.50
+0.09
−0.18
−0.80
+0.60
−1
−0.5
0
0.5
1
Spearman ρ (predictor score vs −log10 Kd)
reaches ρ ≥ 0.6