



Fiche simplifiée tirée du Référentiel Technico Economique des productions porcines

Auteur : DGPA/MRAH



Juin 2021

FICHE SIGNALETIQUE DU PADEL-B

Titre du projet	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)
Numéro d'identification IDA	P159476
Numéro du Crédit	Numéro 6115-BF du 25 juillet 2017
CREATION	Arrêté conjoint n°2017-97/MRAH/MINEFID du 23/10/2017
CATEGORIE	B
SIEGE	OUAGADOUGOU
Coût total du projet	78,9 millions US \$ (45,760 milliards de FCFA)
SOURCES DE FINANCEMENT	IDA 60 millions US \$ (54,9 millions euros)
	Etat Burkinabè (contrepartie) 3 millions US \$
	Bénéficiaires (apport personnel) 7 millions US \$
	Institutions financières partenaires (prêts aux bénéficiaires) 8,9 millions US \$
DUREE DU PROJET	2017 à 2022
TUTELLE TECHNIQUE	Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
TUTELLE FINANCIERE	Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE	Couverture nationale
GROUPE CIBLES	Acteurs des filières animales : bétail-viande, lait, volaille (chair et œufs), porc, miel, pisciculture
DATE APPROBATION DU FINANCEMENT PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION IDA	20 juillet 2017
DATE SIGNATURE ACCORD DE CREDIT	25 juillet 2017
DATE DE MISE EN VIGUEUR	25 octobre 2017

Moyens de transport	– les camions – les remorques – les fourgons – les tricycles – les cyclomoteurs – les vélos – les charrettes	– Prévoir des rotoluves à l'entrée de la ferme – Interdire l'accès de la porcherie aux moyens de transport extérieur – Soumettre les moyens de transport à une désinfection complète à l'entrée de la ferme
Matériel	– matériels d'intervention – équipements de la ferme	– Désinfecter permanemment le matériel et les équipements avant et après usage – laver régulièrement les mangeoires et abreuvoirs
aliments et eau	– Résidus et restes de cuisine – aliment d'origine animale – eau souillée	– Utiliser l'eau propre non souillée – Renouveler régulièrement l'eau – éviter autant que possible les aliments souillés, les résidus et les restes des cuisines
déjection et litière issues d'animaux contaminés	par contact direct	– Faire le compostage – Isoler la fosse de la porcherie
oiseaux, chauve-souris, rongeurs, tiques et mouches	par contact direct et indirect	– Nettoyer régulièrement la porcherie et alentours – Détruire les refuges des rongeurs, comme les ordures, les décharges, les buissons ou les broussailles – Entreposer les aliments à l'abri des rongeurs et des oiseaux.
animaux errants	par contact indirect	Clôturer l'exploitation

Conclusion

L'application des mesures de biosécurité et le respect du protocole sanitaire permettent de préserver les élevages des pathologies porcines limitant les pertes économiques à l'éleveur.

3. Protocole sanitaire

Le protocole sanitaire à appliquer en fonction des différents stades physiologiques est résumé dans le tableau suivant :

Truies	A 3 mois de gestation • vermifuger contre les vers intestinaux ; • administrer des vitamines A, D et E. Après sevrage • vermifuger contre les vers intestinaux tous les 6 mois ; • vacciner contre la pasteurellose.
Porcelets	A la naissance • couper et désinfecter le cordon ombilical. Au 3^e jour • injecter du fer (renouveler à l'âge de 3 semaines). Du 15^e au 28^e jour • castrer les mâles destinés à l'engraissement.
Porcs à l'engrais	A 15 jours après sevrage • vermifuger contre les vers intestinaux. A 4 mois d'âge • vermifuger contre les parasites internes ; • vermifuger systématiquement les porcs en quarantaine entrant dans l'élevage ; • vacciner (2 fois/an) contre la Pasteurellose.
Verrat	Tous les 6 mois • vermifuger contre les parasites internes et vacciner contre la pasteurellose.

4. Principales mesures de biosécurité

La biosécurité est l'ensemble de mesures servant à éviter l'entrée d'agents pathogènes dans un élevage, à prévenir leur diffusion au sein d'un troupeau et dans d'autres exploitations et à prévenir l'infection de l'homme ainsi que leur persistance dans l'environnement. Les principales sources, voies de contamination et mesures de biosécurité sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Sources	Voies de contamination	Mesures préventives
de porc à porc	- A la ferme - lors de la divagation - déplacement de géniteurs d'une ferme à l'autre - transport d'animaux d'origines diverses	- Construire une porcherie selon les normes et clôturer les installations - Construire un local de quarantaine afin d'isoler les nouveaux arrivant et les animaux malades - Proscrire les déplacements d'animaux entre les exploitations - Enfouir ou incinérer les cadavres - Respecter la prophylaxie médicale générale adaptée au contexte sanitaire
Homme	- le personnel de la ferme - les visiteurs - les acheteurs	- Disposer d'un vestiaire avec les tenues de rechanges adaptées - Contrôler les entrées - Prévoir des pédiluves

Fiche simplifiée : Infrastructures et équipements d'une ferme de production porcine



Introduction

Le porc occupe une place importante dans l'environnement socio-économique du Burkina Faso. En effet, il joue un rôle important pour certaines communautés aussi bien dans la production de viande que la constitution de revenus et de l'épargne. Pour réussir son élevage, un habitat approprié doit être réalisé.

1. Objectifs

1.1. Objectif global

L'objectif général de l'élaboration de cette fiche simplifiée est de diffuser les normes de construction d'une porcherie.

1.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique il s'agit de :

- maîtriser les normes de construction d'une porcherie ;
- connaître les infrastructures annexes d'une porcherie ;
- connaître les types d'équipements nécessaires pour un élevage porcin.

2. Porcherie

2.1. Normes de construction de la porcherie

La construction de la porcherie dépend des objectifs de production et de la capacité financière du promoteur.

- **Choix du site** : la porcherie doit être à l'écart des habitations, accessible en toute saison et située sur un site où les eaux de pluies se drainent facilement.
- **Caractéristiques de la porcherie** : La porcherie doit comporter plusieurs compartiments (loges ou box) construits selon les dimensions suivantes :
 - o box du verrat : 10 m² ;
 - o box de maternité (une truie avec ses porcelets) : 12 m² ;
 - o box des porcs en croissance: 15 m²/10 ou 1,5 m² /animal ;
 - o box à engraissement : 30 m²/10 ou 3m²/animal.
- **Les portes d'entrée dans la porcherie ou dans les loges** : en fer ou en bois, doivent être suffisamment larges pour permettre au moins le passage d'une brouette (au moins 90 cm) ;
- **le sol** de la porcherie doit être cimenté mais pas lisse avec une pente légère de 1 à 2% au moins pour faciliter l'évacuation rapide des déjections et de l'eau de lavage vers les fosses à purin ;
- **l'orientation** de la porcherie doit être d'Est-Ouest afin de préserver les porcs des rayons du soleil et des vents violents ;
- **les murs** de la porcherie doivent être à mi-hauteur (1, 20m à 1,40m) afin de faciliter une meilleure aération et une meilleure luminosité ;

2. Quelques pathologies porcines les plus rencontrées au Burkina Faso

Quelques pathologies porcines les plus rencontrées au Burkina Faso sont :

Maladie	Signes cliniques	Traitement	Prophylaxie
Maladies parasitaires			
Gale	Prurit, démangeaisons	Antiparasitaire externe	Hygiène générale
Cysticercose	Présence de larves sur la langue et dans les muscles	Néant	Déparasitage systématique, éviter divagation des animaux
Maladies infectieuses			
Peste porcine africaine (PPA)	Fièvre, rougeur sur la peau, dyspnée, diarrhée, forte mortalité	Néant	Mesures de biosécurité, Hygiène générale, éviter divagation des animaux
Fièvre aphteuse	Fièvre, vésicules sur langue, plaies espaces interdigités	Néant pour FA Antibiothérapie et pansements locaux pour éviter surinfections	Eviter divagation des animaux
Maladies nutritionnelles			
Anémie du porcelet ou crise des 3 semaines	Amaigrissement, troubles digestifs et respiratoires, mort	Administration de fer ou de latérite rouge	Administration de fer dès la 1 ^{ère} semaine de naissance



Gale



Mortalités dues à la Peste Porcine Africaine



Cysticercose

Introduction

Les pathologies porcines entraînent d'importantes pertes économiques à travers le retard de croissance, le taux élevé de mortalité notamment chez les jeunes et les saisies totales des carcasses à l'abattoir. L'application des mesures de biosécurité et une bonne conduite sanitaire dans les élevages permettent de réduire les risques d'introduction et de propagation des pathologies dans les élevages porcins et protéger la santé des consommateurs.

1. Objectifs

1.1. Objectif global

L'objectif général de l'élaboration de cette fiche simplifiée est de diffuser les mesures de biosécurité et de conduite sanitaires dans les élevages porcins.

1.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique il s'agit de :

- maîtriser les mesures de biosécurité dans les élevages porcins ;
- maîtriser la conduite sanitaire dans les élevages porcins ;
- connaître quelques pathologies porcines les plus rencontrées au Burkina Faso.

- **Le toit** doit être suffisamment haut (3 m minimum) et comporter une pente afin de maintenir des températures raisonnables.

2.2. Les infrastructures annexes de la porcherie

L'exploitation de la porcherie ci-dessus décrite nécessite la réalisation des infrastructures annexes telles que :

- box de quarantaine : 10 m² situé à au moins 50 mètres de la porcherie;
- pédiluve ;
- fosse à purin ;
- fosse fumière ;
- puits ou forage ou adduction d'eau ;
- magasin ;
- logements des employés équipés de sanitaire.



Pédiluve



Canalisation + fosse à purin



Fosse fumière

3. Quelques équipements de la ferme

Les box doivent être équipés de mangeoires et d'abreuvoirs qui peuvent être fixes (construits en béton ou banco amélioré) ou déplaçables (bassines, demi barrique,...) ; réalisés en fonction de l'âge (0,25 à 0,30m de longueur par animal) et du nombre d'animaux par box




Mangeoires pour porcs

Les autres équipements sont entre autres :

- **Les seaux et bassines** : pour le nettoyage, le mélange, le transport de l'aliment et pour le transport de l'eau ;
- **Le dispositif de chauffage des porcelets** : permet de réchauffer les porcelets non sevrés qui sont très sensibles au froid et aux changements brusques de température ;
- **les balais, les brosses et les râpeaux** : pour le nettoyage ;
- **La brouette et la pelle** : ramassage des déchets et transport des sacs d'aliment et d'autres outils à l'intérieur de la ferme ;

- Unité - Progrès – Justice

PROGRAMME 082



Auteur : DGPA/MRAH



Les vitamines et les autres minéraux (Prémix, CMV, Sulfate de fer, Phosphate bicalcique, Sel de cuisine, coquillage, etc) sont dans le commerce.

Tableau 1 : Exemples de formulation de rations alimentaires

Matières premières (Kg)	Porcelets (7-25kg)	Porc en croissance (25-60kg)	Porc en finition (+ 60kg)	Truies gestantes	Truies allaitantes
Son de maïs	35	35	35	40	40
Drèche de brasserie	25	25	35	15	15
Drèche de dolo	20	20	20	35	30
Tourteau de coton	10	10	5	0	5
Farine de poisson	10	5	5	5	10
Coquillages	1	1	1	2	0,2
Sel	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Abreuvement

L'eau doit être disponible à volonté. La propreté de l'eau et des abreuvoirs est fondamentale, pour ce faire, l'eau doit être renouvelée régulièrement.

Conclusion

L'alimentation et l'abreuvement du porc sont des facteurs que l'éleveur doit impérativement maîtriser. Pour une meilleure rentabilité de la production, l'éleveur doit maîtriser les différentes techniques de fabrication d'aliment avec les ingrédients locaux disponibles ce qui réduirait le coût de l'alimentation.

Conclusion

Pour réussir son élevage de porcin, l'éleveur doit mettre ses animaux dans de bonnes conditions afin de leur permettre d'être à l'abri des intempéries et des maladies, de se reproduire et de s'alimenter convenablement. Pour se faire, la construction d'une porcherie respectant les normes énoncées sur cette fiche est nécessaire.

Fiche simplifiée : Reproduction des porcs

Auteur : DGPA/MRAH



Introduction

Le porc est un animal qui possède divers avantages de production (omnivore, prolifique, qualité de la viande, cycle court, rustique, rendement élevé, efficacité alimentaire, ...). L'expression de ces potentiels est conditionnée par la maîtrise des techniques appropriées de conduite des opérations de production, notamment l'alimentation.

1. Objectifs

1.1. Objectif global

L'objectif global de l'élaboration de cette fiche simplifiée est de diffuser les normes d'alimentation et d'abreuvement dans l'élevage de porc.

1.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique il s'agit de :

- connaître les besoins alimentaires des porcs ;
- connaître les bases de la formulation d'une ration de qualité et à moindre coût.

2. Besoins alimentaires des porcs

L'alimentation des porcs doit tenir compte de leurs besoins quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, en fonction du stade physiologique, la consommation alimentaire des méris se résume comme suit:

- la truie gestante consomme entre 2,5 à 3,5 kg d'aliments par jour ;
- la truie allaitante de 10 porcelets consomme entre 4,5 à 5 kg d'aliments par jour ;
- la truie vide consomme 2 à 2,7 kg d'aliments par jour ;
- le verrat consomme 2 à 2,7 kg d'aliments par jour ;
- le porcelet consomme 0,5 kg d'aliments par jour ;
- le porc en croissance consomme 1 à 2,5 kg d'aliments par jour ;
- le porc à l'engraissement consomme 2,5 à 3kg d'aliments par jour.

Cette quantité est divisée en deux et distribué matin et soir. Si l'aliment est farineux, le mouiller légèrement avant de le distribuer pour éviter l'inhalation de la poussière.

Les besoins qualitatifs sont ceux en:

- Energie ;
- Protéines ;
- Vitamines et minéraux ;
- L'eau.

Ces éléments peuvent être fournis par :



Quelques sources d'énergie



Quelques sources protéine



Productions porcine

Fiche simplifiée : Alimentation des porcs

Auteur : DGPA/MRAH



Introduction

Le porc est un animal qui possède divers avantages de production (omnivore, prolifique, qualité de la viande, cycle court, rustique, rendement élevé, efficacité alimentaire, ...). L'expression de ces potentiels est conditionnée par la maîtrise de la conduite d'élevage, notamment la reproduction.

1. Objectifs

1.1. Objectif global

L'objectif général de l'élaboration de cette fiche simplifiée est de permettre aux producteurs de maîtriser la reproduction des porcs.


1.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique il s'agit de :

- maîtriser le choix des reproducteurs ;
- maîtriser la détection des chaleurs et la saillie ;
- maîtriser le suivi de la mise bas et les soins à administrer aux porcelets.

2. Choix des reproducteurs


- **le verrat** : doit avoir une bonne hauteur au garrot, une bonne longueur du tronc, un caractère docile, des testicules bien développés et bien dégagés et les aplombs réguliers. La verge en érection doit sortir librement du fourreau. Il est important de tenir compte des performances des parents. L'âge minimum de la mise à la reproduction du verrat est de huit (08) mois. Cependant, il est recommandé une mise à la reproduction de 09 mois à une année. Il est conseillé de reformer le verrat au bout de 2 à 3 ans.



Verrat

- **la truie** doit avoir un caractère docile, une bonne conformation et au moins six paires de télines. Ses parents doivent être capables de produire de bonnes et grandes portées à intervalles réguliers. L'âge de la mise à la reproduction est de 6 à 8 mois et son poids doit atteindre au moins 60% du poids adulte des femelles de sa race. Ne mettre la femelle à la reproduction qu'à partir de la troisième chaleur pour lui permettre d'atteindre sa maturité sexuelle. Il est conseillé de reformer la truie après 7 mis bas ou quand le nombre de porcelets par portée diminue.

Fiche simplifiée tirée du Référentiel Technico Economique des productions porcines



Truie

3. Détection des chaleurs chez la truie


Le cycle de la truie est de 21 plus ou moins 2 jours. La durée des chaleurs est de 2 à 3 jours. Elles se détectent par l'observation des signes suivants :

- une vulve tuméfiée, rougeâtre avec un écoulement de glaire ;
- une truie agitée et qui grogne ;
- les oreilles dressées et rapprochées en présence du verrat ;
- un chevauchement des congénères ou une acceptation de chevauchement
- une immobilité en présence du verrat ou à la pression exercée sur la croupe par l'homme.

4. Saillie

Elle peut être naturelle ou artificielle (insémination). Pour la monte naturelle prévoir un verrat pour 25 truies.

Le contrôle des retours des chaleurs doit se faire une première fois autour du 21e jour après la saillie et une seconde fois vers le 42e jour. La présence de chaleurs indique un échec de la fécondation.



Monte naturelle



Insémination

NB : éviter de saillir des porcs d'une même famille car cela entraîne l'apparition des malformations, une baisse des performances et des mortalités.

5. Gestation

La durée moyenne de la gestation est de 114 jours (3 mois, 3 semaines, 3 jours). Cependant, certaines primipares mettent bas dès le 111e jour.

Fiche simplifiée tirée du Référentiel Technico Economique des productions porcines

6. Mise bas

La truie devra être lavée et déparasitée (interne et externe) et conduite dans le box de mise bas qui avait préalablement été soumis à un vide sanitaire, une à deux semaines avant la date probable de mise bas.

Les signes annonciateurs d'une mise-bas proche sont :

- le grossissement des mamelles ;
- la dilatation de la vulve ;
- les écoulements vaginaux ;
- la perte d'appétit ;
- les contractions abdominales.

Assister la truie au moment de la mise bas.

7. Soins aux porcelets

A la naissance, les porcelets en difficulté doivent recevoir des soins adaptés. Pendant les périodes de basses températures, il faudra bien protéger la maternité contre le froid en utilisant une source de chaleur comme un fourneau à charbon ou des lampes à incandescences. Le fer doit être administré pour prévenir l'anémie du porcelet au troisième (3ème) jour et une seconde fois vers le 15ème jour.

Le sevrage intervient à l'âge de 1 à 2 mois ; il est fonction de la qualité de l'aliment servi aux porcelets.

Conclusion

Pour réussir son élevage, l'éleveur doit disposer de géniteurs performants, assurer une bonne alimentation et un bon suivi sanitaire.

Fiche simplifiée tirée du Référentiel Technico Economique des productions porcines