- id nombre
 - 1 Paquetes o sobres de sales de rehidratación oral o sobres de vida
 - 2 Gotas de sulfato ferroso o micronutrientes para niños
 - 3 Albendazol o Mebendazol
 - 4 Eritromicina o Ampicilina o Penicilina Benzatínica
 - 5 Báscula pediátrica o báscula de piso tipo Salter (Báscula de calzón)
 - 6 Báscula de pie para niños o báscula tipo Salter (Báscula de calzón) o báscula con estadímetro o báscula de piso
 - 7 Estadímetro o báscula con estadímetro
 - 8 Estetoscopio (PROPIEDAD DE LA UNIDAD)
 - 9 Termometro oral o axilar
 - 10 Cartilla Nacional de Salud para niños de 0 a 9 años, o Cartilla Nacional de Vacunación o Tarjeta de Crecimiento y desarro
 - 11 Pentavalente o DPT+ Hib+ Hepb
 - 12 Rotavirus
 - 13 Neomocócica conjugado
 - 14BCG
 - 15 Vacuna SPR
 - 16 Multivitamínico o Hierro + Ácido fólico

Vacuna antitetánica o toxoide tetánico diftérico (SOLAMENTE UNIDADES QUE TIENEN REFRIGERADORA FUNC 17 DIAS)

- 18 Paletas (Espátulas) de Ayre (para examen de citología cervical) o hisopos
- 19 Láminas porta objetos
- 20 Nitrofurantoina tabletas o suspensión
- 21 Eritromicina, Amoxicilina o Penicilina Benzatinica
- 22 Báscula o balanza de pie (Báscula de piso)
- 23 Carnet perinatal o tarjeta
- 24 Estadímetro
- 25 Mesa para exploración ginecológica (APLICA SOLO EN CARAVANAS TIPO 1.2. Y 3)
- 26 Cinta obstétrica del CLAP o cinta métrica
- 27 Lámpara de cuello de cisne (lámpara de chicote) o lámpara de mano
- 28 Esfigmomanómetro (Baumanómetro)
- 29 Set para inserción de DIU(espéculo vaginal, pinza de pozzio o tentáculo, pinza Forester o de anillos)
- 30 Historia clínica materno perinatal
- 31 Condón masculino
- 32 Cualquier tipo de hormonal oral
- 33 Cualquier tipo de hormonal inyectable
- 34 Mesa para exploración ginecológica
- 35 Carnet perinatal o tarjeta
- 36 Penicilina cristalina o ampicilina o Amoxicilina
- 37 Lactato de Ringer o Solución Hartman o Solución salina
- 38 Estetoscopio pediátrico (PROPIEDAD DE LA UNIDAD)
- 39 Esfigmiomanómetro pediátrico (Baumanómetro)
- 40 Negatoscopio
- 41 Cefalexina
- 42 Kit para pruebas rápidas de sífilis o Microscopio de campos oscuros, o Equipo para inmunoensayos de enzimas
- 43 Kit para pruebas rápidas de VIH/SIDA o Microscopio Fluorescente
- 44 Tiras reactivas para proteina en orina o Equipo para uroanálisis

- 45 Tiras reactivas para glucosa en sangre o Glucómentro
- 46 Hemocue o Contador automático de células
- 47 Microcubetas
- 48 Kit para pruebas de embarazo
- 49 Reactivo para sífilis
- 50 Reactivo para VIH/SIDA
- 51 Anticuerpo de tipo de sangre
- 52 Anticuerpo de factor RH
- 53 Set para inserción de DIU (espéculo vaginal, pinza de pozzio o tentáculo, pinza Forester o de anillos)
- 54 Aparato para medición de presión arterial
- 55 Doppler Portátil o estetoscopio Pinard
- 56 Autoclave o esterilizador de calor seco
- 57 Tanque de oxígeno
- 58 Bolsa de reanimación resucitación para adulto
- 59 Bolsa de resucitación neonatal ó Bolsa valvula mascarilla ó AMBÚ, ó resusitador, o reanimador neonatal
- 60 Laringoscopio
- 61 Equipo para AMEU
- 62 Maleato de ergonovina o Ergometrina o Oxitocina
- 63 Dexametazona o Betametasona
- 64 Gentamicina ampoyetas
- 65 Sulfato de magnésio
- 66 Hidralazina ampoyetas
- 67 Equipo para suero con macrogotero y microgotero
- 68 Campos estériles o cobija para el recién nacido
- 69 Sonda nasogástrica
- 70 Cateter intravenoso estéril No. 18
- 71 Pinza metálica o cinta umbilical o pinza plástica
- 72 Ergonovina maleato o Ergometrina o Oxitocina
- 73 Iodopovidona o Isodine
- 74 Jeringa con Aguja Montada (Jeringa insulina)
- 75 Lidocaína sin Epinefrina (Lidocaina Simple)
- 76 Bromuro de hidroscina o Butilioscina
- 77 Ringer Lactato o Hartman o solución salina
- 78 Gotas de cloramfenicol oftálmicas o de nitrato de plata al 1% o oxitetraciclina oftálmica
- 79 Vitamina K (FITOMENADIONA)
- 80 Dispositivo intrauterino
- 81 Penicilina cristalina o Ampicilina o Amoxicillina
- 82 Nitrofurantoina
- 83 Microscopio óptico
- 84 Equipo para uroanálisis
- 85 Glucómetro
- 86 Contador automático de células
- 87 Equipo para anestesia (De bloqueo)
- 88 Kit para cesáreas
- 89 Furosemida
- 90 Diazepam o Midazolam Clorhidrato

- 91 Sevofluran 100% Fco
- 92 Sulfato de Amikacina
- 93 Ceftriaxona
- 94 Cloranfenicol o Metronidazol
- 95 Hidralazina o Hidralazina clorhidrato
- 96 Nifedipina
- 97 Ergonovina maleato o Ergometrina o Oxytocina
- 98 Gotas de cloramfenicol oftálmica o nitrato de plata al 1% o Oxitetraciclina oftálmica
- 99 ¿Este establecimiento cuenta con doctor capacitado para realizar esterilización femenina / ligadura de trompas?
- 100 ¿Este establecimiento cuenta con doctor capacitado para realizar esterilización masculina / vasectomía?
- 103 Evidencia de 5 o más CPN en último embarazo
- 104 CPN realizado por Mèdico, enfermera o COCs
- 105 Presión arterial tomada en cada control
- 106 Pulso tomado en cada control
- 107 Temperatura tomada en cada control
- 108 Se documentó la ganancia de peso en cada control
- 109 Altura de fondo uterino registrada en cada control
- 110 Se revisaron reflejos y edemas en todos los controles.
- 111 Medición de frecuencia cardiaca en todos los controles mayores a 20 semanas de gestación
- 112 Determinación de movimientos fetales en todos los controles mayores a 20 semanas de gestación
- 113 Determinación del tipo de sangre en al menos un control
- 114 Determinación de glicemia en al menos un control
- 115 Determinación de hemoglobina en al menos un control
- 116 Determinación del status VIH en al menos un control
- 117 Determinación del nivel de plaquetas en al menos un control
- 118 control Determinación de ácido úrico en al menos un control
- 119 Determinación de VDRL en al menos un control
- 120 Realización de examen general de orina en al menos un control
- 121 Existen 4 registros de control en la primera hora?
- 122 Existen 2 registros de control en la segunda hora?
- 123 Se tomó pulso en cada evaluación
- 124 Se tomó frecuencia respiratoria en cada evaluación?
- 125 Presión arterial en cada evaluación?
- 126 Revisión de involución uterina en cada evaluación?
- 127 Revisión por hemorragia ó loquios en cada evaluación?
- 128 Se tomó temperatura en cada evaluación?
- 129 Se registró la diurésis espontánea durante las primeras 2 horas post-parto?