

Introduction à la Statistique

La distribution binomiale et les variables aléatoires continues

Stéphane Guerrier, Mucyo Karemera, Samuel Orso & Lionel Voirol

Data Analytics Lab



Licence : CC BY NC SA 4.0

n factoriel

n factoriel

$$n! = n (n - 1) (n - 2) \dots (3)(2)(1)$$

$$0! = 1$$

Exemples :

$$4! = (4) (3) (2) (1) = 24$$

$$5! = (5) (4) (3) (2) (1) = (5) 4! = 120$$

$$10! = (10) (9) (8) (7) (6) 5! = 3'628'800$$

Combinaisons

k parmi n

$$C_n^k = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

$n = 6, k = 4$

$$C_6^4 = \frac{6!}{4! (6 - 4)!} = \frac{6(5)(4)(3)(2)1}{(4)(3)(2)(1) \times (2)1} = \frac{720}{48} = 15$$

$n = 20, k = 4$

$$\begin{aligned} C_{20}^4 &= \frac{20!}{4! (20 - 4)!} = \frac{20 (19) (18) (17) \textcolor{red}{16}!}{4(3)(2)1 \times \textcolor{red}{16}!} \\ &= \frac{116\,280}{24} = 4'845 \end{aligned}$$

Exemple : création d'un examen

Nous avons un ensemble de :

15 questions vrai/faux (V/F) et

20 questions à choix multiple.

Question : Nous voulons créer un examen avec 10 questions dont exactement 4 sont V/F. Combien d'examens avec exactement 4 questions V/F peuvent être construits ?

Remarque : Ignorez l'ordre des questions.

Exemple : création d'un examen

Le nombre total de façons de choisir 4 questions V/F est

$$C_{15}^4 = \frac{15!}{4! 11!} = 1'365$$

Le nombre total de façons de choisir 6 questions à choix multiple est

$$C_{20}^6 = \frac{20!}{6! 14!} = 38'760$$

Le nombre total d'examens avec 4 questions V/F et 6 questions à choix multiple est

$$C_{15}^4 \times C_{20}^6 = 1'365 \times 38'760 = 52'907'400$$

Exemple : création d'un examen

Nous avons un ensemble de 15 questions vrai/faux et 20 questions à choix multiple.

Parmi les examens avec 10 questions, quelle est la probabilité de choisir un examen avec 4 questions V/F (et 6 questions à choix multiple) ?


Rappel de la définition classique de la probabilité :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(\text{"Examen avec 4 V/F parmi 10 questions"}) \\ &= \frac{\# \text{ d'examens avec 4 questions V/F parmi 10 questions}}{\# \text{ d'examens avec 10 questions}} \\ &= \frac{C_{15}^4 \times C_{20}^6}{C_{35}^{10}} \\ &= \frac{52'907'400}{183'579'396} = 0.2882 \end{aligned}$$

Exemple : lancer d'une pièce équilibrée

$$\mathbb{P}(\text{"6 Faces en 10 Lancers"}) = C_{10}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$$

de combinaisons



probabilité de chaque combinaison

$$\frac{10!}{6! 4!} \left(\frac{1}{1024}\right) = \frac{10(9)(8)(7)}{4(3)(2)1} \left(\frac{1}{1024}\right) = \frac{210}{1024} = 0.2051$$

Exemple : lancer d'une pièce déséquilibrée

Lancé d'une pièce déséquilibrée 5 fois

$$\mathbb{P}(F) = 0.2 \text{ and } \mathbb{P}(P) = 0.8$$

$$\text{Alors, } \mathbb{P}(FP) = 0.2 (0.8) = 0.16$$

$$\mathbb{P}(FPPFP) = 0.2(0.8)(0.8)(0.2)(0.8) = (0.2)^2(0.8)^3 = 0.02048$$

$$\mathbb{P}(PPFPF) = 0.8(0.8)(0.2)(0.8)(0.2) = (0.2)^2(0.8)^3 = 0.02048$$

$$\mathbb{P}(PPPPF) = 0.8(0.8)(0.8)(0.2)(0.2) = (0.2)^2(0.8)^3 = 0.02048$$

$$\mathbb{P}(\text{“2 Faces”}) = C_5^2(0.2)^2(0.8)^3 = 10(0.02048) = 0.2048$$

Exemple : lancer d'une pièce déséquilibrée

Vous lancez une pièce déséquilibrée 100 fois

$$n = 100$$

Les lancers sont indépendants

“Face” = “Succès”

“Pile” = “Échec”

$$p = \mathbb{P}(\text{“Face”}) = 0.44$$

$$1 - p = \mathbb{P}(\text{“Pile”}) = 0.56$$

$$X = \# \text{ de Faces}$$

Exemple : lancer d'une pièce déséquilibrée

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

- Quelle est la probabilité d'obtenir 40 Faces parmi les 100 lancers ?

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{"40 Faces"}) &= \mathbb{P}(X = 40) \\ &= C_{100}^{40} (0.44)^{40} (0.56)^{60} \\ &= (1.3746 \times 10^{28}) (5.47151 \times 10^{-15}) (7.78541 \times 10^{-16}) \\ &= 0.0586\end{aligned}$$

Distribution binomiale

Expérience binomiale :

n essais

Les essais sont indépendants

Deux issues possibles $\mathbb{P}(\text{“Succès”}) = p$

Probabilité binomiale

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k) &= C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{k! (n - k)!} p^k (1 - p)^{n-k}\end{aligned}$$

Exemple : Le tiroir à chaussettes

Un tiroir contient 6 chaussettes rouges et 4 chaussettes noires. Quelle est la probabilité de sélectionner 2 chaussettes rouges lorsque vous en tirez 5 du tiroir (avec remise) ?

Il y a 5 essais.

Chaque tirage est indépendant des autres, puisque nous choisissons une chaussette à chaque fois avec remise.

Comme nous sommes intéressés à sélectionner des chaussettes *rouges*, nous appelons cela un succès et sélectionner une chaussette *noire* est un échec.

Pour chaque essai, la probabilité de succès est $p = 6/10 = 0,6$, elle est constante.

Ceci est une expérience binomiale.

Exemple : Le tiroir à chaussettes

Un tiroir contient 6 chaussettes rouges et 4 chaussettes noires. Quelle est la probabilité de sélectionner 2 chaussettes rouges lorsque vous en tirez 5 du tiroir (avec remise) ?

X : # de chaussettes rouges (c'est-à-dire succès) parmi les 5 essais.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 2) &= C_5^2 \cdot \left(\frac{6}{10}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{6}{10}\right)^{5-2} \\ &= 10 \cdot (0.6)^2 \cdot (0.4)^3 \\ &= 0.2304.\end{aligned}$$

Exemple : Le tiroir à chaussettes

Un tiroir contient 6 chaussettes rouges et 4 chaussettes noires. Quelle est la probabilité de sélectionner *au moins 4 chaussettes rouges* lorsque vous en tirez 5 du tiroir (avec remise) ?

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 4) &= \mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 5) \\ &= C_5^4 \cdot (0.6)^4 \cdot (0.4)^1 + C_5^5 \cdot (0.6)^5 \cdot (0.4)^0 \\ &= 5 \cdot (0.6)^4 \cdot (0.4)^1 + (0.6)^5 \cdot (0.4)^0 \\ &= 0.2592 + 0.0778 = 0.3369\end{aligned}$$

Prenez la route la plus courte

450 étudiants suivent le cours “Introduction à la Statistique”, mais la probabilité qu'un étudiant ne soit pas endormi à la fin d'un cours est de 0.01.

Quelle est la probabilité qu'au moins un étudiant ne soit pas endormi à la fin du cours ?

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \cdots + \mathbb{P}(X = 450)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(X < 1) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) \\ &= 1 - C_{450}^0 (0.01)^0 (0.99)^{450} \\ &= 0.9891\end{aligned}$$

Distribution binomiale ($n = 1$)

$$X = \begin{cases} 1, & \text{avec probabilité } p \\ 0, & \text{avec probabilité } (1 - p) \end{cases}$$

$$X \sim \text{Bin}(1, p)$$

k	0	1
$\mathbb{P}(X = k)$	$1 - p$	p

$$\mathbb{E}(X) = 0(1 - p) + 1p = p$$

$$\mathbb{E}(X^2) = 0^2(1 - p) + 1^2p = p$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \{\mathbb{E}(X)\}^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Espérance & variance de W

Soit $W = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

Si X_1, X_2, \dots, X_n sont indépendantes avec $X \sim \text{Bin}(1, p)$, alors

$$W \sim \text{Bin}(n, p)$$

Espérance de W

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(W) &= \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \dots + \mathbb{E}(X_n) \\ &= n \mathbb{E}(X) = n p\end{aligned}$$

Variance de W

$$\begin{aligned}\text{Var}(W) &= \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \dots + \text{Var}(X_n) \\ &= n \text{Var}(X) = n p (1 - p)\end{aligned}$$

Loi binomiale : espérance et variance

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Fonction de Masse de Probabilité (FMP)

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

Espérance

$$\mathbb{E}(X) = n p$$

Variance

$$\text{Var}(X) = n p (1 - p)$$

Écart-type

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{n p (1 - p)}$$

Variable aléatoire discrète

X prend des valeurs de manière aléatoire

k	1	2	3
$\mathbb{P}(X = k)$	0.2	0.6	0.2

Exemple de variables aléatoires continues

X = taille

Y = temps d'attente

U = nombre aléatoire compris entre 0 et 1

Variables aléatoires discrètes vs continues

Variables aléatoires discrètes


- Prennent des valeurs dans une liste de nombres distincts
- Correspondent à des dénombrements

Variables aléatoires continues


- Prennent des valeurs sur un intervalle
- Correspondent par exemple à des mesures physiques

Une variable aléatoire U


U est un nombre entre 0 et 1. On suppose une distribution uniforme.



- $\mathbb{P}(U < 1/2) = 1/2$




- $\mathbb{P}(0.5 < U < 0.6) = 0.1$



Longueur d'un intervalle

- $\mathbb{P}(U \text{ dans } A) = \text{Longueur de } A$
- $\mathbb{P}(U > 0.6) = 1 - 0.6 = 0.4$




- $\mathbb{P}(U = 0.3) = ?$

$$\mathbb{P}("U = n'importe quel nombre") = 0$$

Pourquoi ?

Exemples



- $A = \{0.15 < U < 0.55\}$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(0.15 < U < 0.55) = 0.55 - 0.15 = 0.40$$

- $B = \{0.2 < U < 0.85\}$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(0.2 < U < 0.85) = 0.85 - 0.2 = 0.65$$

- $A \text{ ou } B$

$$\mathbb{P}(A \text{ ou } B) = \mathbb{P}(0.15 < U < 0.85) = 0.85 - 0.15 = 0.7$$

- $A \text{ et } B$

$$\mathbb{P}(A \text{ et } B) = \mathbb{P}(0.2 < U < 0.55) = 0.55 - 0.2 = 0.35$$

- $B|A$

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \text{ et } B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.35}{0.4} = 0.875$$

Généralement

Soit X une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle de a à b



$$\mathbb{P}("X \in \text{intervalle}") = \frac{\text{longueur de l'intervalle de l'événement}}{\text{longueur de l'intervalle total}}$$

Variable aléatoire continue

- $\mathbb{P}(X = 6) = 0$


La probabilité que la variable aléatoire prenne une certaine valeur unique est nulle.

- Les intervalles ont une probabilité > 0
- Pour une variable aléatoire Uniforme U :


$$\mathbb{P}(x < U < y) = \frac{y - x}{\text{longueur de l'intervalle total}}$$

Loi uniforme : fonction de densité de probabilité

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$



Loi uniforme : fonction de densité de probabilité




Calcul des probabilités

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(x < U < y) &= \text{Aire} \\ &= \text{largeur} \times \text{hauteur} \\ &= (y - x) \cdot \left(\frac{1}{b - a}\right)\end{aligned}$$

Aire totale sous la courbe = 1

Loi uniforme : espérance et variance

Centre de gravité



$$\mathbb{E}(U) = \frac{b + a}{2}$$

$$\text{Var}(U) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

Exemple : attendre le bus

Jean prend le bus tous les jours pour aller en cours. Le bus arrive à l'arrêt ponctuellement **toutes les 30 minutes**. *Supposons que Jean arrive à l'arrêt de bus à un moment quelconque de la journée, avec une probabilité uniforme.*

Soit

X = le temps (en minutes) que Jean doit attendre pour le bus

Quelle est la probabilité que Jean attende moins de 10 minutes ?


Exemple : attendre le bus

X est une variable aléatoire *continue* qui prend ses valeurs dans $(0, 30)$

Comme **tous les temps d'attente sont équiprobables**, la variable aléatoire suit la loi uniforme :

$$X \sim U(0, 30)$$


Fonction de densité de probabilité de X :



Exemple : attendre le bus

L'aire sous la courbe de densité entre 0 et 10 représente la probabilité $\mathbb{P}(X \leq 10)$, c'est-à-dire la probabilité que John attende moins de 10 minutes.

$$\mathbb{P}(X \leq 10) = \text{Base} \times \text{Hauteur} = 10 \times \frac{1}{30} = \frac{1}{3}.$$



Fonction de répartition cumulative

Une autre manière de décrire la distribution de X

$$F(x) = \mathbb{P}(U \leq x)$$

$F(x)$ correspond à l'aire sous la courbe jusqu'à x

Pour $U \sim U(a, b)$:

$$F(x) = \mathbb{P}(U \leq x) = \frac{x - a}{b - a}$$


Fonction de répartition cumulative

X est une variable aléatoire continue

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ (définition)

Probabilité	Calcul à l'aide de la fonction de répartition cumulative
$\mathbb{P}(X \leq x)$	$= F(x)$
$\mathbb{P}(x \leq X \leq y)$	$= F(y) - F(x)$
$\mathbb{P}(X \geq x)$	$= 1 - F(x)$

Fonction de densité de probabilité



$P("X \in \text{Intervalle}") = \text{Aire sous la fonction de densité de probabilité}$