

011094, 中国科学技术大学, 2020年春季学期

数理逻辑讲义

陈小平

计算机科学与技术学院

再记2020科大樱花
——向新世界的建设者致敬！

枝展花妍又遇寒，殷殷遥望玉门难。
春风奋起千钧力，不度阳关终不还。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ **观察** 为了实现自然数定义的形式化，需要首先实现等词 $=$ 定义的形式化。为此，建立带等词的一阶谓词演算 K^+ 。
- ❖ K^+ 的语言 $K^+(Y)$ 是固定带有二元谓词符号 $=$ 的 $K(Y)$ ；因此， $K^+(Y)$ 是一类特殊的一阶语言 $K(Y)$ 。
- ❖ **等词的逻辑地位** $=$ 是逻辑符号还是非逻辑符号？逻辑符号的意义/解释在所有一阶结构中相同；非逻辑符号的意义/解释在不同的一阶结构中可以不同。最终，等词 $=$ 被视为一个**常谓词**，即在 $K^+(Y)$ 中始终存在的谓词。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ K^+ 增加了三条等词公设，作为等词定义的形式化。对比： K 没有任何公设，只有公理和推理规则。
- ❖ 等词公设 K^+ 包含以下等词公设：
 - (E1) $u = u$;
 - (E2) $u_k = u \rightarrow g(u_1, \dots, u_k, \dots, u_n) = g(u_1, \dots, u, \dots, u_n)$;
 - (E3) $u_k = u \rightarrow (P(u_1, \dots, u_k, \dots, u_n) \rightarrow P(u_1, \dots, u, \dots, u_n))$.
- ◆ 注释 等词公设定义了等词的一些基本性质(基础性知识)：自身相等、等量在函数和原子公式中的可替换性。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

❖ K^+ 构成 (视为一个应用谓词演算)

1. 语言 $K^+(Y)$: 带常谓词=的 $K(Y)$;

2. 公理模式: $(K1) \sim (K5)$;

3. 推理规则: (MP) 、 (UG) ;

4. 等词公设: $(E1) \sim (E3)$;

5. 形式推理/形式证明: 等词公设与公理同样使用, 其余同 K 。

◆ 记号 在 K^+ 中从 Γ 推出 p , 记为 $\Gamma \vdash_{K^+} p$, 简写为 $\Gamma \vdash p$ 。

❖ 注释 对任何 Γ 和 p , $\Gamma \vdash_{K^+} p$ 当且仅当 $\Gamma \cup \{E1, E2, E3\} \vdash_K p$ 。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ 公设与公理的区别 任何公理都是逻辑有效的，任何公设都不是逻辑有效的。
- ❖ 例1 取一个特殊的 $K^+(Y)$ 语言，不含个体常元、函数符号和其他谓词符号。取 $K^+(Y)$ 的一个一阶结构 $M=(N, \emptyset, \{>\})$ ，使得 $=^M$ 解释为 N 上的大于关系 $>$ 。

依一阶解释的定义，任给个体变元指派 V ，在对应的一阶解释 I 之下， $I(u = u)=t$ 当且仅当 $I(u)>I(u)$ 当且仅当 $d>d$ 。由于对任何 $d \in N$ ， $d>d$ 不成立，因此 $I(u = u)=f$ 。

故(E1)不是 M 有效的，也不是逻辑有效的。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ 术语 对 $K^+(Y)$ 的任何一阶结构 M , 若 $(E1)$ 、 $(E2)$ 、 $(E3)$ 都是 M 有效的, 则称 K^+ 是 M 有效的, 称 M 是一个 K^+ 模型, 记为 $M \models K^+$ 。
- ❖ 定理1 任给 $K^+(Y)$ 的一阶结构 $M=(D, F, P)$, 若 $=^M$ 是 D 上的相等关系, 则 $M \models K^+$ 。
- ◆ 证明 设 $M=(D, F, P)$ 是一个 $K^+(Y)$ 的一阶结构, 并且 $=^M$ 是 D 上的相等关系 $=$ 。考虑 $(E1)$ 。对任何一阶解释 $I=(M, V, v)$, 由 I 良定义性, 对任何项 u , 存在唯一的 $d \in D$ 使得 $I(u)=d$ 。由于 $I(u = u)=t$ 当且仅当 $I(u)=I(u)$ 当且仅当 $d=d$, 故 $I(u = u)=t$ 。由 u 和 I 的任意性, $u = u$ 是 M 有效的。类似可证 $(E2)$ 和 $(E3)$ 是 M 有效的。定理得证。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ 观察 在任意 K^+ 模型 M 中, $=^M$ 是否必须解释为 D 上的相等关系? 如果回答是肯定的, 对照思考题3.2可知, 等词在某种程度上具备“逻辑意义”; 分析表明, 回答是否定的。
- ❖ 例2 注意例1不是 K^+ 模型, 现构造一个 K^+ 模型。取一个 $K^+(Y)$ 同例1, 考虑它的一阶结构 $M=(N, \emptyset, \{\approx\})$, 其中 \approx 是 N 上的“同奇偶”, 使得 $=^M$ 是 \approx 。

易证(E1)是 M 有效的, 因为对任何 $d \in N$ 有 $d \approx d$ 。

易证(E2)也是 M 有效的, 因为 $K^+(Y)$ 没有函数符号。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

考虑(E3)。在当前的 $K^+(Y)$ 中, (E3)

$$u_k = u \rightarrow (P(u_1, \dots, u_k, \dots, u_n) \rightarrow P(u_1, \dots, u, \dots, u_n))$$

中, P 是=并且 $n=2$, 故(E3)实际形为:

$$(1) u_k = u \rightarrow (u_1 = u_k \rightarrow u_1 = u), \text{ 或者}$$

$$(2) u_k = u \rightarrow (u_k = u_2 \rightarrow u = u_2).$$

对于(1), 假设任何 I 使得 $I(u_k = u)=t$, 即 $I(u_k)$ 与 $I(u)$ 同奇偶, 并且 $I(u_1 = u_k)=t$, 即 $I(u_1)$ 与 $I(u_k)$ 同奇偶, 则有 $I(u_1)$ 与 $I(u)$ 同奇偶, 即 $I(u_1 = u)=t$ 。故(1)是 M 有效的。同理可证(2)是 M 有效的。所以(E3)是 M 有效的。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ 观察 例2中的一阶结构 $M=(N, \emptyset, \{\approx\})$ 确实是一个 K^+ 模型；但在 M 中， $=^M$ 不是论域 N 上的相等关系。
- ❖ 观察 对任何 K^+ 模型 M ，一阶结构 M 满足等词公设，即(E1)、(E2)、(E3)都是 M 有效的；这表示，等词公设对 K^+ 模型 M 中的关系 $=^M$ 做出了约束——要求 $=^M$ 必须具有(E1)、(E2)、(E3)规定的性质。尽管如此，等词公设仍然不能“强迫” K^+ 模型必须将等词 $=$ 解释为论域上的相等关系。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

❖ 习题

3.2 完成本节定理1的证明。

3.3 p110: 2。

❖ 思考题

3.2 L是否“强迫” \rightarrow 解释为实质蕴涵？