

Selbstorganisierende, adaptive Systeme

Übungsblatt 5

Ferdinand Dürlich,
Mikhail Kreymerman,
Stefan Büttner

Institut for Software & Systems Engineering
Universität Augsburg

Fr., 25.11.2016

Frame Title

Frame Subtitle

- Some item
- another item

block title

asdf

$$\mathbb{P}(a|s) = \prod_{i \in N} s_i(a_i)$$

Aufgabe 1

a)

Die iterative Elimination strikt dominanter Strategien kann unabhängig von der Reihenfolge der eliminierten Strategien ausgeführt werden. Daraus können sich algorithmische Vorteile ergeben. Allerdings gilt dies im Allgemeinen nicht für schwach dominierte Aktionen (also reine Strategien). Zeigen Sie anhand des folgenden Beispiels, dass die Reihenfolge der Elimination Auswirkungen auf den Ausgang eines Spiels haben kann.

Schwach dominierte Aktion

Eine Aktion $a_i \in A_i$ heißt *schwach dominiert*, falls es eine Aktion $a_i^+ \in A_i$ gibt, so dass für alle $\mathbf{a}_{-i} \in \mathcal{A}_{-i}$ gilt:

$$u_i(\mathbf{a}_{-i}, a_i^+) \geq u_i(\mathbf{a}_{-i}, a_i)$$

Aufgabe 1

a)

Ein möglicher Weg

	l	r							
t	2,1	0,0	→	m	2,1	1,1	→	m	1,1
m	2,1	1,1		b	0,0	1,1		b	1,1
b	0,0	1,1							
			→	m	1,1	oder	b	1,1	

- Im dritten Zustand ist m schwach dominant gegenüber b und umgekehrt. Es kann also wahlweise m oder b eliminiert werden.
- Die iterative Elimination kann in diesem Beispiel, bei entsprechend gewählten Eliminationsschritten, zu allen Zuständen außer $\langle b, l \rangle$ und $\langle t, r \rangle$ führen.

Aufgabe 1

b)

Dominanzlösbarkeit

Ein Spiel ist *dominanzlösbar*, falls die iterative Elimination exakt einen Ausgang (ein Aktionsprofil) liefert. Dieses ist zugleich das einzige Nash-Gleichgewicht.

Ist folgendes Spiel dominanzlösbar?

	l	m	r
u	3,8	2,0	1,2
d	0,0	1,7	8,2

Aufgabe 1

b) Nash-Gleichgewicht

	l	m	r
u	3,8	2,0	1,2
d	0,0	1,7	8,2

- Naiver Algorithmus zur Suche von Nash-Gleichgewichten zeigt, dass es sich beim Aktionsprofil (u, l) um ein Nash-Gleichgewicht handelt.

Aufgabe 1

b) Iterative Elimination

Strikt dominierte Strategie

Eine Aktion $a_i \in A_i$ heißt *strikt dominiert*, falls es eine Aktion $a_i^+ \in A_i$ gibt, so dass für alle $\mathbf{a}_{-i} \in \mathcal{A}_{-i}$ gilt:

$$u_i(\mathbf{a}_{-i}, a_i^+) > u_i(\mathbf{a}_{-i}, a_i)$$

Es ist nicht rational, strikt dominierte Strategien zu spielen.

Iterative Elimination strikt dominierter Strategien

- Streiche die Strategien, die strikt dominiert sind, solange welche da sind.
- Bleibt nur ein Aktionsprofil übrig, ist das die Lösung.

Aufgabe 1

b)

	l	m	r
u	3,8	2,0	1,2
d	0,0	1,7	8,2

Reine Strategie

Spieler wählen genau eine Aktion.

- Es gibt keine strikt dominierte reine Strategie (= Aktion)
- Iterative Elimination geht nicht weiter und liefert keine eindeutige Lösung
⇒ Das Spiel ist für reine Strategien nicht dominanzlösbar

Aufgabe 1

b)

	l	m	r
u	3,8	2,0	1,2
d	0,0	1,7	8,2

Gemischte Strategie

Spieler ziehen die Aktion nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung.

- Durch geeignete Randomisierung erwarteten Nutzen maximieren

	$l \leftarrow \frac{1}{2}, m \leftarrow \frac{1}{2}$	r
u	2.5, 4	1, 2
d	0.5, 3.5	8, 2

- In der Matrix stehen Erwartungswerte
- Gemischte Strategie dominiert die reine Strategie r strikt.
 $\Rightarrow r$ kann eliminiert werden

Aufgabe 1

b)

	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>r</i>			<i>l</i>	<i>m</i>			<i>l</i>	<i>m</i>		
<i>u</i>	3,8	2,0	1,2	→	<i>u</i>	3,8	2,0	→	<i>u</i>	3,8	2,0	→	
<i>d</i>	0,0	1,7	8,2		<i>d</i>	0,0	1,7		<i>d</i>	0,0	1,7		
		<i>l</i>	<i>m</i>			<i>l</i>	<i>m</i>			<i>l</i>			
		<i>u</i>	3,8	2,0	→		<i>u</i>	3,8	2,0	→	<i>u</i>	3,8	

- Iterative Elimination liefert exakt einen Ausgang (ein Aktionsprofil).
 ⇒ Das Spiel ist für gemischte Strategien dominanzlösbar

Aufgabe 1

c)

	l	r
l	1, -1	-1, 1
r	-1, 1	1, -1

$$s_1(l) = p, \quad s_2(l) = q$$

$$\mathbb{E}u_1(l, s_2) = \mathbb{E}u_1(r, s_2)$$

Sp. 1 ist indifferent gegenüber Sp. 2

$$s_2(l)u_1(l, l) + s_2(r)u_1(l, r) = s_2(l)u_1(r, l) + s_2(r)u_1(r, r)$$

$$\Leftrightarrow q - (1 - q) = -q + (1 - q) \quad \Leftrightarrow q = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}u_2(s_1, l) = \mathbb{E}u_2(s_1, r)$$

Sp. 2 ist indifferent gegenüber Sp. 1

$$s_1(l)u_2(l, l) + s_1(r)u_2(l, r) = s_1(l)u_2(r, l) + s_1(r)u_2(r, r)$$

$$\Leftrightarrow -p + (1 - p) = p - (1 - p) \quad \Leftrightarrow p = \frac{1}{2}$$

Aufgabe 1

d)

	l	r
l	x, 2	0, 0
r	0, 0	2, 2

Nash-Gleichgewicht (s_1, s_2) mit $s_1(l) = p$, $s_2(l) = q$.

$\Rightarrow s_1(r) = 1 - p$, $s_2(r) = 1 - q$.

Gesucht $p(x), q(x)$.

$$\mathbb{E}u_1(l, s_2) = \mathbb{E}u_1(r, s_2)$$

Sp. 1 ist indifferent gegenüber Sp. 2

$$\begin{aligned} s_2(l)u_1(l, l) + s_2(r)u_1(l, r) &= s_2(l)u_1(r, l) + s_2(r)u_1(r, r) \Leftrightarrow qx = (1 - q)2 \\ &\Rightarrow q = \frac{2}{x + 2} \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}u_2(s_1, l) = \mathbb{E}u_2(s_1, r)$$


Sp. 2 ist indifferent gegenüber Sp. 1

$$\begin{aligned} s_1(l)u_2(l, l) + s_1(r)u_2(l, r) &= s_1(l)u_2(r, l) + s_1(r)u_2(r, r) \Leftrightarrow 2p = 2(1 - p) \\ &\Rightarrow p = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Aufgabe 1

e)

Geben Sie zunächst (möglicherweise mit Hilfe der induzierten Normalform) alle Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien an. Welche Gleichgewichte sind teilspielperfekt? Bestimmen Sie schlussendlich ein teilspielperfektes Gleichgewicht mittels Rückwärtsinduktion.



Aufgabe 1

e)


	Induzierte Normalform	
	Vertraue	Vertraue nicht
Spiele nicht, Stehle	1/ 1	1 / 1
Spiele nicht, Stehle nicht	1/ 1	1 / 1
Spiele, Stehle	10 /0	0/ 2
Spiele, Stehle nicht	5/ 5	0/2

- Naiver Algorithmus zur Suche von Nash-Gleichgewichten zeigt, dass Aktionsprofile $\langle (\text{Spiele nicht, Stehle}), \text{Vertraue nicht} \rangle$ und $\langle (\text{Spiele nicht, Stehle nicht}), \text{Vertraue nicht} \rangle$ Nash-Gleichgewichte sind.

Aufgabe 1

e)

Nash-Gleichgewicht $\langle (\text{Spiele nicht}, \text{Stehle nicht}), \text{Vertraue nicht} \rangle$ ist nicht teilspielperfekt, da $\langle \text{Stehle nicht}, \text{Vertraue nicht} \rangle$ für Teilspielbaum ab Knoten 2 kein Nash-Gleichgewicht ist.




Induzierte Normalform

	Vertraue	Vertraue nicht
Stehle	10/0	0/2
Stehle nicht	5/5	0/2

Aufgabe 1


e)

Rückwärtsinduktion




Aufgabe 1

e)



Aufgabe 1


e)



Aufgabe 1

e)

Rückwärtsinduktion



Aufgabe 1

e)

- Das Ergebnis der Rückwärtsinduktion ist ein teilspielperfektes Nash-Gleichgewicht.
⇒ Nash-Gleichgewicht $\langle (Spiele\ nicht, Stehle), Vertraue\ nicht \rangle$ ist teilspielperfekt.