

រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

ចំនួនកុំផ្លិច

I. ចំនួននិម្មិត

- i ហៅថាឯកតានិម្មិត ដែល $i^2 = -1$ ឬ $i = \sqrt{-1}$
- ផលគុណនៃចំនួនពិតខុសពីសូន្យនឹង i ជាចំនួននិម្មិត
- បើ $C > 0$ នោះប្រសការនៃ $-C$ គឺ $\sqrt{-C} = \sqrt{C} \cdot (-1) = \sqrt{C} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{C} \cdot i$
Ex. ចំនួន $-2i$, $3i$, $2\sqrt{3}i$ ជាចំនួននិម្មិត

II. ចំនួនកុំផ្លិច

- និយមន័យ: កន្សោមមានរាង $Z = a + bi$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$ ហៅថាចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត ។
◦ a ហៅថាផ្នែកពិត ◦ b ហៅថាផ្នែកនិម្មិត
- សំគាល់: ចំនួនកុំផ្លិច $Z = a + bi$ និង $W = c + di$ ស្មើគ្នាលុះត្រាតែ $a = c$ (ផ្នែកពិត = ផ្នែកពិត) និង $b = d$ (ផ្នែកនិម្មិត = ផ្នែកនិម្មិត) ។

III. ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

បើ $Z = a + bi$ នោះ $\bar{Z} = a - bi$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ Z ។ លក្ខណៈចំនួនកុំផ្លិច Z និង W :

- $\bar{\bar{Z}} = Z$ • $\overline{Z \pm W} = \bar{Z} \pm \bar{W}$
- $\overline{Z \cdot W} = \bar{Z} \cdot \bar{W}$ • $\overline{\left(\frac{Z}{W}\right)} = \bar{Z} / \bar{W}, W \neq 0$

IV. ស្វ័យគុណនៃ i

- $i^2 = -1$ • $i^3 = -i$ • $i^4 = 1$
- $i^{4k} = 1$ • $i^{4k+1} = i$
- $i^{4k+2} = -1$ • $i^{4k+3} = -i, k \in \mathbb{Z}$

V. សមីការដឺក្រេទី ២

សមីការរាង $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$

មាន $\Delta = b^2 - 4ac$ ឬ $\Delta' = b'^2 - ac, b' = \frac{b}{2}$

- បើ $\Delta > 0$ ឬ $\Delta' > 0$ នោះសមីការមានប្រសព្វពីរផ្សេងគ្នា

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$$

- បើ $\Delta = 0$ ឬ $\Delta' = 0$ នោះសមីការមានប្រសព្វ

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} = \frac{-b'}{a}$$

- បើ $\Delta < 0$ ឬ $\Delta' < 0$ នោះសមីការមានប្រសព្វពីរផ្សេងគ្នា ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $x_1 = \alpha + \beta i, x_2 = \alpha - \beta i$ ។

VI. ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

- គេមាន $Z = a + bi$ នោះម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច Z គឺ $r = |Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- ទ្រឹស្តីបទ: បើ Z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|Z|^2 = Z \cdot \bar{Z}$
- លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ W និង Z

$$i) |WZ| = |W| |Z| \quad ii) \left| \frac{W}{Z} \right| = \frac{|W|}{|Z|}$$

$$iii) |W + Z| \leq |W| + |Z|$$

VII. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

- គេឲ្យ $Z = a + bi$ ើ $r = |Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ហើយ $\alpha \left(\cos \alpha = \frac{a}{r} \text{ និង } \sin \alpha = \frac{b}{r} \right)$ ជានាគុយម៉ង់នៃ Z គេបាន $Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ។
- ទ្រឹស្តីបទ: គេមាន $Z_1 = r_1(\cos \alpha_1 + i \sin \alpha_1)$ និង $Z_2 = r_2(\cos \alpha_2 + i \sin \alpha_2)$ គេបាន
◦ $Z_1 Z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 + \alpha_2)]$
◦ $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\alpha_1 - \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 - \alpha_2)]$

VIII. ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

គេមាន $Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ នោះគេបាន

$$Z^n = [r(\cos \alpha + i \sin \alpha)]^n \\ = r^n (\cos n\alpha + i \sin n\alpha) \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

រូបមន្តដឺម៉ូ

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$$

IX. រ៉ឺសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ $Z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ជាចំនួនកុំផ្លិចមិនសូន្យ និង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះ Z មានរ៉ឺសទី n គឺ

$$W_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

បើ $k = 0; 1; 2; 3; 4; \dots; n-1$ នោះ Z មានរ៉ឺសទី n គឺ

$$W_0; W_1; W_2; W_3; \dots; W_{n-1} \quad \text{។}$$

រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

លីមីតនៃអនុគមន៍

I. និយមន័យលីមីតក្រុងចំនួនកំណត់

- អនុ. f មានលីមីត L កាលណា $x \rightarrow a$ បើ $\forall \varepsilon > 0$ មាន $\delta > 0$ ដែល $0 < |x - a| < \delta$ នាំឲ្យ $|f(x) - L| < \varepsilon$ ។ គេសរសេរ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
- អនុ. f ខិតជិត $+\infty$ (ឬ $-\infty$) កាលណា $x \rightarrow a$ បើ $\forall M > 0$ មាន $\delta > 0$ ដែល $0 < |x - a| < \delta$ នាំឲ្យ $f(x) > M$ (ឬ $f(x) < -M$) ។ គេសរសេរ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (ឬ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$)

II. និយមន័យលីមីតក្រុងអនន្ត

- អនុ. f មានលីមីត L កាលណា $x \rightarrow +\infty$ បើ $\forall \varepsilon > 0$ មាន $N > 0$ ដែល $x > N$ នាំឲ្យ $|f(x) - L| < \varepsilon$ ។ គេសរសេរ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$
- អនុ. f មានលីមីត L កាលណា $x \rightarrow -\infty$ បើ $\forall \varepsilon > 0$ មាន $N > 0$ ដែល $x < -N$ នាំឲ្យ $|f(x) - L| < \varepsilon$ ។ គេសរសេរ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$

III. ប្រមាណវិធីលីមីត

បើ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M, \lim_{x \rightarrow a} h(x) = N$

ហើយ L, M, N ជាចំនួនពិត គេបាន៖

- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = M \pm L$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x) - h(x)] = L + M - N$
- $\lim_{x \rightarrow a} Kf(x) = KL$, K ជាចំនួនថេរ
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)] = L \cdot M \cdot N$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}, M \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$, n ជាចំនួនគត់វិជ្ជាទីបីវិជ្ជមាន

IV. លីមីតនៃអនុគមន៍សនិទាន

- $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}, a \geq 0, n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}, a < 0, n$ ជាចំនួនគត់សេស
- $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt[n]{L} = L^{\frac{1}{n}}$
បើ $L \geq 0$ និង $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$
បើ $L < 0$ និង $n > 2$ ជាចំនួនគត់សេស

V. លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ និង $\lim_{x \rightarrow L} f(x) = f(L)$ នោះ
 $\lim_{x \rightarrow a} f[g(x)] = L$

VI. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ • $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$
- $\lim_{x \rightarrow a} \tan x = \tan a$ • $\lim_{x \rightarrow a} \cot x = \cot a$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ • $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ • $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$

VII. លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណេន្យែល

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ • $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}, n > 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0, n > 0$ • $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$

VIII. លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ • $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ • $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ • $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$


IX. លីមីតមានរាងមិនកំណត់

- $\frac{0}{0}$ ៖ ត្រូវសរសេរភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា ហើយសម្រួលកត្តារួម រួចគណនាលីមីតថ្មី ។
- $\frac{\infty}{\infty}$ ៖ ត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេទាំងភាគយក និងភាគបែងជាកត្តារួម ហើយសម្រួលកត្តារួម ចោល រួចគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។
- $+\infty - \infty$ ៖ ត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេជាកត្តារួម ហើយគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។

រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

តារាងរូបមន្ត

I. ភាពជាប់គ្រងមួយចំណុច



$y = f(x)$ ជាប់គ្រង $x = c$ លុះត្រាតែ ៖

- f កំណត់ចំពោះ $x = c$
- f មានលីមីតកាលណា $x \rightarrow c$
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

សំគាល់: អនុ. f មានលីមីតគ្រង $x = c$ កាលណា

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

II. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ជា

បើអនុ. f និង g ជាប់គ្រង $x = c$ គេបាន ៖

- $f(x) + g(x)$ ជាអនុ. ជាប់គ្រង $x = c$
- $f(x) - g(x)$ ជាអនុ. ជាប់គ្រង $x = c$
- $f(x) \cdot g(x)$ ជាអនុ. ជាប់គ្រង $x = c$

- $Kf(x)$ ជាអនុ. ជាប់គ្រង $x = c$
- $\frac{f(x)}{g(x)}$ ជាអនុ. ជាប់គ្រង $x = c$ ដែល $g(c) \neq 0$

III. ភាពជាប់លើចន្លោះ

- f ជាប់លើចន្លោះបើក (a, b) លុះត្រា f ជាប់ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x នៃចន្លោះបើកនោះ ។
- f ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a, b]$ លុះត្រា f ជាប់លើចន្លោះបើក (a, b) និងមានលីមីត

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ និង } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b) \text{ ។}$$

IV. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើអនុ. g ជាប់គ្រង c និងអនុ. f ជាប់គ្រង $g(c)$ នោះអនុ.បណ្តាក់ $(f \circ g)(x) = f[g(x)]$ ជាប់គ្រង c ។

V. អនុគមន៍បន្លាយតាមភាពជាប់

- បើ f ជាអនុ.មិនកំណត់គ្រង $x = a$ និងមានលីមីត $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ នោះអនុ.បន្លាយនៃ f តាមភាពជាប់គ្រង $x = a$ កំណត់ $g(x) = \begin{cases} f(x) & , x \neq a \\ L & , x = a \end{cases}$


VI. ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល

- បើអនុ. f ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a, b]$ និង K ជាចំនួនមួយនៅចន្លោះ $f(a)$ និង $f(b)$ នោះមានចំនួនពិត c មួយយ៉ាងតិចនៅចន្លោះបិទ $[a, b]$ ដែល $f(c) = K$ ។
- បើអនុ. f ជាប់លើចន្លោះ $[a, b]$ ហើយ $f(a) \cdot f(b) < 0$ នោះយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន c


មួយនៅចន្លោះ a និង b ដែល $f(c) = 0$ ។

VII. អាស៊ីមតូតនៃអនុគមន៍

- បើ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$ នោះបន្ទាត់មានសមីការ $x = a$ ជា អាស៊ីមតូតឈរ នៃអនុ. f
- បើ $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = b$ នោះបន្ទាត់មានសមីការ $y = b$ ជា អាស៊ីមតូតដេក នៃអនុ. f



- បើ $f(x) = ax + b + g(x)$ មាន $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} g(x) = 0$ នោះបន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ជា អាស៊ីមតូតទ្រូត នៃអនុ. f ។



រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

ដេរីវេនៃអនុគមន៍

I. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ x_0

ដេរីវេត្រង់ x_0 នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ ជាលីមីតនៃផលធៀបកំណើនកាលបរិច្ឆេទ Δx ខិតជិត ០ ។ គេសរសេរ ៖

$$y'_0 = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}; h = x - x_0$$

II. ភាពមានដេរីវេ និងភាពជាប់

f មានដេរីវេត្រង់ $x_0 = a$ នោះ f ជាប់ត្រង់ $x_0 = a$ ។

III. ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើ $y = f(u)$ និង $u = g(x)$ នោះ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$

$$\text{ឬ } \frac{d}{dx} f[u(x)] = f'(x) \times u'(x) \text{ ។}$$

IV. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍សំខាន់ៗ

- $y = k \Rightarrow y' = 0$; k : ថេរ
- $y = x \Rightarrow y' = 1$; x : អថេរ
- $y = ax + b \Rightarrow y' = a$
- $y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}$

$$y = \frac{1}{x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2}$$

$$y = \frac{1}{x^n} \Rightarrow y' = -\frac{n}{x^{n+1}}$$

$$y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$y = k \cdot u \Rightarrow y' = k \cdot u'$$

$$y = u + v \Rightarrow y' = u' + v'$$

$$y = u - v \Rightarrow y' = u' - v'$$

$$y = u \cdot v \Rightarrow y' = u' \cdot v + v' \cdot u$$

$$y = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$y = \frac{c}{v} \Rightarrow y' = \frac{-cv'}{v^2}; c : \text{ថេរ}$$

$$y = \frac{u}{c} \Rightarrow y' = \frac{u'}{c}; c : \text{ថេរ}$$

$$y = u^n \Rightarrow y' = nu'u^{n-1}$$

$$y = \frac{1}{u^n} \Rightarrow y' = \frac{-nu'}{u^{n+1}}$$

$$y = \frac{1}{u} \Rightarrow y' = \frac{-u'}{u^2}$$

$$y = \sqrt{u} \Rightarrow y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

V. ដេរីវេអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

$$y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$$

$$y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$$

$$y = \tan x \Rightarrow y' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$y = \cot x \Rightarrow y' = -(1 + \cot^2 x) = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

$$y = \sin u \Rightarrow y' = u' \cos u$$

$$y = \cos u \Rightarrow y' = -u' \sin u$$

$$y = \tan u \Rightarrow y' = u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

$$y = \cot u \Rightarrow y' = -u'(1 + \cot^2 u) = \frac{-u'}{\sin^2 u}$$

VI. ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត

$$y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$y = \ln u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\ln u}$$

$$y = e^x \Rightarrow y' = e^x$$

$$y = e^u \Rightarrow y' = u' e^u$$

VII. ដេរីវេលំដាប់ 2

ដេរីវេលំដាប់ 2 នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ គឺជាដេរីវេនៃ

$$y' \text{ កំណត់តាងដោយ } y'' \text{ ឬ } f''(x) \text{ ឬ } \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ ។}$$

VIII. ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់


ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ អាចមានដេរីវេខ្ពស់ជាង

ទៀត គេហៅ ដេរីវេបន្តបន្ទាប់នេះថា ដេរីវេលំដាប់ 2 ;

ដេរីវេលំដាប់ 3 ;...; ដេរីវេលំដាប់ n តាង $f', f'', \dots, f^{(n)}$

រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ



$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$$

$$\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\sin 2a = 2\sin a \cos a$$

$$\sin a = 2\sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2}$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

$$1 + \cos a = 2\cos^2 \frac{a}{2}$$

$$1 - \cos a = 2\sin^2 \frac{a}{2}$$

$$\cos p + \cos q = 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\cos p - \cos q = -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

$$\sin p + \sin q = 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\sin p - \sin q = 2\sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$$

$$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$$

$$\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$$

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}$$

$$\sin a = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2}, (t = \tan \frac{a}{2})$$

$$\tan a = \frac{2t}{1-t^2}$$

រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

ចុះទីក្នុងលំហ

❖ កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

បើ $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$ ជាពីរចំណុចនៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេបាន $\overline{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

❖ ណាមនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ ជាវ៉ិចទ័រក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេបានណាមវ៉ិចទ័រ \vec{u} កំណត់ដោយ

$$|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

❖ ផលគុណស្កាលែរនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ និង $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ គេបាន

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$

❖ ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មានទិសដៅវិជ្ជមាន

គេបាន $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

$$= \begin{vmatrix} y & z \\ y' & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & z \\ x' & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & y \\ x' & y' \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= (yz' - y'z) \vec{i} - (xz' - x'z) \vec{j} + (xy' - x'y) \vec{k}$$

❖ ផលគុណច្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

បើ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3); \vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ និង

$\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ នៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេបាន $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$

$$= u_1 \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix}$$

❖ ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងលំហ

បើ $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$ ជាពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ គេបានចម្ងាយពី A ទៅ B កំណត់ដោយ

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

❖ សមីការស្វ័យ

សមីការស្វ័យ S ដែលមានផ្ចិត (a, b, c) និងកាំ r គេបាន

- ទម្រង់ស្តង់ដា $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$
- ទម្រង់ទូទៅ $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + k = 0$ ដែល $k = x_o^2 + y_o^2 + z_o^2 - r^2$

❖ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត និងសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់

បើបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $A(x_o, y_o, z_o)$ ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (a, b, c)$ នោះយើងបាន ៖

- សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត L: $\begin{cases} x = x_o + at \\ y = y_o + bt \\ z = z_o + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
- សមីការឆ្លុះ L: $\frac{x - x_o}{a} = \frac{y - y_o}{b} = \frac{z - z_o}{c}$

❖ សមីការប្លង់

បើប្លង់ P កាត់តាមចំណុច $A(x_o, y_o, z_o)$ ហើយកែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (a, b, c)$ នោះសមីការប្លង់ P មានទម្រង់

- ស្តង់ដា P: $a(x - x_o) + b(y - y_o) + c(z - z_o) = 0$
- ទូទៅ P: $ax + by + cz + d = 0$

❖ ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់ក្នុងលំហ

បើប្លង់ P មានសមីការ P: $ax + by + cz + d = 0$ នោះ

ចម្ងាយពីចំណុច $A(x_o, y_o, z_o)$ ទៅប្លង់ P គឺ

$$d(A, P) = \frac{|ax_o + by_o + cz_o + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

❖ ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់ក្នុងលំហ

បើបន្ទាត់ L ស្របនឹងវ៉ិចទ័រ \vec{u} និងមាន $M \in L$ ហើយចំណុច $A \notin L$ នោះចម្ងាយពី A ទៅបន្ទាត់ L គឺ

$$d(A, L) = \frac{|\overrightarrow{MA} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$



រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

ផលគុណនៃព័រវ៉ិចទ័រ

❖ ផលគុណនៃព័រវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ ជាព័រវ៉ិចទ័រក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មានទីលំនៅដូចគ្នា

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y & z \\ y' & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & z \\ x' & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & y \\ x' & y' \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (yz' - y'z) \vec{i} - (xz' - x'z) \vec{j} + (xy' - x'y) \vec{k} \end{aligned}$$

❖ ផលគុណចម្រុះនៃព័រវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

បើ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$; $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ និង $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ នៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$


$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \\ &= u_1 \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

❖ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$$


$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{BA} \times \overline{BC}|$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{CA} \times \overline{CB}|$$



ចំណាំ៖ ត្រូវប្រើផលគុណព័រវ៉ិចទ័រចេញពីកំពូលតែមួយ

❖ ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម-ចតុកោណកែង-ការេ



$$\begin{aligned} S_{ABCD} &= |\overline{AB} \times \overline{AD}| = |\overline{BA} \times \overline{BC}| \\ &= |\overline{CB} \times \overline{CD}| = |\overline{DA} \times \overline{DC}| \end{aligned}$$

ចំណាំ៖ ត្រូវប្រើផលគុណព័រវ៉ិចទ័រចេញពីកំពូលតែមួយ


❖ មាឌចតុមុខ ឬតេត្រាអែត

- ប្រើផលគុណចម្រុះនៃព័រវ៉ិចទ័រ


$$V = \frac{1}{6} |(\overline{AB} \times \overline{AC}) \cdot \overline{AD}|$$

- ប្រើក្រឡាផ្ទៃបាត និងកំពស់


$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h$$



❖ មាឌប្រលេពីប៉ែត



❖ មុំរវាងប្លង់ពីរ



បើប្លង់ P_1 មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ \vec{n}_1 និងប្លង់ P_2 មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ \vec{n}_2

- ្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$
- ្លង់ទាំងពីរស្របគ្នាបើ $\vec{n}_1 = k\vec{n}_2$ ដែល $k \neq 0$
- មុំរវាងប្លង់ទាំងពីរ $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$

❖ សម្គាល់៖


- វ៉ិចទ័រ $\vec{u} \times \vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រកែងនឹងវ៉ិចទ័រ \vec{u} ផង និង \vec{v} ផង
- $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ នោះវ៉ិចទ័រ \vec{u} ក្លបើនេអែរនឹង \vec{v}
- $\vec{u} = k\vec{v}$, $k \neq 0$ នោះវ៉ិចទ័រ \vec{u} ក្លបើនេអែរនឹង \vec{v}
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ នោះវ៉ិចទ័រ \vec{u} អនុកូណាល់នឹង \vec{v}
- $\vec{u} \times \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta \cdot \vec{k}$ ដែល $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$

រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

កោសិប - ប៉ារ៉ាបូល

I. ប៉ារ៉ាបូលដែលមានអ័ក្សឆ្លុះឈរ

❖ ករណីប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលខុសពីគល់ O



- សមីការស្តង់ដាររាង $(x-h)^2 = 4p(y-k)$
- កំពូល V(h, k)
- កំណុំ F(h, k+p)
- សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: y = k - p$
- សមីការអ័ក្សឆ្លុះឈរ $x = h$

❖ ករណីប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលត្រង់គល់ O

មានន័យថា $h = 0$ និង $k = 0$ គេបាន

- សមីការស្តង់ដាររាង $x^2 = 4py$


- កំពូល O(0, 0)
- កំណុំ F(0, p)
- សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: y = -p$
- សមីការអ័ក្សឆ្លុះ $x = 0$

សំគាល់

- បើ $p > 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរអាពផតរកទិស $y > 0$
- បើ $p < 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរអាពផតរកទិស $y < 0$

II. ប៉ារ៉ាបូលដែលមានអ័ក្សឆ្លុះដេក

❖ ករណីប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលខុសពីគល់ O



- សមីការស្តង់ដាររាង $(y-k)^2 = 4p(x-h)$
- កំពូល V(h, k)
- កំណុំ F(h+p, k)
- សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: x = h - p$
- សមីការអ័ក្សឆ្លុះដេក $y = k$

❖ ករណីប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលត្រង់គល់ O

មានន័យថា $h = 0$ និង $k = 0$ គេបាន

- សមីការស្តង់ដាររាង $y^2 = 4px$
- កំពូល O(0, 0)
- កំណុំ F(p, 0)
- សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: x = -p$
- សមីការអ័ក្សឆ្លុះ $y = 0$

សំគាល់

- បើ $p > 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរអាពផតរកទិស $x > 0$
- បើ $p < 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរអាពផតរកទិស $x < 0$


III. សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល

• ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះឈរ

សមីការទូទៅរាង $Ax^2 + Cx + Dy + E = 0$

• ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះដេក

សមីការទូទៅរាង $By^2 + Cy + Dx + E = 0$




រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

កោសិប - អេលីប

I. អេលីបដែលមានអ័ក្សធំដេក និងអ័ក្សតូចឈរ

❖ អេលីបមានផ្ចិតខុសពីគល់ O




- សមីការស្តង់ដា $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$
- ផ្ចិត $I(h, k)$
- កំពូល $V_1(h-a, k)$ និង $V_2(h+a, k)$
- កំណុំ $F_1(h-c, k)$ និង $F_2(h+c, k)$
- ប្រវែងអ័ក្សធំស្មើ $2a$ និង ប្រវែងអ័ក្សតូចស្មើ $2b$
- ចំ.ប្រសព្វអ័ក្សតូច $B_1(h, k-b); B_2(h, k+b)$
- ដែល $a > b > 0$ និង $c^2 = a^2 - b^2$

❖ អេលីបមានផ្ចិតត្រង់គល់ O

មានន័យថា $h=0$ និង $k=0$ គេបាន

- សមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
 - ផ្ចិត $O(0, 0)$
 - កំពូល $V_1(-a, 0)$ និង $V_2(a, 0)$
 - កំណុំ $F_1(-c, 0)$ និង $F_2(c, 0)$
 - ចំ.ប្រសព្វអ័ក្សតូច $B_1(0, -b); B_2(0, b)$
 - ដែល $a > b > 0, c^2 = a^2 - b^2$
- ### II. អេលីបដែលមានអ័ក្សធំឈរ និងអ័ក្សតូចដេក
- #### ❖ អេលីបមានផ្ចិតខុសពីគល់ O



- សមីការស្តង់ដា $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$
- ផ្ចិត $I(h, k)$
- កំពូល $V_1(h, k-a)$ និង $V_2(h, k+a)$

- កំណុំ $F_1(h, k-c)$ និង $F_2(h, k+c)$
- ប្រវែងអ័ក្សធំស្មើ $2a$ និង ប្រវែងអ័ក្សតូចស្មើ $2b$
- ចំ.ប្រសព្វអ័ក្សតូច $B_1(h-b, k); B_2(h+b, k)$
- ដែល $a > b > 0$ និង $c^2 = a^2 - b^2$

❖ អេលីបមានផ្ចិតត្រង់គល់ O

មានន័យថា $h=0$ និង $k=0$ គេបាន

- សមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$
- ផ្ចិត $O(0, 0)$
- កំពូល $V_1(0, -a)$ និង $V_2(0, a)$
- កំណុំ $F_1(0, -c)$ និង $F_2(0, c)$
- ចំ.ប្រសព្វអ័ក្សតូច $B_1(-b, 0); B_2(b, 0)$
- ដែល $a > b > 0$ និង $c^2 = a^2 - b^2$

III. សមីការទូទៅនៃអេលីប

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

ដែល $A \cdot B > 0$ និង $A \neq 0, B \neq 0$

IV. ឱបសង់ទ្រីស៊ីតេ

ឱបសង់ទ្រីស៊ីតេ e នៃអេលីប គឺជាផលធៀបរវាង

ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំណុំ និងកន្លះអ័ក្សធំនៃអេលីប

កំណត់ដោយ $e = c/a$ ។




រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

កោសិប - អ៊ីពែបូល

I. អ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងដេក

❖ អ៊ីពែបូលមានផ្ចិតខុសពីគល់ O



• សមីការស្តង់ដារ $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

• ផ្ចិត $I(h, k)$

• កំពូល $V_1(h-a, k)$ និង $V_2(h+a, k)$

• កំណុំ $F_1(h-c, k)$ និង $F_2(h+c, k)$

• សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរ

$$y_1 = k - \frac{b}{a}(x-h) \text{ និង } y_2 = k + \frac{b}{a}(x-h)$$

• ដែល $a > 0, b > 0$ និង $c^2 = a^2 + b^2$

❖ អ៊ីពែបូលមានផ្ចិតត្រង់គល់ O

មានន័យថា $h=0$ និង $k=0$ គេបាន

• សមីការស្តង់ដារ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

• មានផ្ចិត $O(0,0)$

• កំពូល $V_1(-a, 0)$ និង $V_2(a, 0)$

• កំណុំ $F_1(-c, 0)$ និង $F_2(c, 0)$


• សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរ

$$y_1 = -\frac{b}{a}x \text{ និង } y_2 = \frac{b}{a}x$$

• ដែល $a > 0, b > 0$ និង $c^2 = a^2 + b^2$

II. អ៊ីពែបូលដែលមានអ័ក្សទទឹងឈរ

❖ អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតខុសពីគល់ O



• សមីការស្តង់ដារ $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

• ផ្ចិត $I(h, k)$

• កំពូល $V_1(h, k-a)$ និង $V_2(h, k+a)$

• កំណុំ $F_1(h, k-c)$ និង $F_2(h, k+c)$

• សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរ

$$y_1 = k - \frac{a}{b}(x-h) \text{ និង } y_2 = k + \frac{a}{b}(x-h)$$

• ដែល $a > 0, b > 0$ និង $c^2 = a^2 + b^2$

❖ អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតត្រង់គល់ O

មានន័យថា $h=0$ និង $k=0$ គេបាន

• សមីការស្តង់ដារ $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

• ផ្ចិត $O(0,0)$

• កំពូល $V_1(0, -a)$ និង $V_2(0, a)$

• កំណុំ $F_1(0, -c)$ និង $F_2(0, c)$

• សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរ

$$y_1 = -\frac{a}{b}x \text{ និង } y_2 = \frac{a}{b}x$$

• ដែល $a > 0, b > 0$ និង $c^2 = a^2 + b^2$

I. សមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

ដែល $A \cdot B < 0$ និង $A \neq 0, B \neq 0$

II. អិចសង់ទ្រីស៊ីតេ $e = c/a$