

Nama : Muhammad Sultan Azizi

NPM : 2407110069

Kelas : A



Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV, AIDS, dan kaitannya dengan Gender

Penyakit menular seksual meliputi beberapa jenis penyakit. Berikut penjelasannya :

1. PMS (Penyakit Menular Seksual)

Penyakit Menular Seksual (sering juga disebut Infeksi Menular Seksual atau IMS) adalah istilah payung untuk berbagai macam infeksi yang menular terutama melalui kontak seksual (bisa melalui seks vaginal, anal, maupun oral). Penyebabnya bisa berupa bakteri, virus, atau parasit. Berbeda dengan penyakit biasa, PMS sangat sering tidak menunjukkan gejala awal, sehingga orang bisa menularkannya tanpa sadar.

2. HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Jika PMS lain menyerang area kelamin atau organ tertentu, HIV adalah virus yang secara khusus menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini menghancurkan sel darah putih (bernama sel CD4) yang berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari penyakit.

3. AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

AIDS adalah stadium akhir dan paling parah dari infeksi HIV. Seseorang didiagnosis AIDS ketika sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat hancur oleh virus HIV (jumlah sel CD4 sangat rendah), sehingga tubuh tidak mampu lagi melawan infeksi ringan sekalipun. Setiap orang yang menderita AIDS pasti memiliki virus HIV. Tetapi, tidak semua orang yang terinfeksi HIV akan mencapai tahap AIDS. Jika HIV dideteksi lebih awal dan diobati dengan ARV, penderita tidak akan pernah jatuh ke fase AIDS. Pada fase AIDS, orang tidak meninggal karena virus HIV itu sendiri, melainkan karena infeksi oportunistik, yaitu penyakit yang seolah mengambil kesempatan saat benteng tubuh hancur, seperti TBC yang parah, radang paru-paru (pneumonia), atau jenis kanker tertentu.



Hubungan antara Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS, dan gender merupakan masalah yang kompleks antara kerentanan biologis dan ketimpangan sosial. Faktor gender secara signifikan memengaruhi risiko penularan, akses terhadap layanan kesehatan, hingga dampak sosial-ekonomi yang diterima oleh masing-masing individu. Terdapat beberapa poin yang mengaitkan gender dengan penyakit Menular Seksual (PMS), HIV, AIDS.

a. Masalah Biologis

Secara biologis, perempuan heteroseksual memiliki risiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi tertular PMS/HIV dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh mukosa vagina yang memiliki area permukaan luas dan tipis (mudah mengalami mikro-luka), serta cairan semen laki-laki yang bertahan lebih lama di dalam tubuh perempuan setelah koitus. Perempuan memikul beban biologis dalam penularan HIV dari ibu ke bayi (selama kehamilan, persalinan, atau menyusui).

b. Dampak/Stigma Diskriminasi karena gender

Perempuan yang terdiagnosis PMS/HIV sering kali langsung diberi label negatif secara moral (misalnya dicap tidak setia atau pekerja seks), tanpa melihat jalur penularan yang sebenarnya. Stigma berlapis ini memicu ketakutan hebat bagi perempuan untuk melakukan screening dini atau mencari pengobatan. Laki-laki pengidap HIV/AIDS sering kali menghadapi tekanan berat karena status mereka sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama. Kehilangan pekerjaan akibat penurunan kondisi fisik dapat meruntuhkan identitas sosial mereka di masyarakat.

