

Явный метод Эйлера

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h \quad \forall i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (9.8)$$

для количества точек разбиения $N = 10; 20; 30$ вывести графики решений, полученных данными методами, и точное решение (если оно есть).

$$y' = -4x(y + 1), \quad y(0) = 1$$

Исходное уравнение:

Differential equation solution

$$y(x) = c_1 e^{-2x^2} - 1$$

Точное решение

Differential equation solution

$$y(x) = 2e^{-2x^2} - 1$$


Точное решение с учетом начальных условий:

Метод Эйлера явный

Порядок точности явного метода Эйлера (9.8) на всем промежутке $[x_0, x_0 + X]$ на единицу меньше его порядка точности на одном шаге.

Для всех итерационных численных методов приближенного решения задачи Коши (9.1), (9.2), в результате реализации которых формируется числовая последовательность $\{y_i(h)\}_{i=1}^n$, определяющая приближенное решение указанной задачи, справедлива следующая закономерность.

Если погрешность такого метода на одном шаге является величиной $O(h^{k+1})$, то его погрешность на всем промежутке $[x_0, x_0 + X]$ будет величиной $O(h^k)$.



Точность метода - $O(h)$


Метод Коши

Численная процедура метода Коши

$$\bar{y}_{k+\frac{1}{2}} = y_k + \frac{h}{2} f(x_k, y_k)$$

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_{k+\frac{1}{2}}, \bar{y}_{k+\frac{1}{2}}) \quad (9.26)$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$



Точность метода - $O(h^3)$

Метод Адамса-Мултона (Неявный метод Адамса 3-го порядка)

$k = 2$. Метод Адамса-Мултона. $O(h^4)$

$$\begin{aligned}
 L_2(x) &= F(x_{m+1}) + F(x_{m+1}, x_m)(x - x_{m+1}) + \\
 &\quad + F(x_{m+1}, x_m, x_{m-1})(x - x_{m+1})(x - x_m) = \\
 &= f_{m+1} + \frac{f_{m+1} - f_m}{h}(x - x_{m+1}) + \\
 &\quad + \frac{f_{m+1} - 2f_m + f_{m-1}}{2h^2}(x - x_{m+1})(x - x_m),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_{m+1} &= y_m + \int_{x_m}^{x_{m+1}} L_2(x) dx = \\
 &= y_m + \frac{h}{12} (5f_{m+1} + 8f_m - f_{m-1}), \\
 m &= 1, 2, \dots, n-1
 \end{aligned}$$


Разгон

Для всех методов Адамса, начиная с двухшаговых, кроме начального значения y_0 требуется знание стартовых значений y_1, \dots, y_{k-1} . Процедура вычисления стартовых значений называется разгоном. Рекомендуется делать разгон методами (например, Рунге-Кутты) не меньшего порядка точности на одном шаге, а лучше на единицу большего.

Чтобы решить методом Адамса 3-го порядка нужно “Разогнаться” для этого воспользуемся методом Рунге-Кутты 4-го порядка

Метод Рунге-Кутты четвертого порядка точности на всем промежутке

$$\begin{aligned}
 y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\
 K_1 &= hf(x_i, y_i), \\
 K_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1}{2}), \\
 K_3 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2}{2}), \\
 K_4 &= hf(x_i + h, y_i + K_3), \\
 i &= 0, 1, 2, \dots, n-1.
 \end{aligned}
 \tag{9.35}$$



Точность метода $O(h^4)$

Вывод: Скорость сходимости методов соответствует их погрешности: метод Эйлера самый медленный, далее идет метод Коши и самый быстро-сходящийся - метод Адамса 3-го рода.